

影印宋本傷寒論

上海中醫書局發行

傷寒論卷第八

漢 張仲景述

晉 王叔和撰次

宋 林億校正

明 趙開美校刻

沈 琳全校

辨發汗後病脉證并治第十七

辨不可吐第十八

辨可吐第十九

辨發汗後病脉證并治第十七

合二十五法方二十四首

太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢急難

以屈伸者屬桂枝加附子湯第一

六味前有八病證

太陽病。服桂枝湯。煩不解。先刺風池。風府。却與

桂枝湯第二。五味

服桂枝湯。汗出。脉洪大者。與桂枝湯。若形似瘧。

一日再發者。屬桂枝。二麻黃一湯。第三。七味

服桂枝湯。汗出後。煩渴不解。脉洪大者。屬白虎

加人參湯第四。五味

傷寒。脉浮。自汗出。小便數。心煩。惡寒。脚攣急。與

桂枝。攻表。得之。便厥。咽乾。煩躁。吐逆。作甘草乾

薑湯。厥愈。更作芍藥甘草湯。其脚即伸。若胃氣

不和。與調胃承氣湯。若重發汗。加燒針者。與四

逆湯第五

甘草乾薑湯。芍藥甘草湯。並二味。調胃承氣湯。四逆湯。並二味。

太陽病。脉浮緊。無汗發熱。身疼。八九日不解。服

湯已。發煩必衄。宜麻黃湯第六。四味

傷寒發汗已解。半日復煩。脉浮數者。屬桂枝湯。

證第七。

用前第二方。

發汗後。身疼。脉沈遲者。屬桂枝加芍藥生薑各

一兩人參三兩新加湯第八。六味

發汗後。不可行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可

與麻黃杏子甘草石膏湯第九。四味

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。

屬桂枝甘草湯第十。二味

發汗後。臍下悸。欲作奔豚。屬茯苓桂枝甘草大

棗湯第十一。四味。甘草爛水法附。

發汗後。腹脹滿者。屬厚朴生薑半夏甘草人參

湯第十二。五味

發汗病不解。反惡寒者。虛也。屬芍藥甘草附子

湯第十三。三味

發汗後。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。屬調胃

承氣湯證第十四。用前第五方

太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。若

脉浮。小便不利。渴者。屬五苓散。第十五。五味

發汗已。脉浮數煩渴者。屬五苓散證。第十六。前用

第十
五方

傷寒汗出而渴者。宜五苓散。不渴者。屬茯苓甘

草湯。第十七。四味

太陽病。發汗不解。發熱。心悸。頭眩。身瞤動。欲擗

一作
碎

地者。屬真武湯。第十八。五味

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞。乾噫。腹中

雷鳴下利者。屬生薑瀉心湯。第十九。八味

傷寒汗出不解。心中痞。嘔吐下利者。屬大柴胡

湯第二十。八味

陽明病。自汗。若發其汗。小便自利。雖鞭不可攻。須自欲大便。宜蜜煎。若土瓜根。豬膽汁為導。第

二十一。

蜜煎一味。豬膽方二味。

太陽病。三日發汗不解。蒸蒸發熱者。屬調胃承

氣湯證。第二十二。

用前第五方

大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆惡

寒者。屬四逆湯證。第二十三。

用前第五方

發汗後不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。第

二十四。

四味

發汗多。亡陽譫語者。不可下。與柴胡桂枝湯。和其榮衛。後自愈。第二十五。九味

二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之為逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。熏之。若發汗不徹。不足言。陽氣怫鬱不得越。當汗不汗。其人煩躁。不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得。其人短氣。但坐。以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹。以脈濇故知也。

未持脉時。病人叉手自冒心。師因教試令欬。而不
即欬者。此必兩耳聾無聞也。所以然者。以重發汗
虛。故如此。

發汗後。飲水多必喘。以水灌之。亦喘。

發汗後。水藥不得入口。為逆。若更發汗。必吐下不
止。

陽明病。本自汗出。醫更重發汗。病已差。尚微煩不
了者。必大便鞭故也。以亡津液。胃中乾燥。故令
大便鞭。當問小便日幾行。若本小便日三四行。今
日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以津液

當還入胃中。故知不久必大便也。

發汗多。若重發汗者。亡其陽。讖語。脉短者死。脉自和者不死。

傷寒發汗已。身目為黃。所以然者。以寒濕一作溫在

裏不解故也。以為不可下也。於寒濕中求之。

病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。

太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微

急。難以屈伸者。屬桂枝加附子湯。方一。

桂枝三兩。去皮。

芍藥三兩。

甘草二兩。炙。

生薑三兩。切。

大棗十二枚。擘。

附子一枚。炮。

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云。桂枝湯。今加附子。

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池。風府。却與桂枝湯。則愈。方二。

桂枝

三兩 去皮

芍藥

三兩

生薑

三兩 切

甘草

二兩 炙

大棗

十二枚 擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾啜熱稀粥一升。以助藥力。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯。如前法。若形似瘥。一日再發者。汗出必解。屬桂枝。二麻黃一

湯方三。

桂枝

一兩十銖

芍藥

一兩六銖

麻黃

一兩六銖去節

生薑

一兩六銖

杏仁

十六箇去皮尖

甘草

一兩二銖炙

大棗

五枚擘

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。本云桂枝湯二分。麻黃湯一分。合為二升。分再服。今合為一方。

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。屬白虎加人參湯。方四。

知母

六兩

石膏

一斤。碎。

甘草

二兩。

粳米

六合

人參

二兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。

日三服。

傷寒。脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。反與桂枝。欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。與四逆湯。五。

甘草乾薑湯方

甘草

炙四兩

乾薑

二兩

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

芍藥甘草湯方

白芍藥

四兩

甘草

炙四兩

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

調胃承氣湯方

大黃

四兩。去皮。清酒洗。

甘草

炙二兩

芒消

半升

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒消。更上微火。煮令沸。少少溫服之。

四逆湯方

甘草

炙二兩

乾薑

半一兩

附子

一枚。生用。去皮。破八片。

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可。大附子一枚。乾薑三兩。

太陽病。脈浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當復發汗。服湯已。微除。其人發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。宜麻黃湯方六

麻黃

三兩
去節

桂枝

二兩
去皮

甘草

一兩
炙

杏仁

七十箇
去皮尖

右四味以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。

傷寒發汗已解。半日許復煩。脉浮數者。可更發汗。屬桂枝湯證。七。用前第
二方

發汗後身疼痛。脉沈遲者。屬桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯方八。

桂枝

三兩
去皮

芍藥

四兩

生薑

四兩

甘草

二兩

人參

三兩

大棗

十二枚擘

右六味。以水一斗二升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加芍藥。生薑。人參。

發汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯。方九。

麻黃

四兩。去節。

杏仁

五十箇。去皮尖。

甘草

二兩。炙。

石膏

半斤。碎。

右四味。以水七升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本云黃耳杯。

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。屬