

江西省药品标准

(1974年)

江西省药品标准

(1974年)

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西省药政管理局

前 言

药品是人民同疾病作斗争的重要武器。药品质量的好坏是关系着千百万人民的身体健康和生命安全的大事。制定药品标准是保证人民用药安全有效、促进药品生产发展的一项重要措施。

文化大革命以来，在毛主席革命路线的指引下，我省医药生产有了很大的发展，品种数量大幅度的增长，为了适应各药品生产、供应、使用、药检等部门的工作需要，根据卫生部(72)卫军管字第37号“为编订中西结合的国家新药典开展地方药品标准制订和修订工作的通知”精神，我局从72年下半年起，对我省地方药品标准进行了全面的制订和修订工作，现汇编成册，供各地参照执行。

本册共收载中西药品二百四十四种，其中主要包括1974年7月前，经原省卫生局或药政管理局批准的药品标准；对我省1961年药品标准汇编中，尚需继续生产的品种，经过修订后也列入了本汇编。但不包括1963年版中国药典和部颁标准、1972年版卫生部抗菌素标准中已有收载的品种、以及少数曾经省卫生局批准后，久未生产，估计今后也不会再生产的品种。

本册附录部份的中草成药制剂要点和质量检查通则，仅适用于本省地方标准。

药品标准是对药品的质量规格以及检验方法所作的技术规定。随着医药生产的不断发展，引进新技术，使用新工艺、药品标准也将进一步改进和提高。各单位在执行过程中如发现问题，请及时报所在地市卫生行政部门提出修改意见，以便研究修订，但未经批准前各地不得随便修改标准。

江西省药品标准的实施和修改权属江西省药政管理局。

目次

正文

一号蛇胆川贝末·····	1	贝母枇杷糖浆·····	26
一号蛇胆陈皮末·····	1	风损膏药·····	27
二至丸·····	2	风湿骨痛药酒·····	28
十滴水·····	2	乌鸡调经丸·····	29
人丹·····	3	毛冬青注射液·····	30
人参再造丸·····	4	止咳片·····	31
人造补血药·····	5	止咳枇杷糖浆·····	32
力维隆补血糖浆·····	6	止痛消炎膏·····	33
力维隆补血糖浆(浓)·····	7	水解蛋白注射液·····	34
丁扣理中丸·····	8	牙痛水·····	36
九气心痛丸·····	8	无味合霉素片·····	36
三号蛇胆川贝末·····	9	白带丸·····	37
三磷酸腺甙二钠·····	10	白芨片·····	38
三磷酸腺甙二钠注射液·····	11	加减地黄丸·····	38
上清丸·····	12	加减杞菊丸·····	39
山楂丸·····	13	附子理中丸(南昌方)·····	39
小儿回春丸·····	13	七厘散(南昌方)·····	40
小儿安·····	14	锡类散(北京方)·····	41
小儿安片·····	15	平胃丸·····	41
小儿退热片·····	16	四制香附丸·····	42
小儿止咳糖浆·····	17	四维葡萄糖·····	42
工农眼药水·····	18	四环素糖粉·····	43
土霉素糖粉·····	19	汉防己甲素·····	44
牛黄解毒片·····	20	汉防己甲素片·····	45
牛黄解毒丸·····	21	汉防己甲素注射液·····	45
开胸顺气片·····	21	扑热息痛片·····	46
开塞露·····	22	甘露·····	47
木香顺气丸·····	23	甘露醇注射液·····	48
五加皮药酒·····	23	仙鹤草色素·····	49
六君子丸·····	24	仙鹤草色素注射液·····	50
六神丸·····	25	长效土霉素颗粒·····	50
六曲茶·····	25	全鹿丸·····	51
		全身散·····	52

如意丸	53
红管药片	54
壮腰健肾丸	55
妇科十味片	56
妇科调经片	57
杀虫丸	58
杀烈癣软膏	58
安神补心丸	59
安胃片	60
安痛定注射液	60
合成鱼腥草素	62
合成鱼腥草素片	63
合成鱼腥草素外用片	63
合霉素注射液	64
肌醇	65
肌醇片	66
百日咳片	67
冰片	67
灰黄霉素软膏	68
附桂紫金膏	69
肠炎宁片	70
鸡血藤浸膏片	72
灵芝片	72
补心丸	73
补肾丸	74
补肾强身片	74
补脑汁	75
补脑汁干糖浆	76
补血糖浆	78
驱虫净	79
驱虫净片	80
驱虫净糖浆	81
驱蛔糖片	82
驱蛔灵宝塔糖	83
肝浸膏片	84
肝铁片	85
肝B ₁₂ 片	85
肝维隆片	86

苏菲咳	87
参茸卫生丸	88
参茸固本丸	89
参茸黑锡丹	90
参桂鹿茸丸	90
参鹿补片	91
定喘丸	92
固精丸	92
明目磁朱丸	93
枇杷叶膏	93
枇杷糖浆	94
拔毒生肌膏	95
肥儿健脾糕	95
肿节风注射液	96
建曲	97
虎骨追风酒	97
痧气散	98
金锁固精丸	99
金黄散	99
金樱子膏	100
金霉素糖粉	101
非那根伤风止咳糖浆	102
非那根伤风止咳干糖浆	102
治咳枇杷干糖浆	103
鱼石脂软膏	104
周效磺胺	105
周效磺胺片	106
香薷丸	106
胃痛丸	107
枳术丸	108
咳嗽糖浆	108
追风膏	109
追风苏合丸	110
首乌片	111
穿心莲片	111
穿心莲注射液	112
祛风骨痛药	112
复方胎盘片	113

复方维B肝片·····	114
复方五味子糖浆·····	114
复合维生素B溶液·····	116
复方土槿皮酊·····	116
复方颠茄片·····	117
复方枸橼酸维静宁糖浆·····	118
脉通·····	119
枸橼酸维静宁片·····	120
枸橼酸维静宁糖浆·····	121
度米芬片·····	122
食母生片·····	122
信宁咳·····	123
药用空心胶囊·····	124
钙素母片·····	125
柴胡注射液·····	126
通宣理肺片·····	127
调经理气丸·····	128
养荣丸·····	129
养血当归精·····	129
养血安神片·····	130
疳积散·····	131
桑枝膏·····	131
桑菊感冒片·····	132
桔红丸·····	133
热可平注射液·····	133
夏天无注射液·····	135
夏天无片·····	135
脐风散·····	136
益母丸·····	137
益肾丸·····	138
益母草流浸膏·····	138
益寿宁·····	139
哮喘丸·····	141
哮利平片·····	141
胱氨酸片·····	142
盐酸小檗碱注射液·····	143
盐酸小檗碱眼药水·····	143
盐酸吗啉双胍·····	144

盐酸吗啉双胍片·····	145
疾得宁眼药水·····	146
消治龙软膏·····	147
消炎镇痛膏·····	148
理中丸·····	149
羚翘解毒丸·····	150
雪梨膏·····	150
银翘解毒片·····	151
清气化痰丸·····	152
清凉油·····	152
清凉润喉片·····	153
维生素U片·····	154
维生素K ₄ 片·····	154
维丁葡萄糖·····	155
维丁钙片·····	156
眼药水·····	156
跌打损伤丸·····	158
跌打损伤酒·····	158
琥珀惊风丸·····	159
温经丸·····	160
滋补力·····	160
舒筋丸·····	161
舒筋活络丸·····	162
舒筋活血片·····	162
舒胃宁片·····	163
硫桐脂软膏·····	164
硫酸软骨素·····	165
硫酸软骨素注射液·····	166
硫酸软骨素片·····	167
硝酸一叶萩碱·····	167
硝酸一叶萩碱注射液·····	168
氯霉素注射液·····	169
鹅根·····	170
黄夹武·····	171
黄夹武注射液·····	171
黄夹武片·····	172
黑白癣药水·····	173
脾铁片·····	174

感冒退热片·····	175
腰痛丸·····	175
解毒消炎丸·····	176
解热止痛散·····	177
煤焦油皂溶液·····	178
豨桐片·····	179
豨桐丸·····	180
鼻通灵·····	180
鼻通软膏·····	181
缩合葡萄糖·····	182
缩合葡萄糖注射液·····	184
蕲蛇药酒·····	185
醋酸可的松眼膏·····	186
醋酸可的松眼药水·····	187
醋酸强的松眼膏·····	189
醋酸强的松软膏·····	190
颠茄浸膏片·····	191
避光空心胶囊·····	191
磺胺甲基异恶唑·····	192
磺胺甲基异恶唑片·····	193
磺胺结晶·····	193

磺胺噻唑眼膏·····	194
磺胺嘧啶眼膏·····	195
磺胺嘧啶软膏·····	196
磺胺醋酰钠眼药水·····	196
藿香正气水·····	197
癫痫白金丸·····	198

附录

中草成药制剂要点·····	附录 1
中草成药质量检查通则·····	附录 2
蜜丸·····	附录 2
水泛(水蜜)丸·····	附录 3
散剂·····	附录 3
内服膏滋、糖浆剂·····	附录 4
外贴膏药·····	附录 4
茶剂·····	附录 4
酒剂·····	附录 5
片剂·····	附录 5
注射剂·····	附录 6

索引

中文索引·····	索引 1
汉语拼音索引·····	索引 9

一 号 蛇 胆 川 贝 末

Yihao Shedan Chuanbei Mo

【处方】 川贝末 五两 (156.3g) 蛇胆汁 一两 (31.25g) 除胆衣
白酒 二两

【制法】 将川贝按规定整理后，碾成细粉，按 1:5 比例加入蛇胆汁（配比：有毒蛇胆：眼镜、金环、银环、沂蛇等蛇胆占50%，无毒蛇胆：乌梢、菜花、黄金条、三索线、水律等蛇胆占50%）和白酒，拌匀后干燥，碾成细粉，过筛即得。

【性状】 灰白色粉末，气微香，味苦。

【检查】 应符合附录中草成药制剂质量检查通则散剂项下有关的各项规定。

【功能】 化痰止咳。

【主治】 风热咳嗽、久咳痰多。

【用法与用量】 开水冲服，空腹服，成人每次服二支至三支。三岁以下小儿服一支至二支。隔二小时可再服。

【规格】 每支 2 分 (0.63g)，每合10支。

【贮藏】 密封，贮于阴凉干燥处。

【方剂来源】 仿广州方。

一 号 蛇 胆 陈 皮 末

Yihao Shedan Shenpi Mo

【处方】 陈皮末 五两 (156.3g) 蛇胆汁 一两 (31.25g) 除胆衣
白酒 二两

【制法】 将陈皮按规定整理洁净后，碾成细粉，按 1:5 比例，加入蛇胆汁（配比同蛇胆川贝末）和白酒，拌匀后干燥，碾成细粉，过筛即得。

【性状】 黄色粉末，气微香，味苦。

【检查】 应符合附录中草成药制剂质量检查通则散剂项下有关的各项规定。

【功能】 顺气、健胃、祛痰。

【主治】 风痰咳嗽，气逆反胃。

【用法与用量】 开水冲服，空腹服，成人每次服二支至三支。三岁以下小儿服一支至二支。隔二小时可再服。

【规格】 每支 2 分 (0.63g) , 每合10支。

【贮藏】 密封, 贮于阴凉干燥处。

【方剂来源】 仿广州方。

二 至 丸

Erzhi Wan

【处方】 旱莲草 四十两 (1250g) 女贞子(酒蒸)四十两 (1250g)

【制法】 以上各药分别按规定炮制后, 旱莲草煎煮两次, 合并煎液, 浓缩至 1:2 时, 过滤, 再浓缩至1:0.5, 另将女贞子粉碎, 加入以上药液, 混合均匀, 加炼蜜30~50%制丸, 干燥, 即得。

【性状】 为棕黑色圆球形小蜜丸, 气微香, 味甘微苦。

【检查】 应符合附录中草成药制剂质量检查通则丸剂项下的有关各项规定。

【功能】 益肝阳、补肾精。

【主治】 肝肾阴虚, 头昏眼花, 腰背痠痛。

【用法与用量】 每服三钱, 每日二次, 温开水送下。

【规格】 每钱约17粒, 每瓶四两或半斤。

【贮藏】 密闭, 贮于阴凉干燥处。

【方剂来源】 《全国中药成药处方集》58页 (上海方)

十 滴 水

Shidishui

【处方】	大黄	20g
	桂皮	10g
	精制樟脑	25g
	小茴香	10g
	姜	25g
	辣椒	5g
	桉叶油 (或薄荷油25ml)	12.5ml
	乙醇 (70%)	适量
	制成	1000ml

【制法】 取大黄、辣椒、桂皮、姜、小茴香, 混匀, 用70%乙醇作溶剂, 按照中国药典

1963年版二部附录第9页渗漉法操作，待渗漉液达900ml后，加入桉叶油、樟脑，溶解后，再加适量醇(70%)，使全量成1000ml，滤过，即得。

【性状】 本品为棕褐色透明溶液，有刺激性香气，味辣。

【检查】 乙醇浸出物 取本品10ml，置水浴上蒸发至干，立即在105°干燥2小时，称定重量，遗留残渣不得少于1.4%。

【含乙醇量】 应为60~70% (中国药典1963年版二部附录第45页)。

【作用与用途】 用于中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、肠胃不适等症。

【用法与用量】 成人一次半瓶至一瓶；儿童用量酌减(最多不超过半瓶)，温开水冲服。

【规格】 5 ml。

【注意事项】 孕妇禁用。

【贮藏】 密封，在凉暗处保存。

人 丹

Ren Dan

【处方】	薄荷脑	5.2 g
	冰片	3.9 g
	丁香	3.25g
	砂仁	3.25g
	茴香	1.95g
	桂皮	5.2 g
	胡椒	1.95g
	木香	1.95g
	姜	3.25g
	儿茶	26 g
	甘草	32.5 g
	甘草浸膏	3.9 g
	苯甲酸钠	0.65g
	朱砂	1.95g
	乙醇	780ml
	滑石粉	2.34g
	桃胶	1.95g
	制成	100g

【制法】 将薄荷脑、冰片用少量乙醇溶解后，喷入已事先过筛的桂皮、甘草等生药混合细粉；另将儿茶加水煮沸，并将苯甲酸钠溶入，搅拌静置，上清液即为儿茶流浸膏，然后与

上述细粉制成丸，筛选，干燥，再筛选，包衣，打光，即得。

【性状】 本品为棕红色光亮的朱砂衣丸，具特殊的香味。

【检查】 取已混和均匀的本品约100g，磨成能通过中国药典1963年版二部第七号筛的中等细粉，作以下检查：

(1) 灰份 按中国药典1963年版二部附录第58页测定，不得超过7.6%。

(2) 酸中不溶物 取上述所得的灰份，全部移至烧杯中，加稀盐酸25ml，置石棉网上煮沸5分钟，用无灰滤纸滤过；滤渣用热蒸馏水洗净，移至已知重量的坩埚中，注意炽灼至恒重，残渣不得超过1.5%。

(3) 水份 按中国药典1963年版二部附录第57页水份测定法项下的甲苯法测定，含水份不得超过13%。

(4) 挥发油 按中国药典1963年版二部附录第59页挥发油测定法项下甲法测定，含挥发油不得少于6.5%。

重量差异 取本品100粒，每10粒为一组，分别精密称定重量后之和除以10，即得每一组的平均重量，各组均应为平均重量的95~105%，其中可有两组在90~110%。

【作用与用途】 本品有祛风、舒气、生津、健胃等作用，适用于消化呆滞、晕船、晕车及因气候闷热所引起的不适。

【用法与用量】 需要时服4~8粒，吞服或含服均可。

【贮藏】 密闭，在阴凉干燥处保存。

人 参 再 造 丸

Renshen Zaizao Wan

【处方】	祈蛇肉(酒炒)	二两	(62.5g)	藿香	二两	(62.5g)
	檀香	一两	(31.3g)	母丁香	一两	(31.3g)
	细辛	一两	(31.3g)	玄参	二两	(62.5g)
	醋制香附子	一两	(31.3g)	酒制地龙肉	五钱	(15.63g)
	酒熟地黄	二两	(62.5g)	三七	五钱	(15.63g)
	炒乳香	一两	(31.3g)	炒青皮	一两	(31.3g)
	白豆蔻	一两	(31.3g)	防风	二两	(62.5g)
	酒制首乌	二两	(62.5g)	川芎	二两	(62.5g)
	姜黄	二钱半	(7.8g)	生黄芪	二两	(62.5g)
	甘草	二两	(62.5g)	茯苓	一两	(31.3g)
	炒赤芍	二两	(62.5g)	黄连	二两	(62.5g)
	酒大黄	二两	(62.5g)	寄生	二两	(62.5g)
	葛根	一两五钱	(46.88g)	制麻黄	二两	(62.5g)
	漂全蝎	一两五钱	(46.88g)	炒骨碎补	一两	(31.3g)

酥虎骨	一两	(31.3g)	炒僵蚕	一两	(31.3g)
琥珀	五钱	(15.63g)	制附子	一两	(31.3g)
萆薢	二两	(62.5g)	醋龟板	一两	(31.3g)
沉香	一两	(31.3g)	炒白术	一两	(31.3g)
天麻	二两	(62.5g)	肉桂	二两	(62.5g)
当归	一两	(31.3g)	白芷	二两	(62.5g)
草豆蔻	二两	(62.5g)	炒没药	一两	(31.3g)
威灵仙	一两五钱	(46.88g)	乌药	一两	(31.3g)
羌活	二两	(62.5g)	朝红参	二两	(62.5g)
建曲	四两	(125g)	化桔红	四两	(125g)
飞朱砂	九分二厘	(2.88g)	血竭	七分	(2.19g)
人工牛黄	二分三厘	(0.72g)	冰片	二分三厘	(0.72g)
天然麝香	二分三厘	(0.72g)	天竺黄	二钱三分一厘	(7.22g)
犀牛角	七分	(2.19g)			

【制法】 以上各药，除飞朱砂至犀牛角分别另研极细粉外，其余混合，粉碎过筛。再加上飞朱砂等七味药粉，混匀，加炼蜜95~105%为丸，干燥，蜡壳封固即得。

【性状】 黑褐色圆球形蜜丸。

【检查】 应符合附录中草成药制剂质量检查通行丸剂项下有关的各项规定。

【功能】 驱风祛痰，舒筋通络。

【主治】 风痰瘫痪，半身不遂，筋骨疼痛，四肢麻痹。

【用法与用量】 每服一丸，日服二次，温开水送服。

【规格】 每丸重三钱，每合十丸。

【贮藏】 贮于阴凉干燥处。

【方剂来源】 全国中药成药处方集99页（兰州方）。

人造补血药

Renzao Buxueyao

本品含铁(Fe)量应为0.39—0.46% (g/ml)。

【处方】	枸橼酸铁铵	20g
	维生素B ₁	0.05g
	亚砷酸钾溶液	0.5ml
	苯甲酸钠	1.5g
	蔗糖	750g
	枸橼酸	6g

蔗糖	100g
冷开水	适量
制成	1000ml

【制法】 取冷开水适量，加热，加入蔗糖，溶解后，继续煮沸 15~30 分钟，滤过，放冷，另取枸橼酸铁铵、维生素 B₁ 与苯甲酸钠用适量冷开水溶解后，加入糖浆液内，混匀，再加入枸橼酸、蔗糖、亚砷酸钾溶液及冷开水适量，使成 1000ml，充分搅匀、即得。

【性状】 本品为棕红色浓厚液体；味甜微酸、略涩。

【检查】 混浊度 取本品 10ml，加蒸馏水至 50ml，振摇混和后，应无显著混浊。

比重 应不低于 1.30（中国药典 1963 年版二部附录 13 页）。

pH 值 应为 3.0~4.0（中国药典 1963 年版二部附录 20 页）。

砷盐 含二氧化三砷应为百万分之四至百万分之六。

精密量取本品 10ml，置于 50ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取 2ml，置于砷测定瓶中，依法检查（中国药典 1963 年版二部附录 40 页），所显砷斑与标准比较不得更深。

【含量测定】 精密量取本品 20ml 置于碘瓶中，加稀硫酸 20ml 混匀后，放冷至 15°，滴加 N/10 高锰酸钾液至显淡红色为止，再加盐酸 15ml 及碘化钾 2g，静置 3 分钟后，加淀粉指示液 1ml，用 N/10 硫代硫酸钠液滴定，即得（每 1ml 的 N/10 硫代硫酸钠液相当于 5.585mg 的 Fe）。

【作用与用途】 抗贫血药，用于治疗缺铁性贫血。

【用法与用量】 常用量 口服一次 1 汤匙，一日三次，温开水冲服。

【注意】 服后 2 小时内忌饮茶。

【贮藏】 密封，在阴凉处避光保存。

力维隆补血糖浆

Liweilong Buxue Tangjiang

本品每 100ml 内含铁 (Fe) 应为 0.39—0.47g。

【处方】	肝浸膏(相当于鲜肝)	1100g
	枸橼酸铁铵	20g
	维生素 B ₁	0.1g
	菸酸	0.02g
	桔子油	1.5g
	香草精	0.2g
	蔗糖	420g
	乙醇	20ml
	苯甲酸	3g

饴糖	470g
焦糖	适量
糖精钠	0.33g
冷开水	适量
制成	1000ml

【性状】 本品为深棕色浓厚液体，味甜，有桔子香味。

【检查】 比重 应为1.25以上（中国药典1963年版二部附录13页）。

【含量测定】 精密量取本品100ml，洗入200ml容量瓶中，加蒸馏水稀释至刻度，摇匀，取此稀释液10ml，加硫酸溶液（1→1）2ml及1%高锰酸钾液（约2—3ml）后，再滴加至显淡红色，经5秒钟不褪色时，加盐酸15ml，碘化钾2g，放置暗处15分钟，加水稀释至约300ml，用N/20硫代硫酸钠液滴定，以淀粉作指示剂，即得（每1ml的N/20硫代硫酸钠液相当于2.793mg的Fe）。

【作用与用途】 抗贫血药，用于贫血及对病后体力虚弱或营养不良，亦有增加食欲和促进恢复的作用。

【用法与用量】 口服 一次20ml，一日三次。

【贮藏】 密封，在阴凉处避光保存。

力维隆补血糖浆（浓）

Liweilong Buxue Tangjiang (nong)

本品每100ml内含铁（Fe）应为0.77—0.95g。

【处方】	肝浸膏第一部分（相当鲜肝）	550g
	肝浸膏第二部分（相当鲜肝）	1650g
	枸橼酸铁铵	40g
	维生素B ₁	0.2g
	菸酸	0.04g
	桔子油	1.5g
	香草精	0.2g
	蔗糖	420g
	乙醇	20ml
	苯甲酸	3g
	饴糖	470g
	焦糖	适量
	糖精钠	0.33g
	冷开水	适量
	制成	1000ml

【性状】 本品为深棕色浓厚液体，味甜，有桔子香味。

【检查】 比重 应为1.25以上（中国药典1963年版二部附录13页）。

【含量测定】 精密量取本品50ml，洗入200ml容量瓶中，加蒸馏水稀释至刻度，摇匀，取此稀释液10ml加硫酸溶液（1→1）2ml及1%高锰酸钾液（约2—3ml）后，再滴加至显淡红色，经5秒钟不褪色时，加盐酸15ml，碘化钾2g，放置暗处15分钟，加水稀释至约300ml，用N/20硫代硫酸钠液滴定，以淀粉作指示剂，即得（每1ml的N/20硫代硫酸钠液相当于2.793mg的Fe）。

【作用与用途】 抗贫血药，用于贫血及对病后体力虚弱或营养不良，亦有增加食欲和促进恢复的作用。

【用法与用量】 口服 一次10ml，一日三次。

【贮藏】 密封，在阴凉处避光保存。

丁 扣 理 中 丸

Dingkou Lizhong Wan

【处方】 党参 三两（94g） 白术（炒焦）三两（94g）
甘草（炙） 三两（94g） 干姜 三两（94g）
白豆蔻 一两（31.25g） 丁香 一两（31.25g）

【制法】 以上各药分别按规定炮制后，混合、粉碎、过筛、混匀，用冷开水泛丸，筛选，干燥，即得。

【性状】 为棕灰色水泛丸，气芳香，味辣微甘。

【检查】 应符合附录中草成药制剂质量检查通则丸剂项下的有关各项规定。

【功能】 补脾健胃，温中散寒。

【主治】 脾胃虚寒，脘痞腹痛，呕吐泄泻，消化不良。

【用法与用量】 每服二至三钱，每日二次，温开水送服。

【规格】 每钱约60粒，每瓶二两。

【贮藏】 密闭，防潮。

【方剂来源】 《全国中药成药处方集》304页（南昌方）。

九 气 心 痛 丸

Jiuqi Xintong Wan

【处方】 五灵脂 四两（125g） 莪术 四两（125g）
香附（醋制）四两（125g） 当归 二两（62.5g）

郁金	二两 (62.5g)	延胡索(醋制)	二两 (62.5g)
白芍	二两 (62.5g)	三棱	二两 (62.5g)
高良姜	二两 (62.5g)	肉桂	二两 (62.5g)
广木香	一两 (31.25g)	乳香(制)	一两 (31.25g)
没药(制)	一两 (31.25g)	甘草	一两 (31.25g)
丁香	五钱 (15.63g)		

【制法】 以上各药按规定炮制后，混合粉碎、过筛、混匀，加炼蜜80~100%，制丸，干燥，即得。

【性状】 为黑褐色圆球形蜜丸，气芳香，味苦微甘。

【检查】 应符合附录中草成药制剂质量检查通则丸剂项下的有关各项规定。

【功能】 理气止痛。

【主治】 胃脘疼痛，两胁胀痛。

【用法与用量】 每服三钱，每日二次，温开水送服。

【规格】 小蜜丸每钱约17粒，每瓶四两。大蜜丸每丸重三钱，蜡壳封固，每合十丸。

【贮藏】 贮于阴凉干燥处。

【方剂来源】 《全国中药成药处方集》266页（大同方）。

三 号 蛇 胆 川 贝 末

Sanhao Shedan Chuanbei Mo

【处方】

蛇胆汁	一两六钱七分 (52.19g)	川贝母	六斤四两 (3125g)
苏半夏	六斤四两 (3125g)	黄连	五两九钱二分 (185g)
甘草	五两九钱二分 (185g)	白酒	三两三钱四分

【制法】 以上各药，按规定炮制后，取贝母、苏半夏粉碎成粗粉；黄连、甘草用水适量煎汁，去渣取汁；蛇胆汁（无毒蛇）与白酒混合后与上药汁混合，喷洒入上述粗粉内，拌匀、干燥、粉碎过筛，即得。

【性状】 淡黄色粉末，味甘微苦。

【检查】 应符合附录中草成药制剂质量检查通则散剂项下有关的各项规定。

【功能】 除痰降气。

【主治】 风热咳嗽。

【用法与用量】 开水冲服，成人每次1支，小儿未滿4岁者服半支。

【规格】 每支2分 (0.63g)，每合20支。

【贮藏】 密封，贮于阴凉干燥处。


【方剂来源】 仿广州方。

【备注】 苏半夏制法：将生半夏浸水六天，每天换水三次，后再用白矾水浸30天（每天换水一次），以后再用冷水浸一周，每日换水两次，后取出干燥（白矾用量为生半夏3%）。

三磷酸腺甙二钠

Sanlinsuan Xiangan Erna

DINATRII ADENOSINI TRIPHOSPHAS (ATP)



$$[\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_{13}\text{N}_5\text{P}_3\text{Na}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} \pm \text{H}_2\text{O}] = 605.19 \pm 18.01$$

本品系用光合磷酸化法或用氧化磷酸化合成法制取的三磷酸腺甙二钠。

本品按干燥品计算，含 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_{13}\text{N}_5\text{P}_3\text{Na}_2$ 不得少于75.0%。

【性状】 本品为白色或类白色粉末，无味无臭，有引湿性。

本品在水中易溶，在乙醇、乙醚、氯仿中不溶。

【鉴别】 (1)取本品，加稀硝酸溶解后，加钼酸铵试液，加热，即析出黄色沉淀。

(2)取本品约25mg，加1~2ml溶解后，加1N氢氧化钠液使呈碱性后，加铬酸试液（取三氧化铬0.84g，加蒸馏水7ml溶解后，再缓缓加入浓硫酸4ml，混匀，即得）用玻璃棒磨擦管壁，即产生很细的沉淀。

(3)取本品约10mg，加6N盐酸液5ml溶解后，加入间苯三酚约10mg，混匀，放入沸水浴中加热1分钟，即显玫瑰红色。

(4)本品的水溶液显钠盐的各种特殊反应（中国药典1963年版二部附录32页）。

【检查】 pH值 取本品0.1g，溶于10ml新沸放冷的蒸馏水中，pH值应为3.5~4.5。

硫酸盐 取本品50mg，依法检查（中国药典1963年版二部附录38页），如发生浑浊，与标准硫酸钾溶液7.5ml制成的对照标准液比较，不得更浓（1.5%）。

钡盐 取本品0.2g，用蒸馏水20ml溶解后，将溶液分为二等份，一份中加稀硫酸2ml，一份中加蒸馏水2ml，各混匀，放置30分钟后，二份溶液均应澄清，不得发生浑浊。

蛋白质 取本品20mg，以蒸馏水2ml溶解后，逐滴滴加30%碘基水杨酸溶液0.5ml，不得发生浑浊。

干燥失重 取本品，置减压至5毫米汞柱以下的五氧化二磷真空干燥器中，在60℃干燥至恒重，减失重量不得过5%。

重金属 取本品0.5g，加适量蒸馏水与稀醋酸2ml溶解，使成25ml，依法检查（中国药典1963年版二部附录39页）含重金属不得过百万分之十。