

醫學崇正

卷二

醫學崇正卷二

蜀北射洪許宗正星東著

傷寒第八

仲景傷寒論發盡天下古今萬病情

畧言萬一以啟

辭義深遠初學遽難入得茲故

寒為六淫首由來以

風不能自行故

於風感矣

氣也其有不行於

於

傷中非二義不可執一從

也

也中者穿

之輕者未必異於傷也故

義賢如喻嘉

言猶不二字無甚分別後世

經中以義亂人之耳

陽經中在陰經質諸傷寒論中皆為妄說千  
載之惑惟陳修園始能破晰學者宜變通焉不  
可執一從事  
中風倣此

太陽頭項痛惡寒熱若烘

內經云太陽  
下腦後切  
腰上額交

則頭項痛太陽本  
下言太陽證俱倣

浮絃惟左其桂枝法無

氣或表之表故脉浮寒  
浮絃獨甚宜桂枝湯  
治病必不除人參敗

也太陽診於  
法取汗今世如  
毒散亦可用人  
變化又在乎人

寒熱形如瘧桂麻各半調

調音同共也太陽病數日  
寒熱如瘧一日二三度發

宜桂麻  
各半湯

此後兼微喘桂加杏樸功

大陽病表解裏邪未盡微  
喘咳者宜桂枝加樸杏湯



背寒胸痛太極解其痼太陽邪陷必喘滿胸痛胸

則阻太陽氣化而背惡寒以太

陽分部在背故也宜太極丸

項背几几強葛根經絡通几音殊太陽病項背強人

邪在經輸也無汗用葛根湯有汗用桂枝加葛根湯

合病下利用嘔時半夏充者亦與陽明合病自下利但

嘔者加半夏

過汗惡風甚桂加附子雄太陽病發汗過多致汗漏

以伸屈者宜桂枝加附子湯

病重寒熱倍絃緊六脉同六寒重者惡寒發熱倍盛

身寒骨節痛喘粗熱氣衝太陽病重者不但頭項痛并身體骨節四肢俱痛肺

氣通於皮毛皮毛閉則肺氣壅塞故氣粗而喘陽鬱不宣故熱氣上衝從口鼻而出

麻黃一服愈煩躁大青龍寒病如以上之重者無汗惡

汗不出而煩躁無少陰症者宜大青龍湯或加薑附有

邪陷便短赤咳嘔小青攻干邪陷太陽之府則水氣上

化而小便不利或少腹滿者俱宜小青龍湯

熱渴五苓用寒疼四逆宗便浮微熱渴飲少腹滿小

不化也宜五苓散若寒入太陽之裏內犯少

不爾躁煩嘔傳經病勢遷和病由太陽而解則脈靜身

脈陰陽俱緊數病勢必傳他經須審其遷延何部按法治之

陽明多汗熱梔豉解其煩燥陽明分部在胸以燥為本

熱乘分部故煩也  
宜諸梔子豉湯

渴飲白虎用麻仁太陽兼

陽明病汗多煩渴不嘔者  
宜白虎湯太陽發汗亡津

液胃中燥大便秘難此為太  
陽陽明病也宜麻仁丸

譫語須承氣胃實亦宜然

陽明病熱上燥心或因胃  
實俱成譫語者病人

獨自語也宜三承氣湯臨症時酌用之  
語者亦宜三承氣湯

熱黃茵陳用熱陷猪苓煎

陽明熱在裏但頭汗出  
小便不利渴飲發黃者宜

茵陳蒿湯若熱壅太陽之府阻  
氣化而小便不利者宜猪苓湯

虛寒嘔吐見吳萸一服痊

陽明多屬實  
化而嘔吐者  
胃中食穀不

寒也宜吳  
茱萸湯

邪從少陽轉目眩口苦乾

少陽為陽樞分部在脇以  
火為本火動則風生而目



眩膽熱上攻則口苦咽乾也

往來寒熱見小柴治其源

少陽居表裏之間陰陽分爭故往來寒熱宜小柴胡

寒盛加薑桂熱多倍芩連

寒盛於熱宜桂熱盛於寒宜芩連

耳聾兼目赤中風熱如燔

傷寒云少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者

此風火相搏也

實邪大柴治虛者龍牡先

實熱盛而大便鞭者宜大柴胡湯邪虛多汗者宜柴

胡龍骨牡蠣湯

譫語硝黃進邪陷蜀漆添

譫語有潮熱者宜大柴胡加大黃陽邪陷入陰中久

不愈者宜大小柴胡湯加蜀漆

太陰腹滿痛不食吐利頻

太陰病則阻中土之本分部在腹

滿痛胃氣不和故不食而吐寒溼不行則利

誤下胸結鞭身寒手足溫太陰誤下則胃敗而濁陰

胸中氣化不行而為痞鞭脾為陰中之陰無熱可發因其灌漑四旁故熱發於手足

中風肢節痛微長欲愈形傷寒陽部脉微陰部脉濇絃

長者為欲愈

脉浮桂枝應寒多四逆尋大陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯裏寒腹痛下利者

宜四逆湯

虛者理中用實滿桂黃烹太陰陽虛腹中湯脾困吐瀉者宜

宜桂枝加芍藥大黃湯

溼鬱發黃見茵陳共五苓土困則溼無所制鬱久為熱身必黃宜茵陳五苓散



少陰脉微細欲寐是病情

少陰以熱為本分部在少腹為陰樞病則陽陷於陰

故脉微細但欲寐也

脉沉兼發熱麻黃附細辛

少陰主裏故一陽為陰鬱故發熱宜附細辛湯

三日無裏證麻附甘草呈

少陰病二三日無裏證者以麻附甘草湯發之

心煩不得卧黃連阿膠清

少陰陰虛者宜黃連阿膠湯不得卧者宜黃連阿膠湯

口和背獨冷灸之附子行

少陰不達於太陽則背惡寒宜灸關元在第七椎下兩旁各三寸關元見痼症內服附子湯

寸關元見痼症內服附子湯

咽痛心煩利豬膚妙若神

少陰下利咽痛胸滿心煩者陰虛陽亢也宜豬膚湯

陽鬱咽中痛甘桔半夏勳

少陰陽鬱咽痛者與甘草湯不瘥加桔梗或半夏散

咽痛聲難出苦酒雞子陳

咽痛聲難出者宜苦酒湯

腹痛身疼重真武法惟精

少陰火虛則水氣泛溢為

不利者宜真武湯

裏寒面赤色通脉四逆增

少陰下利清穀裏寒外熱

惡寒其人面赤或腹痛乾嘔咽痛者宜通脉四逆湯

口乾咽燥甚下利色純清

少陰病口乾咽乾或下利清水色純青心下痛口乾

者俱宜急下之

腹脹心疼甚急下三證成

六七日腹脹心疼屎燥者皆急下之證也此為少陰急

下三症俱宜大承氣湯

厥陰病消渴氣衝心熱疼

厥陰以風為本分部在季脇內胎相火病則火動風

生銷燥津液為渴木火上衝則心熱而疼

飢而不欲食食則虵上奔

木鬱土傷故不欲食火主消化故飢風火相煽則腐

臭化虵虵聞食臭必上奔而吐出

誤下利不禁統治烏梅靈

厥陰肝主疎泄誤下則利不止以上各統治用烏梅

之丸治

脉細肢厥冷當歸四逆欣

脉細手足厥冷者厥陰有虛寒也宜當歸四逆湯久

寒者加黃

薑清酒

身寒汗如雨四逆湯可使

寒盛陽將脫者必厥冷惡寒汗出也宜四逆湯不可

尼於陰不

得有汗

厥利唾膿血麻黃升麻取

逆大下後寸脉沉遲手足厥

唾膿血瀉利不止者爲難治麻黃升麻湯主之



熱利飲水多白頭翁可擬

厥陰熱盛下利欲飲水者宜白頭翁湯

頭痛吐涎沫吳茱萸湯與

厥陰虛冷吐涎沫而頭痛者宜吳茱萸湯

餘惟仲景篇該括無窮理

仲景書中該括無窮理白首終不得盡其餘蘊讀

罷此篇宜早讀之

桂枝湯

桂枝 白芍

生薑

各五錢

甘草

二錢炙

大棗

五枚

右五味水煎去渣分溫三服少頃啜熱粥一鍾以

助藥力溫覆令微汗病重者半日三服

歌載傷寒論方合解

人參敗毒散

活人書治傷寒溫疫風溼溫喉疼齒痛赤白噤口痢疾頭痛身痛壯熱惡寒

目赤痛男  
女淋症

人參 扶苓 羌活 獨活 桔梗 枳壳

柴胡 前胡 川芎 生薑 各三錢 甘草 一錢

右十一味水煎服令微汗煩熱不惡寒者加黃芩

三錢石膏五錢寒多去人參加細辛二錢附子四

錢肉痛加白芷葛根各四錢喉痺加射干杏仁各

三錢去人參加荆芥防風名荆防敗毒散

日歌 人參敗毒散 只前柴羌獨芎苓薑草偕桔梗扶同風

溼治太陽邪陷妙神哉按羌活形如背脊味甘而辛從督脉達於太陽之表獨活入土最深味辛而平入太陽之裏則太陽表裏皆通川芎辛溫行血

中之氣以散風枳桔寬中以利氣柴前達三陽之氣使外邪不致內犯茯苓利太陽之腑氣俾內邪不致久留參草補中則邪去而正不傷生薑和胃以助諸藥之運行也

桂枝麻黃各半湯

桂枝

三錢

麻黃

去根節後同

白芍

杏仁

去皮尖後同

生薑

甘草

各二錢

大棗

四枚

右七味先煮麻黃去沫再內諸藥煮取一斗分再服

桂枝加厚樸杏仁湯

卽桂枝湯加厚樸杏仁各二錢寒盛加乾薑三錢



細辛一錢

上二方歌載  
傷寒合解

太極丸

并序

孫思邈云讀方三年便謂天下無病不治及治病三

年乃知天下無方可用此蓋言其得方最易而求治

驗之方實難也

正

少患沉疴十餘載遂力專方術治己

治人讀華陀萬應丸千金萬丸散暨前賢通用方劑

心竊笑之怪其混治傷寒溫病雜症也豈有以一方

而能兼治萬病哉又讀方治病十餘載覺運用有憑

而病多可治方多可用矣忽值旱災數載教匪初平

疫癘大作送醫施藥頗不乏人然而道路流離者往

往苦於無地煎熬湯藥乃體神農軒歧仲景之理暨  
前賢之法撰成一方不假煎熬足以徧治時證諸疾  
屢效於人始知前所笑者乃越犬之吠雪矣正豈可  
終爲越犬哉是以不揣愚妄窺陳盜竊輯錄成篇爰  
附是方以爲有志廣行方便者之一助云

此方治傷寒溫病中風瘧疾紅白噤口痢疾煩躁  
渴嘔頭痛身疼惡寒發熱不分年月日時陰陽證

候總以邪實爲宜虛證兼實邪者亦必用之並治  
寒疝癥瘕痰飲胸喘氣閉欲絕生冷傷胃霍亂吐  
瀉氣鬱血停女人經閉心腹諸痛大小便閉邪魅

蠱毒昏迷不省人事手足厥冷及一切暴病難以

名狀者服之無不神效矣

常山

去葉生用

竹葉柴胡

各四兩

葛根

三兩起節核而細嫩者非真勿誤用

細桂枝

乾薑

草果

去殼

油厚樸

土霍香

茅蒼朮

各二兩

川烏片

檳榔

貫仲

清水半夏

白芷

各兩半

熟附片

縮砂仁

白芍

杏仁

各一兩

澤瀉

八錢

細麻黃

去節根

甘草

炙各六錢

白礬

煨

北細辛

羚羊角

各五錢

以天竹黃代之

右二十四味精選上品依製烘乾勿焦傷性磨細

每藥末一觔用小麥麴六兩水酒各半煮糊和藥