

2006年农家历

(农历丙戌年)

满园



春光



河南科学技术出版社

(劝) (孝) (歌)

世有不孝子，浮生空碌碌，
不念父母恩，何异栽枯木。
百骸未成人，十月居母腹，
渴饮母体血，饥食母身肉，
儿身出生时，母体如杀戮，
父为母伤心，母对父啼哭，
婴儿一出世，父母喜无忧。
可怜慈母心，日夜勤照顾，
儿睡正安稳，时时来看护，
母睡湿席单，儿睡干被褥，
朝夕怀中抱，日夜洗尿布，
倾心养小儿，身容不整修。
哺乳三年整，血汗几千斛，
移步忧坑井，行走怕颠覆，
小儿一有病，急将名医求，
若遇危难病，伤心暗自哭，
拜佛更求神，许愿又还福，
只要小儿安，不惜费财物，
一朝得回生，欢喜开眉目。
拜师入学堂，诸事更辛苦，
长到十五六，行为难拘束，
伦理全不知，诗书懒去读，
游手又好闲，三餐须有肉，
狐朋狗友多，赌博又贪酒，
好为下流事，不顾脸面羞，
终日爱戏游，花钱似粪土，
整日家不归，倚门母望速，
儿行千里路，母心时担忧。

娶得妻到家，爱妻忘了母，
看妻面如玉，看母面如土，
母若责一言，含恨怒双目，
爱妻骂万千，陪笑不为辱。
妻若生爱子，日夜勤守护，
父母丢脑后，儿为掌上珠，
妻不孝公婆，闭目全不顾，
母穿破衣衫，妻穿新衣服，
父母病垂危，儿也无所忧，
父母一咽气，兄弟争财物，
不感创业难，只嫌己不足，
此等不孝人，不如禽与畜。
天地虽广大，不容忤逆物，
趁早悔前非，莫待天诛戮。
人生天地间，孝心不能无，
养儿呕心血，当思孝父母，
人到年迈时，生活需人助，
走路拄拐杖，衣食难自顾，
孤寂守空房，朝夕当看护，
早起问寒暖，叠被又扫屋，
入夜在跟前，伴着守床头，
父母若有病，及时请大夫，
吃药端开水，三餐勤照顾，
父母若在世，诸子不远游，
养老送终时，美名人间留，
代代往下传，孝道垂千秋。

(汝阳县蔡店乡蔡店村 吴汉章)

春

联

★幸福家庭
振兴财旺喜盈门
天时地利人和顺

★万事如意
生意兴隆福星照
财源广进好运来

★祥和人家
旭日临门事业兴
艳阳高照财源盛

★心想事成
心舒神雅梦成真
气顺福至财进门

★迎福纳财
佳年顺景永生财
新春大吉鸿运开

★大吉大利
富上添财日日欢
福中增喜年年乐

★万象更新
福星高照年年好
招财入户日日安

★幸福门第
和睦家庭添富贵
福寿齐来合家欢

★春意盎然
献岁红梅开五福
迎风绿柳舞三春

★五福临门
岁岁年年添美满
家家户户庆团圆

★吉祥宅第
春深均山腾龙甲
花满瑶池起凤毛

★岁岁平安
风调雨顺年年顺
家业兴旺步步高

★万事如意
大年初一福门开
喜神迎着财神来

★吉星高照
财运亨通业兴隆
福星高照人兴旺

★财源茂盛
富贵门庭生意旺
黄金宝地财源广

★五福临门
平平安安门庭好
顺顺利利进财源

★富贵吉祥
平安如意千日好
人顺家和万事兴

★大展宏图
春风得意年年新
前程锦绣步步高

★福运亨通
八方财神添富贵
四时福星保平安

★迎春接福
吉星高照迎百福
春光耀耀纳千祥

★满院春光
平安接来全家富
和顺迎进满堂春

★财旺福多
生财有道有财生
财生福地福生财

★富贵吉祥
新春临宅家兴旺
万福满堂合家欢

★恭喜发财
福星年年照宝地
财神岁岁登金门

★普天同庆
吉庆平安辞旧岁
康乐幸福迎新春

★生意兴隆
货如轮转生意好
客似云来财源广

★四海同春
抬头见喜喜满神州
开门迎春春回大地

★辞旧迎新
辞旧岁雄鸡高唱驱穷鬼
贺新春金狗跃起迎财神

★一帆风顺
喜迎四海利源长驻聚宾来
欢庆九州财星降临齐拱照

★国富民安
盛事欢歌峥嵘岁月千秋福
神州喜庆锦绣山河万世春

2006 年二十四节气交节时刻表

节气	公 历	农历	时 刻	节气	公 历	农历	时 刻
小寒	1 月 5 日	十二月初六	19 时 47 分	小暑	7 月 7 日	六月初二	13 时 51 分
大寒	1 月 20 日	十二月二十一	13 时 15 分	大暑	7 月 23 日	六月十八	7 时 18 分
立春	2 月 4 日	正月初七	7 时 27 分	立秋	8 月 7 日	七月初四	23 时 41 分
雨水	2 月 19 日	正月二十二	3 时 26 分	处暑	8 月 23 日	七月十三	14 时 23 分
惊蛰	3 月 6 日	二月初七	1 时 29 分	白露	9 月 8 日	七月初六	2 时 39 分
春分	3 月 21 日	二月二十二	2 时 26 分	秋分	9 月 23 日	八月初二	12 时 03 分
清明	4 月 5 日	三月初八	6 时 15 分	寒露	10 月 8 日	八月十七	18 时 21 分
谷雨	4 月 20 日	三月二十三	13 时 26 分	霜降	10 月 23 日	九月初二	21 时 26 分
立夏	5 月 5 日	四月初八	23 时 31 分	立冬	11 月 7 日	九月十七	21 时 35 分
小满	5 月 21 日	四月二十四	12 时 32 分	小雪	11 月 22 日	十月初二	19 时 02 分
芒种	6 月 6 日	五月十一	3 时 37 分	大雪	12 月 7 日	十月十七	14 时 27 分
夏至	6 月 21 日	五月二十六	20 时 26 分	冬至	12 月 22 日	十一月十三	8 时 22 分

(日) (月) (食)

(一)3 月 29 日日全食。我国中西部地区可见偏食。

(二)9 月 8 日月偏食。食分 0.19，初亏 2 时 05 分，食甚 2 时 51 分，复圆 3 时 38 分。

(三)9 月 22 日日环食。我国不可见。

2006年 1月大 农历 乙酉年 十二月小 丙戌年 正月大	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五
	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
	元旦				小寒		●上弦 腊八	周恩来逝世 (1976)	三九					○望
记事														

★小 常 识

2004 年以来我国新设的城市(区)

省(市、自治区)	新设城市(区)名称	原县(区)名称
河南	漯河市郾城区	原郾城县的城关镇、孟庙镇、商桥镇、裴城镇、新店镇、龙城镇、黑龙潭乡、李集乡为郾城区管辖
	漯河市召陵区	原郾城县的老窝镇、召陵镇、万金镇、邓襄镇、姬石乡、青年村乡为召陵区管辖
黑龙江	哈尔滨市呼兰区	原呼兰县
山东	日照市岚山区	原日照市岚山工委
广西壮族自治区	崇左市	原崇左县
甘肃	天水市秦州区	原天水市秦城区
	天水市麦积区	原天水市北道区
	陇南市	原陇南地区
	陇南市武都区	原武都县

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二
十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	正月	初二	初三
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申
			四九		大寒	列宁逝世 (1924)	●下弦					五九 宋庆龄 诞辰 (1893)	除夕	春节 ●朔		

★优良品种

肉鸭优良品种

1. 北京鸭 北京鸭原产于我国北京近郊玉泉山一带,相传已有400多年的历史,是世界上最著名的肉用型鸭标准品种。

北京鸭体型硕大,肌肉丰满,全身羽毛洁白,身体紧凑。头大眼圆,眼睛虹彩呈蓝灰色,颈长而粗。体躯长宽,胸宽而深,腹部深广,前躯高举,后躯稍向后倾斜与地面约呈30°角。翅小贴身,尾短而上翘。腿短而粗壮,喙呈橙黄色,脚、胫、蹼呈橘红色。北京鸭以生长发育快、繁殖率高、适应性强、肉质优良而著称

于世。

北京鸭初生雏重52~55克,饲养50日龄体重一般可达2.5~2.6千克,成活率达90%以上。成年公鸭体重3.3~3.6千克,成年母鸭体重3.0~3.5千克,开产日龄为160~180天,年产蛋量150~200个。近年来,经选育的北京鸭新品系的生产性能水平已经在原有基础上有了很大提高。

北京鸭体躯笨重,行走缓慢,性情温顺,好安静,喜合群,无就巢性,适于集约化和规模化饲养。

2006年 2月平 农 历 丙戌年 正月大 二月小	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二
	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七
	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌
				立春	六九 ●上弦		二七 工人 斗争 纪念日 (1923)					元宵 节	○望	七九
记事														

2. 樱桃谷鸭 樱桃谷鸭是英国樱桃谷农场(公司)应用北京鸭与本地鸭杂交后,经过多年选育而成的肉用型鸭配套系。樱桃谷鸭的体型外貌与北京鸭大致相同,但体型较北京鸭大而结实。雏鸭绒毛呈黄色,3周龄以后逐渐变为白色,成鸭全身羽毛洁白而紧凑,头大,额宽,颈粗短,体长背宽,胸部发达,脚短,体躯倾斜度小,近乎与地面平行,喙呈橙黄色,少数为肉色,脚、胫、蹼呈橘红色。

樱桃谷公司目前已育成的肉鸭配套系有11个,其中我国自1980年以来先后引进了L₂型、CVsuper-M型(超M型)等父母代或商品代肉鸭。L₂型肉鸭49日龄体重3.09千

克,饲料转化率为2.81,上市肉鸭成活率可达93%以上。CVsuper-M型(超M型)鸭,肉鸭49日龄体重达3.2千克以上,饲料转化率为2.6~2.8,胸腿肉率为27%,上市肉鸭成活率达94%以上;成年公鸭体重3.5~4.3千克,母鸭体重3.4~4.0千克,160日龄左右开产,10个月产蛋量可达180~220个。

樱桃谷鸭具有生长速度快、饲料报酬好、瘦肉率高、成活力强等突出特点,适于规模化与集约化养殖。

3. 狄高鸭 狄高鸭是澳大利亚狄高公司采用北京鸭育成的肉鸭品系。狄高鸭体型外貌近似于北京鸭,成年鸭全身羽毛为乳白色,头大稍扁长,颈粗长,胸宽背阔,体躯前

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二			
十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	二月			
乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子			
				雨水 逝邓小平 (1997)		●下弦		八九					●朔			

昂,后躯贴近地面,尾稍翘起,胫粗短,喙呈橙黄色,脚、蹼呈橘红色。

秋高鸭具有早期生长速度快、早熟、长羽快、瘦肉多、肉质好等优点。肉鸭45日龄即可长齐羽毛,有利于肉鸭提前上市。肉鸭49日龄体重可达3千克,饲料转化率为3;成年公鸭体重3.4~3.8千克,母鸭体重3.2~3.6千克,140~150日龄开产,年平均产蛋量150个。

秋高鸭的耐热抗寒性较强,适应性较广,可水面养殖,也可陆地进行旱地养殖。

4. 枫叶鸭 枫叶鸭是由美国美宝公司育成的肉用型鸭配套系。枫叶鸭也含有北京鸭的血统。枫叶鸭体型外貌与北京鸭相似,其突出特

点是肉鸭长羽快,羽毛多(比北京鸭的羽毛多13%左右),有利于肉鸭提前上市。

枫叶鸭49日龄体重2.95千克,饲料转化率为2.7~2.8,胸腿肉率26%~27%,肉鸭上市成活率约95%;成年公鸭体重3.5千克,母鸭体重3.3千克,10个月平均产蛋量可达210个。

谜底:1 束 2 因 3 用 4. 驱
5 中国富强
老农急转弯答案:1 萤火 2. 碾子
3. 演员 4. 画中鸟 5. 宰相(宰相肚中能撑船) 6. 道奥(祸害千年,道奥万年)

2006 年 3 月大 农 历 丙戌年 二月小 三月大	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二
	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五
	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅
				九九	周恩来逝世(1953) 斯大林逝世(1953)	惊蛰	●上弦	国际劳动节 妇女节(1910)				孙中山逝世(1925) 植树节(1979)		马克思逝世 (1883)
记事														

★ 养殖常识

良种肉鸭的选择

由于目前国内市场上的优良肉鸭品种或配套品系较多,在不同地区从事肉鸭生产时,肉鸭生产者需要因地制宜地选择适宜的肉鸭品种或配套系。选择优良肉鸭品种时,需要考虑种源与质量、价格、当地饲养条件、市场需求特点等因素。

1. 种源要可靠,质量要保证 提供肉鸭的种鸭场,其种鸭生产性能高,提供的商品肉鸭规格整齐、质量好,种鸭饲养管理正常,无传染性疾病发生。

2. 价格要合理 应综合考察多家种鸭场同类型肉鸭种销售价格的高低、场家出场价与经销商销售价格的差异、不同购买数量的鸭种

价格差异、鸭种价格性能比等,综合选择肉鸭品种。

3. 适应当地饲养条件 由于不同地区的生态气候与环境条件、肉鸭生产场的场舍与设备水平、各地饲料资源、生产规模等存在较大差异,必须结合当地实际情况,选择能适应本地区生态气候条件的鸭种。

4. 符合市场需求 肉鸭生产如同其他产品的生产一样,应符合当地肉鸭产品消费市场需求。每个肉鸭生产者在制订肉鸭生产规划、从事肉鸭生产之前,必须深入而细致地进行市场调查、了解市场需要,以免发生产销不对路的偏差。

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三月	初二	初三
癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未
○望					春社	春分		●下弦						●朔		

★ 养殖常识

优质种猪应具备的条件

作为种猪,要求体质强健,性征明显,具有种用价值;不胖不瘦,八成膘情;无任何遗传缺陷。公猪、母猪的条件要求略有不同。

1. 公猪应具备的条件 公猪的整体结构要匀称,并且要求体躯长、颈部坚实无过多垂肉、胸宽深、腹部紧缩(不松弛、不下垂)、肩背腰各部结合良好,背部宽平,大型品种允许稍微弓背;腿臀部肌肉发达,四肢结实健壮,无卧系,站立或行走时无内、外“八”字形;睾丸发育良好,轮廓明显,左右大小一致,不允许有单睾、隐睾或阴囊疝,包皮积尿不明显;乳头不少于12个或各品种规定

的最少乳头数,排列整齐均匀,发育正常。

2. 母猪应具备的条件 头颈较轻而清秀,下颌无垂肉,肩部与背部结合良好,背腰平直,肋骨开张,臀部平直,肌肉丰满,尾根高,四肢结实有力,系短,行动灵活,无内、外“八”字形,后腿间距宽;乳头排列整齐均匀,无瞎乳头、翻乳头或无效乳头,大小适中且不少于12个或各品种规定的最少乳头数;外生殖器官发育良好;此外,种猪应产仔多,后代活力强,生长快,发育良好,后代中无遗传缺陷。

2006 年 4 月小 农 历 丙戌年 三月大 四月小	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七
	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
					清明 ●上弦									○望
记事														

★种 稻 经

减少水稻空秕粒的措施

1. 选用高抗、多抗的高产良种
要选用抗病(尤其是抗稻瘟病、白叶枯病和细菌性条斑病)和抗虫(特别是抗稻飞虱)的多抗或高抗良种,避免因病虫害造成空秕粒增多。从生育期来看,以选用较早熟的高产种较为有利,这类品种易避过不良气候条件对稻穗发育的影响。杂交水稻群体由于灌浆期较长,加强其后期管理也是减少空秕粒的重要途径。

2. 促控结合 要准确掌握水稻

生长发育时期,从水稻穗粒生长发育需要出发,合理运用栽培措施,促控结合,使植株既能充分生长又能正常发育。对抽穗前后落黄的水稻,需施“破口肥”,以增强后期叶片的光合能力,从而减少秕粒,增加粒重。而中期施肥应控制水稻群体在开始幼穗分化时不“封行”。根据水稻各生长发育期的需要合理排灌,也是减少空秕粒、提高产量的关键之一。

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	
十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	四月	初二	初三	
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	
					谷雨	●下弦	列宁诞辰 (1870)						●朔			

★种稻经

如何提高水稻的米质

稻米品质包括碾米、外观、蒸煮食味、营养及贮藏等5个方面。优质稻米不仅好看、好吃，而且市场价格高，种植效益好。提高水稻米质最主要的措施是选用优质品种(组合)，除此之外，还要注意如下几点：

1. 控制氮肥施用量 在前期合理施肥的基础上，中期不施用氮肥，孕穗和齐穗期施用少量氮肥，一般亩施尿素2千克为宜。

2. 少施或不施石灰 水稻若吸收钙质过多，稻米食味较差。因此，应少施或不施石灰，增施磷、钾肥。

一般磷肥宜作基肥；钾肥宜在第一次追肥时施下，幼穗分化和孕穗期适量补施，抽穗后作根外追肥。

3 适当晒田 晒田一般宜在分蘖后期进行，到田面出现鸡爪裂纹为止。早稻如遇雨水过多，应抢晴提早晒田。后期可间干间湿，不可过早断水，尤其是杂交水稻，以免降低千粒重，影响产量和米质。

4. 少施或不施农药 在栽培过程中，要对病虫害采取综合防治措施，尽量少施或不施农药，防止农药污染。

2006 年 5 月大 农 历 丙戌年 四月小 五月大	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七
	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
	国际劳动节 (1889)			中国青年节 (1919)	马克思 诞辰(1818) 立夏 ●上弦								○望	
记事														

★种菜经

西兰花反季栽培田间管理技术

与正常栽培季节比较,西兰花反季节栽培的生育期短,环境条件较差,而西兰花的植株大小与花球产量关系密切。因此,在田间管理上,要求施足基肥,及时追肥,促进早返青、快生长。

1. 施肥 为

促进植株在花球形成前形成足够的营养面积,除施足基肥外,还要早追肥、勤追肥。第一次追肥在返青时、定植后 5~7 天进行,以氮、钾肥为主。为提高肥效,肥料应溶于水后淋施。亩施尿素 1.5 千克,氯化钾 0.75 千克。以后每隔 5 天施肥 1 次,施肥量逐渐增加。现蕾期施肥量最多,一般亩施复合肥 6 千克、氯化钾 3 千克。初收期施肥量开始减少,亩施复合肥 3 千克、氯化钾 2 千克。对主、侧花球兼收栽培的,在主花球采收后还须继续追肥。为促进

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三
十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	五月	初二	初三	初四	初五
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申
					●下弦	小满						●朔		宋庆龄逝世 1981		端午节

花球发育,防止空心茎花球产生,花球期还须叶面喷施硼砂,可将硼砂稀释为0.1%的溶液进行喷洒,喷至叶面滴水即可,每隔7天喷1次。

2 淋水 夏秋气温高,蒸腾作用大,一般须早、晚淋水,这样既可提供充足的水分,又可适当降温。生长前期可在中午淋1次水,生长后期则不宜在中午淋水,以免高温高湿导致发病。相反,冬季气温低,为避免淋水引起土温急剧下降,则应在中午前后淋水。

结球期切勿干旱,以免抑制花球的形成,导致产量下降,但大雨后要及时排水,切勿积水,并及时喷杀菌剂,以预防病害的发生及抑制病菌的蔓延。

3. 中耕除草 地面由于农事操作或雨水的冲击引起板结,不利于根系的生长。因此,封垄前一般视情况进行中耕除草,并在土壤干湿适中时结合施肥中耕培土2~3次,中耕时注意避免伤害叶面。

2006 年 6 月小 农 历 丙戌年 五月大 六月小	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三
	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九
	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌
	国际儿童节 1949			●上弦		芒种 入梅						○望		
记事														

★种菜经

苦瓜田间管理技术

1. 肥水管理 苦瓜追肥前期以促其叶茂生长、主枝生长粗壮为度；开始坐果及每次采摘瓜后，要施重肥。苦瓜是耐肥作物，营养供应不足，则瓜形小且畸形，表现不出优良品种的特征。如在追肥中加入腐熟花生麸，则会使瓜色泽更好，提高商品率。水分以保持土壤湿润即可，在晴天无雨的情况下，每3-4天淋水1次。不要采用灌水，以免引起枯萎病、白粉病等病害的发生。

2. 搭架 当植株高30厘米或出现卷须时，要及时搭架引蔓。搭架可采用篱笆式、“人”字架或平架方式。篱笆式适于密植栽培；“人”字架要求沟深且连接于两畦，人可在沟中耕作，其支撑力强且

牢固，抗台风能力较强；如采用平架式栽培，则要在每棵植株旁边插竹竿引蔓上架，同时可在平架下面适当间种叶菜类蔬菜。

3. 整枝除侧蔓 在苦瓜引蔓上架的同时，可将主蔓1米以下的侧枝全部摘除，留较粗壮的侧枝并使其均匀分布。为了促其坐果，要将上部弱小的侧枝摘除。在进入旺盛生长期时，枝叶繁茂，要及时摘除植株下部的黄叶和其他病叶，延长采收时间，提高产量和质量。

4. 中耕培土 苦瓜在上架前可进行适当中耕除草，在上架之后则可用培土的方法压死杂草，并可结合施干肥进行。生长期间也可用除草剂如克芜踪或拉索来防治杂草。

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	
二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	六月	初二	初三	初四	初五	
乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	
			● 下弦			夏至					● 朔					

★ 种 菜 经

温室白粉虱的防治方法

温室白粉虱是蔬菜上的主要害虫,可周年危害,一般以棚室内较多。温室白粉虱有显著的趋嫩性,成虫随植株生长追逐顶部嫩叶产卵,因此植株自上而下分布为卵、若虫和成虫。

具体的防治方法为:

1 农业防治 育苗区和生产区要分开;棚室栽种前要熏杀虫源;通风口要用纱网密封,控制外来虫源;

避免瓜、茄和豆混种;适时摘除老叶;还可利用该虫的趋黄性用黄油板诱杀。

2 药剂防治 可选10%扑虱灵乳油1000倍液、25%灭螨猛乳油1000倍液、21%灭杀毙乳油4000倍液和2.5%天王星乳油2500倍液等喷雾。药液可加0.05%的植物油,以提高防效。

2006 年 7 月大 农 历 丙戌年 六月小 七月大	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九
	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰
	中国共产党成立纪念日(1921) 香港回归祖国纪念日(1997)			●上弦		朱德逝世 (1976)	小暑				○望			
记事														

(2) 人工辅助授粉：如遇较长时间低温阴雨天气，应在清晨进行人工辅助授粉。

(3) 应用植物生长调节剂：如用 15~20 毫升/升的 2,4-D 处理瓜柄，可提高坐果率。

(4) 提供良好的营养生长条件：如植株前期营养生长弱，叶面积小，光合作用力低，则应推迟坐果时间，同时加强肥水管理；如植株生长过旺，则在坐果前要控制肥水，坐果后才继续供给水肥，或采用主蔓打顶，抑制顶端生长，以促进坐果。

(5) 做好瓜实蝇和瓜蓟马的防治工作。

3. 施肥灌溉 整地起畦时要施入大量的有机肥，在畦中间开深沟亩施腐熟农家肥 2 000~3 000 千克、干人畜肥 50 千克、过磷酸钙 50 千克。

冬瓜追肥数量应根据不同时期确定，一般在抽蔓期以前施 20%~30%，后期施 20%~30%，并在结果的前中期施完。施肥要避免在大雨前后，也不要偏施氮肥。冬瓜前期需水较少，以后逐步增多，开花结果需水量最多，晴天要在每天早上淋水一次；结果后期要减少水分供应并注意排水，以减少病害发生。