

第四十册

傷寒門

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

圖書集成醫部全錄

欽定古今書集成醫部全錄第四十冊目錄

卷三百五十一彙考三百五十一

傷寒門十七

李中梓醫宗必讀

- ①總論一 ②傷寒十四證一二 ③類傷寒五證一三 ④表證一三 ⑤裏證一四 ⑥陰證一四 ⑦陽證一四 ⑧六經證治一五 ⑨可汗一五 ⑩不可汗一五 ⑪可吐一六 ⑫不可吐一六 ⑬可下一六 ⑭不可下一六 ⑮用火法一六 ⑯用水法一六 ⑰發熱一七 ⑱惡寒一七 ⑲惡風一七 ⑳自汗一七 ㉑頭痛一八 ㉒身痛一八 ㉓筋惕肉瞤一八 ㉔胃脘滿一八 ㉕結胃一八 ㉖痞一八 ㉗大腹滿一九 ㉘少腹滿一九 ㉙腹痛一九 ㉚咽痛一九 ㉛脅痛一〇 ㉜呃逆一〇 ㉝嘔吐噎一〇 ㉞欬嗽一〇 ㉟喘一二 ㊱煩躁一二 ㊲懊憹一二 ㊳戰慄一二 ㊴悸一二 ㊵渴一三 ㊶口燥咽乾一三 ㊷漱水不欲嚥一三 ㊸發狂一三 ㊹讖語一三 ㊺自利一三 ㊻鬱冒一三 ㊼瘕瘕一三 ㊽動氣一四 ㊾剛瘕柔瘕一四 ㊿手足厥逆一四 ㉑頭眩一四 ㉒衄血一五 ㉓吐血一五 ㉔畜血一五 ㉕下血一五 ㉖小便不利一五 ㉗小便自利一五 ㉘小便數一六 ㉙發黃一六 ㉚

發斑一云 ①狐惑一云 ②多眠一七 ③不得眠一七 ④短氣一七 ⑤虬厥一七 ⑥  
百合病一七 ⑦陰陽易一七 ⑧勞復一六 ⑨食復一六 ⑩過經不解一六 ⑪汗後不  
解一六 ⑫下後不解一六 ⑬合病一六 ⑭併病一六 ⑮兩感一六 ⑯舌胎一六 ⑰  
瘵後昏沉一六 ⑱傷風一六 ⑲傷寒死候一六 ⑳脈候一三

### 卷三百五十二彙考三百五十二

#### 傷寒門十八

張介賓景岳全書

①總名一三 ②初診法一三 ③論脈一四 ④風寒辨一五 ⑤傷寒三證一五 ⑥六經  
證一五 ⑦傳經合病併病辨一五 ⑧陽證陰證辨一七 ⑨三陽陽明證一六 ⑩兩感一  
五 ⑪表裏辨一三 ⑫寒熱辨一三 ⑬論汗一三 ⑭論吐一三 ⑮論下一三 ⑯看目  
一三 ⑰舌色辨一三 ⑱飲水一四 ⑲三陽陰證辨一五 ⑳再論陰證陽證及李子建傷  
寒十勸之害一五 ㉑論傷寒古治法一六 ㉒論古法通變一六 ㉓麻黃桂枝辨一五 ㉔  
論今時皆合病併病一四

### 卷三百五十三彙考三百五十三

#### 傷寒門十九

張介賓景岳全書

- ①治法一四
- ②論虛邪治法一四
- ③補中亦能散表一四
- ④寒中亦能散表一四
- ⑤傷寒三表法一四
- ⑥傷寒無補法辨一四
- ⑦病宜速治一四
- ⑧溫病暑病一四
- ⑨發斑一四
- ⑩發黃一五
- ⑪發狂一五
- ⑫結胃一五
- ⑬厥一五
- ⑭譏語鄭聲一五
- ⑮衄血一五
- ⑯畜血一五
- ⑰熱入血室一五
- ⑱勞力感寒一五
- ⑲動氣一五
- ⑳戰汗一五
- ㉑頭汗一五
- ㉒吐衄一五
- ㉓腹痛一五
- ㉔下利一五
- ㉕小便一五
- ㉖死證一五
- ㉗傷寒逆證賦一六

陳士鐸石室秘錄

- ①治法一六
- ②相吞秘法一六

卷三百五十四彙考三百五十四

傷寒門二十

方一

- ①桂枝湯一七
- ②桂枝加葛根湯一七
- ③桂枝加厚朴杏仁湯一七
- ④桂枝加桂湯一七
- ⑤桂枝加附子湯一七
- ⑥朮附湯一七
- ⑦桂枝加芍藥生薑人參新加湯一七
- ⑧桂枝加芍藥湯一七
- ⑨桂枝去芍藥加附子湯一七
- ⑩桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯一七
- ⑪桂枝甘草龍骨牡蠣湯一七
- ⑫桂枝

- 枝甘草湯一七三 ⑤ 茯苓桂枝甘草大棗湯一七三 ⑥ 茯苓桂枝白朮甘草湯一七三 ⑦ 茯苓甘  
 草湯一七三 ⑧ 炙甘草湯一七三 ⑨ 小建中湯一七三 ⑩ 麻黃湯一七三 ⑪ 大青龍湯一七三 ⑫  
 小青龍湯一七三 ⑬ 桂枝麻黃各半湯一七三 ⑭ 桂枝二麻黃一湯一七三 ⑮ 桂枝二越婢一湯  
 一七三 ⑯ 桂枝去桂加茯苓白朮湯一七三 ⑰ 麻黃杏仁甘草石膏湯一七三 ⑱ 葛根湯一七三  
 ⑲ 葛根加半夏湯一七三 ⑳ 葛根黃連黃芩湯一七三 ㉑ 麻黃升麻湯一七三 ㉒ 麻黃連軹赤小  
 豆湯一七三 ㉓ 麻黃附子細辛湯一七三 ㉔ 麻黃附子甘草湯一七三 ㉕ 桂枝附子湯一七三 ㉖  
 去桂枝加白朮湯一七三 ㉗ 甘草附子湯一七三 ㉘ 桂枝人參湯一七三 ㉙ 小柴胡湯一七三 ㉚  
 柴胡桂枝湯一七三 ㉛ 柴胡桂枝乾薑湯一七三 ㉜ 柴胡加芒硝湯一七三 ㉝ 柴胡加龍骨牡蠣  
 湯一七三 ㉞ 大柴胡湯一七三 ㉟ 四逆散一七三 ㊱ 五苓散一七三 ㊲ 文蛤散一七三 ㊳ 豬苓湯  
 一七三 ㊴ 牡蠣澤瀉散一七三 ㊵ 大承氣湯一七三 ㊶ 小承氣湯一七三 ㊷ 調胃承氣湯一七三  
 ㊸ 麻仁丸一七三 ㊹ 蜜煎導一七三 ㊺ 豬膽汁導一七三 ㊻ 二白散一七三 ㊼ 茵陳蒿湯一七三  
 ㊽ 十棗湯一七三 ㊾ 大陷胷湯一七三 ㊿ 大陷胷丸一七三 ① 小陷胷湯一七三 ② 桃核承氣湯  
 一八二 ③ 抵當湯一八二 ④ 抵當丸一八二 ⑤ 瓜蒂散一八二 ⑥ 梔子豉湯一八二 ⑦ 梔子甘草  
 豉湯一八二 ⑧ 梔子生薑豉湯一八二 ⑨ 梔子厚朴湯一八二 ⑩ 梔子乾薑湯一八二 ⑪ 枳實梔  
 子豉湯一八二 ⑫ 梔子棗皮湯一八二 ⑬ 半夏瀉心湯一八二 ⑭ 大黃黃連瀉心湯一八二 ⑮ 附  
 子瀉心湯一八二 ⑯ 生薑瀉心湯一八二 ⑰ 甘草瀉心湯一八二 ⑱ 黃芩湯一八二 ⑲ 黃芩加半  
 夏生薑湯一八二 ⑳ 黃連湯一八二 ㉑ 乾薑黃連黃芩人參湯一八二 ㉒ 黃連阿膠湯一八二 ㉓  
 白頭翁湯一八二 ㉔ 竹葉石青湯一八二 ㉕ 白虎湯一八二 ㉖ 白虎加人參湯一八二 ㉗ 四逆湯  
 一八二 ㉘ 茯苓四逆湯一八二 ㉙ 四逆加人參湯一八二 ㉚ 通脈四逆湯一八二 ㉛ 四逆加豬膽

汁湯—八五 ㊟白通湯—八五 ㊟白通加豬膽汁湯—八五 ㊟附子湯—八五 ㊟芍藥甘草附子湯—八五 ㊟乾薑附子湯—八六 ㊟真武湯—八六 ㊟理中湯—八六 ㊟理中丸—八六 ㊟甘草乾薑湯—八七 ㊟烏梅丸—八七 ㊟吳茱萸湯—八七 ㊟當歸四逆湯—八七 ㊟四逆加吳茱萸生薑湯—八七 ㊟桃花湯—八七 ㊟赤石脂禹餘糧湯—八七 ㊟旋覆代赭石湯—八六 ㊟厚朴生薑甘草半夏人參湯—八六 ㊟芍藥甘草湯—八六 ㊟甘草湯—八六 ㊟旋覆代赭石湯—八六 ㊟厚朴廣湯—八六 ㊟苦酒湯—八六 ㊟半夏散—八六 ㊟半夏湯—八六 ㊟桔梗湯—八六 ㊟猪母湯—八六 ㊟百合滑石代赭湯—八六 ㊟半夏散—八六 ㊟燒裊散—八六 ㊟百合知母湯—八六 ㊟百合滑石代赭湯—八六 ㊟百合雞子湯—八六 ㊟百合地黃湯—八六 ㊟百合滑石散—八六 ㊟百合洗方—八六 ㊟大橘皮湯—八六 ㊟狐惑熏方—八六 ㊟赤小豆當歸散—八六 ㊟升麻龍甲湯—八六 ㊟紫石寒食散—八六

## 卷三百五十五彙考三百五十五

### 傷寒門二十一

#### 方二

㊟洛陽湯—九一 ㊟五勝散—九一 ㊟欬逆方—九一 ㊟青膏—九一 ㊟黃膏—九二 ㊟白膏—九二 ㊟度瘵發汗青散—九二 ㊟崔文行解散—九二 ㊟六物青散—九二 ㊟青散—九三 ㊟詔書發汗白薇散—九三 ㊟葦朮赤散—九三 ㊟赤散—九三 ㊟水解散—九三 ㊟六物解肌湯—九四 ㊟解肌湯—九四 ㊟解肌升麻湯—九四 ㊟葛根龍膽湯—九四 ㊟又方—九四 ㊟七物黃

- 連湯一〇七 ②三七湯一〇九 ③五香麻黃湯一〇九 ④又方一〇九 ⑤雪煎一〇九 ⑥神丹丸一〇九 ⑦麥奴丸一〇九 ⑧水導散一〇九 ⑨生地黃湯一〇九 ⑩大柴胡成疰知母湯一〇九 ⑪又方一〇九 ⑫寒駛破丸一〇九 ⑬四物甘草湯一〇九 ⑭大青湯一〇九 ⑮苦參湯一〇九 ⑯凝雪湯一〇九 ⑰苦蘆湯一〇九 ⑱蘆根飲子一〇九 ⑲又方一〇九 ⑳又方一〇九 ㉑猪膽湯一〇九 ㉒鼻衄方一〇九 ㉓咽痛方一〇九 ㉔又方一〇九 ㉕煎方一〇九 ㉖又方一〇九 ㉗又方一〇九 ㉘又方一〇九 ㉙麥門冬湯一〇九 ㉚神效沃雪湯一〇九 ㉛桔梗枳殼湯一〇〇 ㉜茵陳蒿大黃湯一〇〇 ㉝茅根湯一〇〇 ㉞茵陳五苓散一〇〇 ㉟雄黃丸一〇〇 ㊱訶黎勒丸一〇一 ㊲黃連丸一〇一 ㊳訶黎勒飲一〇一 ㊴燥腸丸一〇一 ㊵杜仲酒一〇一 ㊶二溼湯一〇一 ㊷人參湯一〇一 ㊸牡蠣散一〇一 ㊹羚羊角丸一〇二 ㊺威蕤湯一〇二 ㊻扶神散一〇二 ㊼龍商丸一〇二 ㊽柴胡湯一〇二 ㊾龜甲散一〇二 ㊿又方一〇二 ㊽補肺散一〇二 ㊾非根散一〇二 ㊿六君子湯一〇三 ㊽養脾湯一〇三 ㊾補脾散一〇四 ㊿健脾散一〇四 ㊽熱病方一〇四 ㊾羚羊角散一〇四 ㊿鐵粉丸一〇四 ㊽生地黃煎一〇四 ㊾刺薊飲子一〇五 ㊿龍膽煎一〇五 ㊽青葙子丸一〇五 ㊾解毒犀角丸一〇五 ㊽白鮮皮散一〇五 ㊾藍葉散一〇五 ㊿茵陳散一〇六 ㊽承氣丸一〇六 ㊾木通散一〇六 ㊽石葦散一〇六 ㊿人參養胃湯一〇六 ㊽養香正氣散一〇六 ㊾不換金正氣散一〇七 ㊽正陽散一〇七 ㊿麻黃杏仁飲一〇七 ㊽香蘇飲一〇七 ㊾芎芷香蘇飲一〇七 ㊽十神湯一〇七 ㊿人參敗毒散一〇七 ㊽香葛湯一〇八 ㊾葱白散一〇八 ㊿參蘇飲一〇八 ㊽神朮散一〇八 ㊿消風百解散一〇八 ㊽雙解散一〇八 ㊿三一承氣湯一〇八 ㊽六一順氣湯一〇九 ㊿陶氏黃龍湯一〇九 ㊽

卷三百五十六彙考三百五十六

傷寒門二十二

方二

- 正陽散—二〇
- 破陰丹—二〇
- 復陽丹—二〇
- 還陽散—二〇
- 退陰散—二〇
- 三黃石膏湯—二〇
- 三黃巨勝湯—二〇
- 霹靂散—二〇
- 回陽返本湯—二〇
- 陽毒升麻湯—二〇
- 陽毒毒梔子湯—二〇
- 葛根湯—二二
- 芍藥甘草湯—二二
- 陶氏益元湯—二二
- 陶氏升陽散火湯—二二
- 甘李根湯—二二
- 三白飲—二二
- 龍散—二二

- 大羌活湯—二三
- 陶氏沖和湯—二三
- 葛根解肌湯—二三
- 九味羌活湯—二三
- 四順理中湯—二四
- 四順理中丸—二四
- 治中湯—二四
- 三黃熟艾湯—二四
- 雞白湯—二四
- 附子散—二四
- 白朮散—二四
- 回陽救急湯—二五
- 陽旦湯—二五
- 陰旦湯—二五
- 五積散—二五
- 辛黃三白湯—二五
- 黃連解毒湯—二五
- 柴芩湯—二五
- 柴胡連翹湯—二六
- 知母麻黃湯—二六
- 麥胡芍藥湯—二六
- 奪命湯—二六
- 鼈甲散—二六
- 陶氏柴胡百合湯—二六
- 麥門冬湯—二七
- 鼠屎豉湯—二七
- 梅枝枳黃湯—二七
- 七味葱白散—二七
- 益氣養神湯—二七
- 蝦鼠糞湯—二七
- 青竹茹湯—二七
- 竹皮湯—二八
- 乾薑湯—二八
- 竹皮逍遙散—二八



- ①人參逍遙散—二八 ②桂枝紅花湯—二八 ③五味子湯—二八 ④陶氏導赤各半湯—二八 ⑤黃連犀角湯—二八 ⑥桃仁湯—二八 ⑦雄黃銳散—二九 ⑧酸棗仁湯—二九 ⑨烏梅湯—二九 ⑩辰砂五苓散—二九 ⑪辰砂益元散—二九 ⑫溫經益元湯—二九 ⑬陶氏再造散—二九 ⑭附子理中湯—二九 ⑮朮附湯—三〇 ⑯回陽湯—三〇 ⑰防風沖和湯—三〇 ⑱沖和散—三〇 ⑲沃雪湯—三〇 ⑳升麻葛根湯—三〇 ㉑加味益氣湯—三〇 ㉒陶氏補中益氣湯—三〇 ㉓十味和解散—三三 ㉔加減白虎湯—三三 ㉕靈砂—三三 ㉖金液丹—三三 ㉗至聖來復丹—三三 ㉘加味理中湯—三三 ㉙代灸塗臍膏—三三 ㉚衝寒散—三三 ㉛大補元煎—三三 ㉜左歸飲—三三 ㉝右歸飲—三三 ㉞五福飲—三三 ㉟一陰煎—三三 ㊱加減一陰煎—三三 ㊲二陰煎—三三 ㊳三陰煎—三三 ㊴大營煎—三三 ㊵小營煎—三三 ㊶補陰益氣煎—三四 ㊷金水六君煎—三四 ㊸大和中飲—三四 ㊹小和中飲—三四 ㊺小分清飲—三四 ㊻百順丸—三四 ㊼一柴胡飲—三四 ㊽二柴胡飲—三四 ㊾三柴胡飲—三五 ㊿四柴胡飲—三五 ①五柴胡飲—三五 ②正柴胡飲—三五 ③麻桂飲—三五 ④大溫中飲—三五 ⑤柴陳煎—三六 ⑥柴苓煎—三六 ⑦柴胡白虎煎—三六 ⑧歸葛飲—三六 ⑨抽薪飲—三六 ⑩徙薪飲—三六 ⑪大分清飲—三六 ⑫玉女煎—三六 ⑬玉泉散—三六 ⑭四味回陽飲—三七 ⑮六味回陽飲—三七 ⑯理陰煎—三七 ⑰養中煎—三七 ⑱溫胃飲—三七 ⑲五君子煎—三七 ⑳胃關煎—三七 ㉑煖肝煎—三六 ㉒審結智法—三六

卷三百五十七彙考三百五十七

傷寒門二十三

單方

鍼灸

導引

卷三百五十八彙考三百五十八

傷寒門二十四

醫案

一元

一元

一元

一元

一元

一元



# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考三百五十一

### 傷寒門十七

#### 明李中梓醫宗必讀

##### ○總論

愚按冬氣嚴寒，萬類潛藏，君子固密，則不傷於寒。固密者，毋勞爾形，毋搖爾神，形神並守，潛行於閉，墊封藏之也。若也，一有不謹而犯寒威，則殺厲之毒，乘於肌體，冬月即發，名正傷寒，伏而不發，至春變溫，至夏變熱，變能不測，殊可憂虞。治之或差，生殺反掌。自仲景以來，名賢代起，立言不詳，患其多而惑也。陶節庵曰：「得其要領，易於拾芥，脈證與理而已求之多岐，則支離繁碎，如涉海問津矣。」脈證者，表裏陰陽虛實寒熱也。理者，知其常通其變也多岐者，蔓衍之方書也。余有感於斯言，約六法以盡之，曰汗吐下溫清補汗者，治在表也，而汗法有三：一曰溫散寒勝之時，陰勝之臟，陽氣不充，則表不解，雖身有大熱，必用辛溫；一曰涼解，炎熱熾盛，表裏枯潤，陰氣不營，亦不能汗，宜用辛涼；一曰平解，病在陰陽之間，既不可溫，又不可涼，但宜平用，期於解表而已。吐者，治在上也，吐中有發散之意，可去胃中之實。經曰：「在上者，因而越之。」是也。下者，攻其裏也，而下法有五，痞滿在氣，燥實在血，四證具者，攻之宜峻也，但見滿燥實者，攻之稍緩；但見痞實者，攻之更緩；或行畜血，或逐停水，輕重緩急，隨證變通也。溫者，溫其中

也。臟有寒邪，不溫則死。夫氣爲陽，氣虛則寒，故溫卽是補。又名救裏者，以陽虛可危，亟當救援也。清者，清其熱也。有熱無結，本非下證。若不清之，熱何由散？下後餘邪亦宜清也。補者，救其虛也。古人言之已詳，今人畏而不用，使傷寒犯虛者坐而待斃，大可憾已。如屢散而汗不解，陰氣不能達也。人知汗屬於陽，升陽可以解表，不知汗生於陰，補陰可以發汗也。又如內熱不解，屢清而火不退，陰不足也。人知寒涼可以去熱，不知壯水可以制火也。又如正虛邪熾，久而不痊，補正則邪自除。溫中則寒自散，此必見衰微之陰脈者也。傷寒論曰：「陰證得陽脈者生，陽證得陰脈者死。」人皆奉其言，未知釋其義。夫正氣實者，多見陽脈，正氣虛者，多見陰脈，證之陽者假實也，脈之陰者真虛也。陳氏曰：「凡察陰證，不論熱與不熱，惟憑脈用藥，至爲穩當。不論浮沉大小，但指下無力，重按全無，便是伏陰。然則沉小者，人知爲陰脈，不知浮大者亦有陰脈也。是知傷寒雖具萬變，虛實二字可以提綱。正勝則愈，邪勝則死。正氣實者，雖感大邪，其病亦輕。正氣虛者，雖感微邪，其病亦重。氣實而病者，攻之卽愈。雖不服藥，經盡則安，何足慮也。所可慮者，惟挾虛耳。奈何庸淺之輩，不察虛實，但見發熱動手便攻，虛而攻之，無不死者。且曰：「傷寒無補法。」謬之甚矣。獨不觀仲景立三百九十七法，而治虛寒者，一百有奇，垂一百一十三方，而用人參桂附者八十有奇，東垣丹溪節庵亦有補中益氣、回陽返本、溫經益元等湯，未嘗不補也。而謂傷寒無補法可乎？天實者不藥可愈，虛者非治弗痊，能察其虛而補救者，卽握傷寒之要矣，又何必求之多岐也哉！

○傷寒十四證

傷寒者，寒傷營血，脈浮而緊，頭痛發熱，無汗惡寒。

傷風者，風傷衛氣，脈浮而緩，頭痛發熱，有汗惡風。

傷寒見風者，旣傷於寒，復感風邪，惡寒不躁，其脈浮緩。

傷風見寒者，旣傷於風，復感寒邪，惡風煩躁，其脈浮緊。以上四證，皆冬月卽病者。

溫病者，冬受寒邪，來春乃發，發熱頭疼，不惡寒而渴，脈浮數。

溫瘧者，冬受寒邪，復感春寒。

風溫者，冬受寒邪，復感春風，頭痛身熱，自汗身重，嘔噦欲眠，語言難出，四肢不收，尺寸俱浮。

溫疫者，冬受寒邪，復感春溫時行之氣。

溫毒者，冬受寒邪，春令早熱，復感其邪。以上五證，皆冬傷於寒而病發於春，皆有溫之名也。

熱病者，冬傷於寒，至夏乃發，頭疼身熱，惡寒，其脈洪盛。

傷暑者，暑熱爲邪，目汗煩渴，身熱脈虛。

傷濕者，感受濕邪，身重而痛，自汗身不甚熱，兩脛逆冷，四肢沉重，胃腹滿悶。

風濕者，既受濕氣，復感風邪，肢體重痛，額汗脈浮。

瘧者，身熱足寒，頭項強急，面赤目赤，口噤頭搖，角弓反張，若先受風邪，復感於寒，無汗惡寒爲剛瘧；先受風邪，復感

於濕，惡風有汗爲柔瘧。

①類傷寒五證

一曰痰；中脘停痰，憎寒發熱，自汗胃滿，但頭不痛，項不強，與傷寒異耳。一曰食積；胃中停食，發熱頭痛，但身不痛，氣口緊盛，與傷寒異耳。一曰虛煩；氣血俱虛，煩躁發熱，但身不痛，頭不痛，不惡寒，不浮緊，與傷寒異耳。一曰脚氣；足受寒濕，頭痛身熱，肢節痛，便閉嘔逆，但脚痛或腫滿，或枯細，與傷寒異耳。一曰內癰；脈浮數，當發熱而惡寒，若有痛處，飲食如常，畜積有膿也。胃中痛而欬，脈數咽乾，不渴，濁唾腥臭，肺癰也。小腹重按之痛，便數如淋，汗出惡寒，身皮甲錯，腹皮腫急，脈滑而數，腸癰也。胃脘痛，手不可近，胃脈細，人迎盛者，胃脘癰也。以人迎盛而悞認傷寒者，禁其飲食，必死。

②表證

發熱惡寒，惡風，頭痛，身痛，腰脊強，日痛，鼻乾不眠，骨節痛，耳聾，寒熱，嘔，脈浮而大，或緊或緩，有汗，脈浮緩無力，表虛。

也；無汗，脈浮緊，表實也。

⑤裏證

不惡寒，反惡熱，掌心腋下汗出，腹中鞭滿，大便不通，腹痛腹鳴，自利，小便如常，讞語潮熱，咽乾口渴，舌乾煩滿，囊縮而厥，唇青舌卷，脈沉細或沉實，若腹鳴自利不渴，唇青舌卷，無熱惡寒，下利清穀，身痛脈沉微，裏虛也。腹中鞭大便閉，讞語潮熱，腹痛不惡寒，反惡熱，掌心腋下汗出，咽燥，裏實也。表裏俱見，屬半表半裏，表裏俱無不可汗下，小柴胡湯隨證加減。

⑥陰證

身靜氣短少息，目不了了，鼻中呼不出，吸不入，水漿不入，二便不禁，面如刀割，色青黑，或喜向壁臥，閉目不欲見人，鼻氣自冷，唇口不紅，或白或青或紫，手足冷，指甲青紫，小便白或淡黃，大便不實，手重按無大熱，若陰重者，冷透手也。

陰毒者，腎本虛寒，或傷冷物，或感寒邪，或汗吐下後，變成陰毒，頭痛，腹中絞痛，眼睛痛，身體倦怠而不甚熱，四肢逆冷，額上背有冷汗，恍惚身痛如被杖，虛汗不止，鄭聲嘔逆，六脈沉微，或尺衰寸盛，五日可治，六七日不可治。

陰證似陽者，煩躁面赤，身熱咽痛，煩渴，脈浮微，手足冷，大便泄，小便清，昏沉多眠，又有身熱，反欲得衣，口不渴，指甲黑，此陰盛於內，真陽失守也。

⑦陽證

身動氣高而喘，目睛了了，呼吸能往能來，口鼻氣熱，面赤唇紅，口乾舌燥，讞語，能飲涼水，身輕如常，小便赤，大便閉，手足溫，指甲紅。

陽毒者，邪熱深重，失汗失下，或誤服熱藥，熱毒散漫，舌卷焦黑，鼻中如烟煤，咽喉痛甚，身面錦斑，狂言直視，踰垣上屋，登高而歌，乘衣而走，脈洪大滑促，五日可治，六七日不可治。或昏噤咬牙，見鬼神，吐膿血，藥入即吐。

陽證似陰者，手足冷，大便閉，小便赤，煩悶昏迷不眠，身寒却不欲衣，口渴指甲紅，脈沉滑，或四肢厥冷，此陽極於內，真陰失守也。陰厥脈沉弱，指甲青而冷，陽厥脈沉滑，指甲紅而溫。

### ④六經證治

足太陽膀胱，此經從頭項貫腰脊，故頭痛惡寒，發熱脊強，然風與寒常相因，寒則傷營，惡寒頭痛，脈浮緊而無汗，用麻黃湯開發腠理以散寒，得汗而愈。風則傷衛，惡風頭痛，脈浮緩而有汗，用桂枝湯充塞腠理以散風，止汗而愈。若夫風寒兼受，營衛俱傷，用大青龍湯。此三湯者，冬月天寒腠密，非辛溫不能發散，故宜用也。若春溫夏熱之證，皆用羌活沖和湯辛涼解之。傳至陽明，則日痛鼻乾不眠，以葛根湯升麻湯治之。然此經有在經在腑之別，如日痛鼻乾，微惡寒，身熱脈浮洪，病在經也。潮熱自汗，讖語發渴，大便閉，揭去衣被，手揚足擲，發斑發黃，狂亂惡熱，脈沉數，病在腑也。傳至少陽，則寒熱而嘔，胃脘痛，口苦耳聾，此爲半表半裏之經表證。多者小柴胡湯，裏證急者大柴胡湯。過此不已，則傳陽明之腑，表證悉罷，名爲入裏，惡熱讖語，口燥咽乾，不大便，脈沉實如痞滿燥實，四證皆具，三焦俱傷，宜大承氣湯。但見痞燥實三證，邪在中焦，宜調胃承氣湯。不用枳朴，恐傷上焦之氣也。但見痞實二證，邪在上焦，宜小承氣湯。不用芒硝，恐傷下焦之血也。小腹急，大便黑，小便不利，如狂喜忘，畜血證也。宜桃仁承氣湯。傳至三陰，四肢厥冷，腹痛吐瀉，口吐冷涎，畏寒戰慄，面如刀割，引衣踰臥，脈見遲軟，急宜溫之。輕者理中湯，重者四逆湯。或初病起不發熱，便見寒證者，名爲直中陰經，亦以二湯主之。以上各經治法，一見表證即與汗之一見裏證即與下之一見虛寒即與溫補，但當以脈證爲據，不可以日數爲拘也。

### ⑤可汗

頭痛項強，肢印腰背俱強，身疼拘急，惡寒發熱，無汗脈浮數或浮緊，皆可汗。若汗後不解，仍發熱脈浮，須再汗之。

### ⑥不可汗

無表證者不可汗。脈沉不可汗。尺脈遲不可汗。脈微弱者，雖惡寒不可汗。咽中閉塞者不可汗。諸動氣者不可汗。淋



寒不可汗。亡血虛家不可汗。厥者不可汗。汗家不可重汗。太陽與少陽併病頭項強痛，或眩冒心下痞，不可汗。脈弦細頭痛而熱，屬少陽，不可汗。

㊟可吐

病在膈上者可吐。汗下後虛煩懊憹者可吐。

㊟不可吐

脈虛者不可吐。厥逆者不可吐。膈上寒乾嘔者，宜溫不宜吐。

㊟可下

汗後不解，邪傳胃腑，可下。潮熱腹痛脈實者可下。陽明多汗，讞語，有燥糞，可下。潮熱手足腋下汗出讞語者可下。吐後腹滿者可下。凡臍腹硬，或痛不可按者可下。下後不解，臍腹硬痛者可再下。結胸脈不浮，可下。少陰病下利清水，色青者，心下必痛，口乾者可下。太陽證熱結膀胱，小便不利，小腹急結，其人如狂者，畜血也，可下。陽明證其人喜忘，大便黑，必有瘀血，可下。陽明無汗，小便不利，心中懊憹，必發黃，可下。

㊟不可下

表未解者不可下。腹脹可按而減者不可下。諸虛者不可下。陽微者不可下。咽中閉塞者不可下。諸動氣者不可下。脈弱者不可下。脈浮大者不可下。小便清白者不可下。陽明病面赤，心下雖鞭滿，不可下。

㊟用火法

以火燒地，布桃葉柏葉亦可，設席置病人於上，卽汗出，或酢炒香附熱熨，背背卽汗，或置火於牀下，或艾灸。

㊟用水法

傷寒思飲水爲欲愈，若不與則不愈，若恣飲則水停，宜以新汲水少與之，待再思再與，熱甚者，以青布浸新汲水中，置病人背前，熱則易之。甚者置病人於水中，或浸手足，或漱口，若表未解及陰證似陽者忌之。