

全国中草药新医疗法展览会

技术资料选编

（计划生育、妇产科疾病）

江苏省镇江市革命委员会生产指挥组科技组翻印

一九七一年十月

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员,组成巩固的统一战线,为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

前 言

在无产阶级文化大革命伟大胜利的推动下，在党的“九大”精神鼓舞下，我国医药卫生战线形势一派大好。广大医药卫生人员高举毛泽东思想伟大红旗，狠批叛徒、内奸、工贼刘少奇的反革命修正主义卫生路线，坚决落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示，涌现出许多认真学习毛泽东思想的先进集体和先进事迹，各项工作取得了很大的成绩。

毛泽东思想的光辉照亮了我国医疗卫生事业发展的道路。当前，我国广大城乡，以除害灭病为中心的爱国卫生运动，波澜壮阔，滚滚向前；深受贫下中农欢迎的合作医疗制度不断巩固和发展；数以百万计的“赤脚医生”队伍在毛泽东思想哺育下茁壮成长。遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的伟大教导，在各级革委会的领导下，在解放军的带动下，广泛开展了用中草药、新医疗法防治常见病、多发病的群众运动。在群众运动中，广大医药卫生人员运用毛主席的哲学思想指导医疗实践，发掘、继承祖国医学遗产，走中西医结合的道路，创造了世界医学史上旷古未有的奇迹。这是无产阶级文化大革命的丰硕成果，是毛泽东思想的伟大胜利！

在这一伟大胜利的凯歌声中，“全国中草药新医疗法展览会”于一九七〇年十二月在北京举行。

为了满足广大群众的需要，我们将全国各地报送展览会的有关技术资料选编成册（按内容分成若干分册，在展览期间陆续发行，最后汇成总集），以便于广大工农兵群众，“赤

脚医生”和革命医务人员交流经验，进一步在三大革命运动中总结提高，为创造中国的新医学、新药学而奋斗！

由于我们认真学习毛泽东思想不够，选编工作中定有不少错误和缺点，希望同志们批评指正。

全国中草药新医疗法展览会

一九七〇年十二月

编辑说明

一、本《选编》广泛地选载了全国送展材料中的技术资料。为了便于交流，我们注明了材料来源（有的省、市没有报具体单位，只能注以省、市名）。

二、为了便于推广，防止同名异物、同物异名而用错药，我们根据送展标本进行了植物鉴定，并在相应的材料末尾注以学名（未送标本者，暂缺，一般常用中药不加注）。

三、东北三省所报材料中的中草药剂量用的是十两制，我们是照原样收载的，请使用时注意。

目 录

计划生育

中草药避孕.....	(1)
新药避孕.....	(4)
关于避孕环放置年限的探讨.....	(14)
中草药引产.....	(15)
针刺人工流产.....	(17)
中草药绝育.....	(18)
尿中孕二醇测定的技术革新.....	(21)
快速乳凝法妊娠诊断.....	(22)
陶磁凹板妊娠免疫学测定法.....	(23)

妇产科疾病

白带.....	(26)
外阴炎.....	(28)
阴道炎.....	(29)
宫颈糜烂.....	(31)
盆腔炎.....	(33)
功能性子宫出血.....	(34)
痛经.....	(37)
子宫脱垂.....	(38)
妊娠呕吐.....	(40)
产后病症.....	(40)

计 划 生 育

中草药避孕

用途：避孕。

方药：马蔺子。

制法：上药研末，取50克加水500毫升，煎30分钟左右，加黄酒250毫升，再煎10分钟即得。

用法：上药煎液分成6份，分娩后1~3天或月经来后第一天起开始服用，每天早晚各服一次，汤渣一起服，3天服完。服药后15天内不同房。以相同服法，每半年服一次。

效果：观察25例，有效24例，无效1例。最长观察6个月。

材料来源：河北省邯郸地区抗大农校医务室，成安县防治院。

注：1.原材料记载服药人数252例，其中有效的245例，占97.2%，无效7例，占2.8%，因为没有详细谈到观察多少时间，所以对效果不易判断，仅供参考。唯一观察时间长的1例介绍如下：

魏××，39岁。共生6胎，还做过2次人工流产。从1965年开始连续服药3年，共服药5次，每6个月服1次，直至1970年末怀孕。

2. 马蔺子为鸢尾科植物马蔺 *Iris Pallasii* Fisch.

var. chinensis Fisch.的种子。又名马连子。

3. 个别妇女服药后有月经推迟数天和月经量增多现象。

用途：避孕。

方药：鹿含草。

用法：将上药放瓦片上焙干研末备用。服法有二：1.来经当天空腹服一次，用黄酒吞服三钱，每月一次，连服4~5个月。2.来经第一天和经净后各服三钱，连服3个月。

效果：观察70例，63例未孕。5例是服药一个月怀孕，1例是连服3个月后停药怀孕，另1例未按空腹服药的规定。观察时间最长8个月，最短2个月。

材料来源：浙江省东阳县巍山区卫生院。

注：1.鹿含草为鹿蹄草科植物鹿蹄草 *Pyrola japonica* klenze 或 *Pyrola elliptica* Nutt., 以全草入药。

2.服鹿含草后，普遍月经量减少，经期从原来的4~7天缩短为2~4天。

用途：避孕。

方药：柿蒂。

制法：取带柄柿蒂四至七枚，在瓦片上焙干存性，压粉。

用法：上述柿蒂粉，在月经干净后1~2天内，用黄酒一两送服。该单位认为服一次，可避孕一年。

注意事项：1.所用柿蒂必须带柄；2.粉碎过程中忌用铁器；3.服药后24~48小时内忌房事。3.避孕期间忌食柿子，柿饼，元枣。

效果：试用249例，追访13例，共351个月经周期（其中157个周期的1例，48个周期1例，30个周期1例，24个周期2例，12个周期2例，19个周期1例，7个周期1例，6个周期1例，5个周期2例，2个周期1例），认为有效。

材料来源：天津市塘沽区卫生院。

用途：避孕。

方药：白杨树根、蓝开花柴（蓝映山红）根各二至三两。

用法：每月于月经干净后水煎服，每天一剂，连服2~3天。

效果：当月服药，可致当月不孕。曾观察20例，均有效。

材料来源：湖南省黔阳地区。

注：蓝开花柴为杜鹃花科杜鹃花属Rhododendron 植物蓝映山红。小灌木，茎、枝为褐色，密生褐色刚毛。叶互生，有叶柄，叶片长3~9厘米，宽1.5~3.5厘米，椭圆形，端尖或尾尖，基部阔楔形，全缘，革质，幼叶两面密生褐色刚毛，老时叶上面的毛渐脱。

用途：避孕。

方药：不孕子（黄麻子）八钱至一两，糯米酒六两至半斤。

用法：将成熟的不孕子和酒放入碗内，燉1小时以上即可。于月经来潮的第五天晚上睡前顿服，第二个月在同时再服一次（或在产后满月时服一次，第二个月在同时再服一次）。少数服药后呕吐者，可将一次量于次日分二次补服，即中午和晚上各服一次，以避免呕吐。在服药期间，尚须用其他方法避孕一个月左右。

中效效果：观察7例，有效6例，另1例因服不成熟的种子而失败。另有400例，观察2~5个月，未发现有怀孕，但由于观察时间较短，尚须进一步总结。

举例：雷××，35岁。19岁至31岁共生育6胎，31岁在生育最后一胎满月时服药，服药后无反应，月经正常。至今已4年末再生育。

材料来源：福建省福鼎县。


注：1.不孕子为椴树科植物黄麻 *Corchorus capsularis* L. 的成熟种子，不成熟种子效果不佳。

2.有人于服不孕子后，发生暂时性的闭经现象，但不需处理，可以自行恢复。

新 药 避 孕

用途：女用口服短效避孕。

药物：炔诺酮（17 α -乙炔基-17 β -羟基-19-去甲基-4 α -雄烯-3-酮）每片含5毫克。



炔诺酮

用法：从探亲第一天起每天口服一片，探亲14天连服

14天。


副作用：有反应者占2.6%，主要有轻度恶心，呕吐。

效果：共观察680周期，其中8周期失败。成功率为98.8%。

材料来源：天津医学院附属医院。

用途：女用口服短效避孕。

药物：口服避孕片I号（复方炔诺酮）：每片含炔诺酮0.625毫克，炔雌醇（乙炔雌二醇）0.035毫克。



炔雌醇（乙炔雌二醇）

用法：从月经来潮当天算起的第五天开始服药，每天一片，连续服22天，不能间断，服完后3天左右即来月经，于月经的第5天再服下一个月的药，服药的当月可以避孕，因此需要逐月服用。

副作用：少数人出现恶心、头昏、乏力、嗜睡等类似早孕反应以及不规则阴道出血，偶有呕吐，乳胀，皮疹，但反应都很轻，可自行消失。

禁忌：急慢性肝炎、肾炎者不宜用。对患有子宫肌瘤、高血压，有肝、肾病史但现无症状者，须在医务人员指导下


服用。

效果：按规定服药，几乎全部有效。

材料来源：上海第七制药厂。

用途：女用口服短效避孕。

药物：口服避孕片Ⅱ号（复方甲地孕酮片）：每片含甲地孕酮（17- α -羟基-6-甲基孕烷--4，6-二烯-3，20-二酮-17-醋酸酯）1.0毫克，炔雌醇0.035毫克。



甲地孕酮

用法：从月经来潮当天算起的第五天开始服药，每天一片，连服22天，不能间断，服完后三天左右即来月经，于月经的第五天再服下一个月的药，服药的当月可避孕，因此需逐月服用。


副作用：仅少数人在初服药时，有类似早孕反应及不规则出血，偶有呕吐，乳胀，皮疹。这些反应都较轻，可自行消失。

效果：如按规定服药，几乎全部有效。


材料来源：上海第七制药厂，四川省成都制药一厂。

用途：女用口服短效避孕。

药物：避孕片18-甲基炔诺酮(简称18-甲)每片含18-甲基炔诺酮0.3毫克和乙炔雌二醇0.03毫克。



18-甲炔诺酮



炔雌醇(乙炔雌二醇)

用法：每月服药22天，第一次于来月经第五天开始服药，每天一次，连服22天，停药数天后来月经，以后于每次来月经第五天，按首次服药方法服用。

副作用：少数人有恶心、头晕、呕吐、乳房发胀等反应，均不严重，不影响劳动和工作。

禁忌：肝炎、肾炎患者，子宫或乳房有肿瘤者忌用。

效果：效果可靠，副作用轻，闭经和突破性出血发生率极少，月经周期比较准，比目前普遍使用的I号和II号避孕药均好。几乎百分之百有效，只偶见个别失败。

材料来源：北京制药厂，中国医学科学院药物研究所，北京反帝医院，北京医药工业研究院。

用途：女用口服短效避孕。

药物：I号、II号避孕药紙式避孕片。

用法：紙式避孕片仅在一張四厘米宽、六厘米長紙張面积上，均匀地容纳了糖衣口服避孕片一个月的剂量。全張紙片分成22个小块，供每日分服。

紙式避孕片具有体积小，携带方便，服用简单，质量稳定等优点。

紙式避孕片的试制成功，节约了粮食、砂糖、设备、人力。并提高了质量。

材料来源：上海第七制药厂。

用途：女用口服长效避孕。

药物：复方18-甲基炔诺酮：每片含18-甲基炔诺酮12毫克和长效女性激素炔雌醇环戊醚3毫克。

用法：每月服药一次，第一次于来月经第五天服药一片，从第一次服药日期算起，每隔28天服药一片。为保证效果，服药头3个月，每次服药时加服炔雌醇环戊醚0.3毫克。

副作用：多数妇女服药后无不良反应，部分人服药后可出现恶心、头晕、呕吐、白带多等副作用，一般均不严重，加服抗副作用药片（主要含奋乃静、颠茄、咖啡因、维生素B₆等）便可缓解。上述副作用一般于连续服药几次后不再出现或减轻。



禁忌：有严重肝炎、肾炎者，子宫或乳房有肿瘤者，正在哺乳婴儿未满周岁者，均不宜服用。

效果：有效率96%左右，副作用轻，对月经无明显影响。

材料来源：北京制药厂，中国医学科学院药物研究所，北京反帝医院。

用途：女用口服长效避孕。

药物：每片含16-次甲基氯地孕酮12毫克，炔雌醇环戊醚3毫克。



16-次甲基氯地孕酮

抗副作用药片每片含维生素B₆30毫克，优托品5毫克，咖啡因30毫克。

用法：初服头3个月每隔20天服一次，自第4次起再改为隔26天服一次。


副作用：54.7%的人有头晕，恶心，呕吐，食欲不振，少数人有闭经和经血增多，经服抗副作用药片后反应发生率减少，加服奋乃静2毫克则效果更好。

效果：临床使用1100例，最长服药5周期，按周期算有效率为99.4%，按人数算为99%。

材料来源：天津医学院附属医院。

用途：女用口服长效避孕。

药物：氯地孕酮，炔雌醇环戊醚。



用法：月经来潮第五天服药一片，隔20天服第二片，再隔20天服第三片，以后隔25天服一片。


副作用：有恶心、呕吐者占26.7%，头昏、乏力者占30%以下，有闭经现象者占10%。

效果：临床应用1210人，有效率98.8%。

材料来源：上海第九制药厂，第七制药厂，上海第一医学院妇产科医院，上海工农兵医院，上海纺织局第二医院，上海第一医学院。

用途：女用口服长效避孕。

药物：每片含醋炔醚和炔雌醇环戊醚两种药品。（目前正在临床试用，剂量配伍尚未最后确定。）



用法：目前试用者第一次用药于月经来潮第五天服药一次，以后每隔28天服药一次。

副作用：恶心，头晕，呕吐，白带多，一般均可忍受，不影响工作，个别人反应较重，可对症治疗。此外尚有个别人发生闭经或突破性出血。

禁忌：肝炎，肾炎，子宫或乳房患有肿瘤者，正在哺乳婴儿未滿周岁者，不宜服用。

效果：正在试用，已用千余周期。初步认为，是个有希望的长效避孕药。其优点是一月服一次，醋炔醚系以炔诺酮为原料，生产I号短效避孕药的工厂只要稍加改装即可生产。

材料来源：中国医学科学院药物研究所，北京市“醋炔醚”临床协作组。