

科學研究論文彙編

第二期

上海中醫學院

1959.10.1.

序 言

我們选集了1959年的科学研究論文中的59篇，彙編成冊，向偉大的国庆十周年献礼。它是1958年上海中医学院科学研究論文摘要彙編第一輯的繼續，在順序上算第二輯。我院科学研究工作，在党的领导下，青老年中西医师紧密合作，共同努力，已取得了一定成就。

1959年的选题，截至九月中旬止，已完成112項，其中理論机制，重点是經絡本質的探討，針灸机制的研究26項，临床研究47項，文献整理、著作等31項，其他8項。

經絡与針灸机制的研究，是我院的一个重点，論文也較多，虽还不能得出全面的、肯定的結論，但对今后繼續研究提供了重要的資料。临床研究，也取得了显著的成效，如針刺治疗聾啞有效率达84.7%，針刺治疗小兒麻痺症有效率达95.8%，推拿治疗椎間盤突出有效率达91.2%，治癒率75%，中医中药治疗高血压有效率达74.6%，中医中药治疗矽肺，疗效亦較理想，症狀改善88.2%，肺功能恢复85%，X綫胸片的观察，在23例中有7例矽结节阴影及網狀阴影吸收好转。

这些成就，是党的正确领导，坚决贯彻了党的中医政策，广大羣众对繼承发揚祖国医学遺產的积极性空前提高的必然产物。

1959年的科学研究工作，无论从量或質方面來說，都有所提高，但我們并不滿足这些成果，相反的，我們应在新的基础上，更加努力，对人民作出更大的贡献。

因時間匆促，不及仔細地审訂、修正，錯誤之处，恐在所难免，請批評指正。

目 录

理論探討和机制研究

阴阳五行学說在临床上的应用

經絡学說的研究

針刺对加强孕妇子宫收縮的作用

灸石門穴对小白鼠生殖系統(性週期及受孕率)影响初步报告(摘要)

針刺对人心臟动作电流的影响

艾灸对高血压患者手指容积影响的初步观察(摘要)

X綫下观察針刺对胃蠕动的影响以及穴位選擇性問題的初步探討

正常人胃蠕动的描記及針灸对胃蠕動描記波的影响

針刺“足三里”对兔胃运动机能的影响及其机制的初步探討

12經脈循行部位及其穴位与人体結構关系的解剖观察

✓ 手太阴肺經循行部位解剖結構的观察

足三里穴解剖結構的观察

关于“关元”、“三阴交”穴位臨床針刺感应和解剖結構的关系

皮肤穴位导电量与温度正常值的測定及其周身分布情况的研究

电极面积、电极与皮肤接触的压力以及接触時間的長短对皮肤穴位导电量的研究

几种經絡仪的測定(直流电阻器的設制)

皮肤电位測定器的設制

“蒺藜”經不同方法处理后的毒性和对家兔血吸虫病疗效的进一步观察

針灸对血清中白血球数量、补体、抗体影响的初步試驗

中藥对流感病毒的抑制作用

臨 床 研 究

高血压病的中医理論和治疗(摘要)

中医对慢性腎炎的理论机制及其治疗(摘要)

石斛銀翹湯治疗20例腎孟炎初步观察

中医治疗慢性腎炎20例初步小結

中医中藥治疗子宮頸癌的研究

25例矽肺的中医治疗

中藥治疗21例支气管扩张初步疗效观察

运用中医中藥治疗再生障碍性贫血的体会

中医中藥对糖尿病的疗效

中醫對慢性泄瀉的認識和治療

雷九治療鉤蟲病的初步療效觀察

驅鉤合劑治療鉤蟲病的療效觀察

驅鉤煎劑治療鉤蟲病的初步分析

祖國醫學治療晚期血吸蟲病

中醫治療小兒傳染性肝炎的臨床報告

麻疹併發肺炎臨床總結

中醫中藥治療急性闌尾炎和闌尾膿腫 138 例病案分析

中醫外科手術治愈慢性復發性伴有乳頭內縮的乳部瘻管 24 例臨床觀察報告

海藻玉壺湯加減治療癰瘤（甲狀腺腫及囊腫）33 例臨床觀察

藥烘療法治療神經性皮炎 50 例初步報告

針刺治療聾啞症 301 例的初步總結

針刺治療精神分裂症的臨床觀察

針刺治療小兒麻痺症後遺症 214 例的臨床觀察

針刺治療遺尿症

針刺治療視神經萎縮

針刺治療慢性痹痛

針刺治療膽囊炎

針刺治療肺結核

針刺治療 127 例高血壓病療效總結

針刺治療癲癇 61 例報導

兒科指針治療應用子午流注法的經驗介紹

針刺治療視網膜色素變性

“失眠症”的水針療法

推拿治療腰椎間盤突出症的臨床觀察與探討

其 他

若干中藥中鐵、鈣與磷含量的測定

黃芩的藥理作用

肝臟疾病時血清轉氨酶活力的測定

雙縮脲反應測定血清蛋白質的研究

蜂蟻對於腎上腺皮質的作用

檢查全院寄生蟲的感染

利用溫差電偶溫度計測定循環時間

172 例 高 血 压 病 疗 效 总 結

(摘 要)

上 海 中 医 学 院

1959 年 9 月

172例高血压病疗效总结(摘要)

本文报告172例中有152例服用定风平肝汤、20例服用新订的鲜沙参复方，兹将这二方面的病例，加以归纳、分析。

定风平肝汤处方原为川芎、天麻、黄芩、羌活、独活、决明子六味组成，本年中由于药材供应紧张，方中原有“天麻”已告缺货，因此我们修订了本方，暂以桑叶、钩藤、夕利等三味，来代替天麻，至于鲜沙参复方系根据高血压研究所通过动物实验，有显著降压作用的鲜沙参、野菊花等九味拟订而成，以治疗后期属于虚型的高血压病为主。

至于病例选择、观察方法等仍尽可能遵照卫生部制订的高血压病临床研究计划处理，不再赘述。

处方

1. 修订后定风平肝汤

决明子一兩 川芎一兩五錢 黄芩二錢 羌活三錢 独活五錢 桑叶二錢 钩藤四錢 白夕利二錢

2. 鲜沙参复方

鲜沙参一兩 野菊花五錢 独活五錢 决明子一兩 杞子三錢 首烏四錢 龟板一兩 磁石一兩 杜仲三錢

上列方剂我们在辨证论治原则之下，予以随证加减，如：

滑 阳	加珍珠母 牡利
心 悸	加磁石 天冬补心丹
失 眠	加夜交屯 棗仁
腰 痠	加杜仲 狗脊
足膝冷	加牛夕 桂附八味丸
头 痛	加白夕利 蔓荆子
升 火	加丹皮 夏枯草
头 暈	加勾屯 菊花
视力模糊	加杞菊地黄丸
肾虚洩頻	加金匱腎氣丸

病 例 分 析

① 症状和体征

高血压病一般在早期就有许多自觉症状，只有个别的病例，可能没有主诉，本文172例中就都有程度不一的症状出现（见表一），最多见的症状是眩晕、头痛，其次为失眠、心悸等。

② 观察结果：本文172例高血压病患者在治疗后有64例得到显著的疗效。占总数的37.2%，91例得到有效，占总数的52.9%，无效的仅17例，占9.9%（见表二），至于修订后定风平肝汤及鲜沙参复方之分别疗效大致相同（见表三、四）。

表 1 172 例高血压病的症状疗效表

人 数	172 例																	
主要症状	头 痛			眩 晕			失 眠			视力模糊			气 急			心 悸		
主诉人数	143			162			133			117			91			125		
百分率	83.1			94.2			79.1			68.90			56.4			72.7		
治疗后情况	消失	减轻	不瘳	消失	减轻	不瘳	消失	减轻	不瘳	消失	减轻	不瘳	消失	减轻	不瘳	消失	减轻	不瘳
人 数	63	60	18	57	89	16	59	61	16	19	52	46	29	51	17	35	63	27
百分率	45.4	42	12.6	35.2	55	9.8	43.4	44.8	11.8	16.8	44.4	34.3	29.9	52.6	17.5	28	50.4	21.6
总 计	100%			100%			100%			100%			100%			100%		

表 2 172 例高血压病治疗后的降压疗效

疗 效	病 例 数	百 分 率
显著下降 (舒张压下降 20 毫米水银柱以上)	64	37.2%
轻度下降 (舒张压下降 10、20 毫米水银柱或收缩压下降 20 毫米水银柱)	91	52.9%
效果不著 (舒张压下降 10 毫米水银柱以下)	17	9.9%—无效 9.9%

表3 定风平肝汤治疗152例高血压病治疗后的降压情况

疗 效	病 例 数	百 分 率	
显 著 下 降	54	35.5%	} 有效 90.1%
轻 度 下 降	35	84.6%	
无 效	15	9.9%	无效——9.9%

表 4 鲜沙参复方治疗 20 例高血压病的降压疗效

疗 效	病 例 数	百 分 率	
显 著 下 降	10	50%	} 有效 90%
轻 度 下 降	8	40%	
无 效	2	10%	无效——10%

体 会 与 小 结

(一) 本文介绍定风平肝汤及鲜沙参复方治疗原发性高血压病的疗效, 达到90.1%, 其中显著者37.2%, 有效者52.9%。

(二) 定风平肝汤治疗高血压病的疗效, 经我部多年来的使用, 已可肯定, 本年因天麻

缺貨而改用桑叶、勾屯、白夕利三味來代替，但仍取得了接近的療效，足証三藥之效價可與天麻相仿，我們認為在此藥物緊張聲中值得推廣。

（三）鮮沙參復方，一般用於比較后期的高血壓病患者，根據本文統計，初步觀察，取得了90%的療效，究屬病例太少，觀察期間不長，尚須作進一步的研究。

（四）定風平肝湯適用於“肝陽”“肝風”“肝火”型，屬前期的高血壓病；鮮沙參復方適用於腎虧肝旺、上盛下虛型，屬后期的高血壓病，二方在治療過程中均無副作用產生。

（五）定風平肝湯與鮮沙參復方，我們是在辨証論治的基礎上擬訂的，但在使用的時仍需掌握辨証論治的法則，遇有不同的症狀，予以隨証加減，則效果較著。