

另类水生观赏植物——

变叶木

学名

Chamaecarum variegatum var. *variegatum*

别名

洒金榕

科属

大戟科变叶木属

产地和习性


原产于马来群岛，太平洋群岛等地。我国广东、福建、台湾等地有栽培。喜阳光和较高的温度，冬季温度不低于15℃，最好在20℃以上。

形态

常绿灌木，株高1~2米。单叶互生有柄，革质，叶片形状和颜色变异很大，由线形至椭圆形，全缘或分裂，扁平，常具红色、黄色、白色或紫色斑点或斑纹。总状花序，单生或2个合生在上部叶腋间。

水培要点

剪枝水插，40天后萌生新根。高温时应经常向叶面喷水。夏季应避免阳光直射，若冬季受冻落叶，来年春季剪去受冻枝条，仍可恢复生长。变叶木是植物中叶色、叶形、叶斑变化最丰富的观叶植物，是室内绿化的佳品。



红背桂花

学名

Excoecaria cochinchinensis

别名

青紫木、红背桂

科属

大戟科土沉香属

产地和习性

原产我国广东、广西及越南。热带植物。喜温暖湿润，能耐半阴，较耐寒，忌曝晒。冬季室温0℃以上可安全过冬。适宜生长温度13~28℃。

形态

常绿灌木。分枝多。叶对生，矩圆形或倒披针矩圆形，先端尖锐，表面绿色，背面紫红色，缘有小锯齿。穗状花序腋生。花初开时黄色，渐变为淡黄白色。花期6~8月。

水培要点

可用水插法栽培，15~25℃时，30~35天可生根。生长中应摘除顶端，以促新枝生成，丰满株形。



水培花卉



银叶菊

学名

C. cineraria

科属

菊科银叶菊属

产地和习性

原产南欧。喜温暖与光照明亮的环境。较耐旱，不耐酷暑。生长容易。

形态

全株被白色绒毛的多年生草本。多分枝。叶1~2回羽状分裂。

水培要点

可在春秋两季将植株洗根后水培，也可使用扦插苗。夏季高温，营养液浓度应调低一半。初期如出现烂根，可以3~4天换营养液一次，并洗去烂根；1~2周后会长出新水培根。银叶菊叶形奇特，色彩别致，颇具观赏性，可置于阳台、窗边。

桃叶珊瑚

学名

Aucuba japonica

别名

青木、东溪珊瑚

科属

山茱萸科桃叶珊瑚属

产地和习性

产于我国台湾及日本。极耐阴。夏季怕日灼。喜湿润，较耐寒，对烟尘和大气污染抗性较强。

形态

常绿灌木。小枝粗圆。叶对生，薄革质，椭圆状卵圆形或长椭圆形，先端急尖或渐尖，边缘疏生锯齿，两面油绿有光泽；圆锥花序顶生。花小，紫红色或暗紫色。浆果状核果，鲜红色。花期3~4月，果熟期11月至次年2月。常见品种有洒金桃叶珊瑚(*Aucuba japonica* var. *variegata*)。

水培要点

可剪半木质化枝条水插，3周左右萌发新根。也可取小苗洗根水培。桃叶珊瑚是珍贵的耐阴灌木，叶片美丽，又较耐寒，是室内水培的好材料。

(吴椒杭 姜震方 姚乃华 编著《家庭水培花卉》农业出版社)

