

# 中草药治疗肺结核 方法介绍 (一)

武汉市結核病防治院

1971年12月

# 毛主席语录

领导我們事业的核心力量是中国共产党。

指导我們思想的理論基础是馬克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的宝庫，应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

# 目 录

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1. 葶草治疗肺结核.....         | ( 1 ) |
| 2. 葶草加 709 合剂治疗肺结核..... | ( 2 ) |
| 3. 复方旱莲草止血.....         | ( 3 ) |
| 4. 链霉素小剂量穴位封闭治疗肺结核..... | ( 4 ) |
| 附一：葶草注射液制作方法.....       | ( 5 ) |
| 附二：复方旱莲草注射液制作方法.....    | ( 7 ) |

## 葎草治疗肺结核

**方 药：**葎草

**用 法：**每天肌注两次，每次2—4毫升。

**疗 程：**1—3个月或稍长些。

**副 作 用：**注射后部分患者出现寒战、高烧，接着大量出汗而愈。这是药物不纯的原因。如果口服镇静药或麻黄素则消失更快。个别患者引起腹股沟淋巴结肿大，停药数天即消失。个别患者有过敏性疹样的反应，久之此疹变为色素沉着。

### 典型病例：

(1) 张××，男，54岁，患肺结核20年，长期使用抗结核药。于1970年11月26日转入院。当时，咳嗽，痰血，胃口不好，

诊断为六型肺结核 $\frac{\text{上}}{\text{上}^{\circ}+\text{中}}$  (+)，空洞为厚壁空洞（断层检

查）。经葎草治疗一个月，咳嗽、痰血消失，食欲明显增加，胃溃疡症状消失，断层复查，空洞关闭，痰菌(-)。

(2) ×××，男，37岁，下午低烧半月，咳嗽，精神不佳。1970年9月14日入院。诊断为浸润型肺结核进展期，右上有一个空洞3×4.5厘米（平片）。经葎草治疗一个月，不咳不烧，精神佳，平片复查，病灶明显吸收，空洞缩小。

## 葶草加709合剂治疗肺结核

**方 药：**葶草、709合剂

709合剂为：白芨三钱、玉竹二钱、天冬三钱、百部二钱、麦冬二钱、白芍二钱、黄精三钱、南沙参二钱、陈皮一钱。

**用 法：**葶草每日肌注两次，每次2—4毫升。

709合剂：每日100毫升，分2—3次口服。

**疗 程：**1—3个月或稍长些。

**典型病例：**

彭××，男，患肺结核多年，经链霉素等抗痨药物治疗，效果不明显。入院时诊断为六型肺结核甲 $\frac{\text{上}^{\circ} + \text{中}}{\text{上}}$ （+），空洞为薄壁空洞 $2.5 \times 2.2$ 厘米（平片）。经本法治疗二个月，平片复查，病灶有吸收，空洞消失。

## 复方旱莲草止血

**方 药：**旱莲草、白茅根各一斤。

**主 治：**肺结核咯血。

**用 法：**每天肌注 2—3 次，每次 4 毫升，如果大咯血可将原液 4 毫升加入 50% 葡萄糖 20 毫升行静注，每天 2—3 次。

**用药时间：**一般为 4—5 天或稍长些。

**副 作 用：**偶有寒战、高烧，接着出汗而愈，多为制剂不纯所致。

**典型病例：**

张××，女，患肺结核多年，经常咯血，为止血曾输血多次，输血量以万毫升计算。经用本法数次已基本控制咯血。

## 鏈霉素小劑量穴位封閉治療肺結核

**方 藥：**鏈霉素。

**主 治：**鏈霉素失效的肺結核。

**取 穴：**雙肺俞穴，雙中脘穴，雙結核穴。

**方 法：**交叉取穴。如第一天取右結核穴，左肺俞穴，第二天即取左結核穴，右肺俞穴。依此類推。每一穴位注入鏈霉素 0.2，每天一次，同時每天合併內服異菸肼 300 毫克。

**療 程：**1—3 個月或稍長些。

**副 作 用：**尚未發現。

**典型病例：**

林××，女，35 歲，患肺結核多年，經鏈霉素等藥物治療，效果不明顯。入院時診斷為六型肺結核進展期  $\frac{\text{上}}{\text{上}^{\circ} + \text{中}}$  (+)，經本法治療三個月，症狀消失，平片復查：病灶大部分吸收，空洞消失。痰菌 (-)。

## 附一：葎草注射液的制作方法

本品为浅棕色透明溶液，每毫升含1克葎草。

### 操作方法：

#### （一）酒精浸泡法：

取全草洗净、切碎，置搪瓷桶（缸）中，加入40—60%酒精，浸泡48小时后，去渣留液。溶液用常压挥发掉酒精或用薄膜蒸发器回收酒精至无酒精味为止。加入5%的活性炭脱色，过滤，滤液用1N NaOH溶液调节PH值至10左右。再加热至90°C，保持30分钟，放冷，（此时溶液的颜色若很深，可再加入1%的活性炭脱色），用菊形滤纸过滤，滤液用1N HCl调节PH值至6.7—7.0左右。最后加入0.85%的NaCl，搅匀，溶液经3号玻璃垂熔漏斗过滤，灌封于安瓿中，用流通蒸气消毒30分钟，取出检查澄明度，印字，即得。

#### （二）煎煮法：

取全草洗净、切碎，煎煮二次，合并溶液，浓缩至所需的量，加入95%酒精至溶液含酒精的浓度为80%，放置过夜，过滤，回收酒精至无酒精味为止，放冷。再加入95%酒精至溶液含酒精的浓度为80%，放置过夜，过滤，回收酒精至无酒精味为止。溶液用1N NaOH调节PH至10左右，再加热至90°C保持30分钟，放冷，用菊形滤纸过滤，滤液用1N HCl调节PH至6.7—7.0左右，加入0.85%的NaCl，搅匀，用3号玻璃垂熔漏斗过滤，灌封于安瓿中，用流通蒸气消毒30分钟，取出检查澄明度，印字，即得。

## 葎草形状：

植物名：葎草。别名：拉拉藤、拉拉秧。土名为野丝瓜。

植物形态：属桑科葎草属植物。一年生蔓草，有雌雄之分。茎长而蔓延，密生倒钩刺。叶除茎上部的互生外，其他的都是对生，五角形，3—5掌状深裂，边缘有粗锯齿，正面极粗糙，雄花淡黄绿色，集合呈圆锥形排列。雌花合成绿色，带球形花穗。果扁圆形，8—9月开花。

药用部分：全草。

## 附二：复方旱莲草注射液制作方法

本品为黄色透明溶液，每毫升含旱莲草0.5克，白茅根0.5克。

### 操作方法：

同藜草制作方法。

### 旱莲草和白茅根的形状：

#### （一）旱莲草：

植物名：鳢肠。别名：旱莲草。

植物形态：一年生草本，全株粗糙有毛，高可达一尺多。茎叶折断后有液汁流出，数分钟后，即变蓝黑色。茎直立或倾伏，着土后节上多生根。叶对生，带披针形，边缘常有细齿。头状花序，白色，生于叶腋或枝顶。果实黑色。全草干燥后变黑色。7—10月开花，8—11月结果。

药用部分：全草。

#### （二）白茅根：

植物名：白茅。土名为茅柴根、茅草。

植物形态：多年生草本，高1—3尺，地下有白色，细长，有节的匍匐茎，节上有褐色鳞片和细根。叶细长，花比叶先开，密集茎顶呈圆柱状花穗，长约1.5—6寸，密生银白色长柔毛。新鲜根茎和幼花穗（茅叶）有甜味，小孩常爱取食。5—6月开花，7—8月结果。

药用部分：根茎。