

陳素菴婦科補解

臨產門卷之四

臨月催生

胞漿先來

嘔吐

冷汗

交骨不開

寒戰發熱

口噤目翻

泄瀉

胎上逼心

子死腹中

雙胎一生一死

產後衆疾門卷之五

胞衣不下

血暈

氣喘

呃

中風

瘕

角弓反張

瘕瘕

拘攣

口噤

發狂

乍見鬼神

妄言詬語

不語

驚悸

恍惚

口鼻黑氣

渴

口干痞悶

四肢浮腫

心煩腹痛

腹脹

惡露不下

惡露不止

惡露乍來忽斷

咳嗽

玉門不開

陰脫陰挺

陰蝕

便數遺尿

遺糞

小水閉

二便不通

溲淋

腹痛

小便便血

大便便血

頭痛

心痛

積聚

腰痛

先枕痛

疝

脇肋痛

血塊

遍身疼痛

兩胯痛

膝脛痛

腳氣

寒熱往來

虛喘

自汗不止

頭汗

熱

大便閉結

瘧

痢

羣勞

泄瀉

嘔吐

霍亂

虛羸

血崩

月水不至不調

乳汁不行乳少

臨產門 卷四

胎前諸疾已詳列症治補輯方論矣十月期
足自當分娩但或有難產艱難生別症及
孕婦而虞死生反掌又宜小心謹慎因另
具臨產門

臨月催生方論第一

全在催生者使氣血和調而為產也果熟蒂
落花放而飄名曰分娩乃因氣血而利等
非強迫之使下也安胎宜早血催生宜行氣
滑胎體質素弱或胎前各病以天劉佛手散

五主而佐以行氣滑脫之藥如本項強壯奉
養太過起居安逸絕無憂勞以行氣滑脫
五主而佐以行血補血之藥可服催生如養教及鬼
腦催生丹

催生如養教 九月之後十月之內可預服教利

并神 川芎^{二味量} 冬葵子 車前子 肉桂^{不用}

^{冬月六分} 丁糸 桑寄生 紅花 烏藥 生薑 麝香

黃楊頭 丁糸 枳殼 芍藥 減半

兔腦催生丹 胞破見紅方服

射干^{每九用} 丁糸 肉桂 丹 百草霜^{三升} 急性子丹

和壳并臘月鬼腦子紅兒
藥水并丹

冬葵子并

將紅花蘇木汁和鬼腦同并桑叶九年丸
計重二斤分炒仁少衣生薑三斤並同化服
補上在聖人氏在妊也有胎毒少母者絕嗜慈
苦滋味屏怒節勞慎外感之凡邪無難堪
之氣血故氏彌月而產也不拆不刺無災無害更
何疾病一生賴藥餌之調治者今世之人凡
孕而交合或恣食肥甘炙煖或恃性暴怒或
過于安逸好睡久坐未產而病或傷孕或

助肝火或損脾胃或虧腎水或聚痰沫于腸
胃之間或引有難產之患先哲有云難產各
留貴之家醫儒婦誠哉斯言也此方用桂
年五斤血破血烏藥紅花以行血順氣通經
帶枳殼以寬腸冬葵子及芝麻以滑胎車前
利元苦酒少佛手散也產人難產則倍加大
劑以助行血元或專用二味作酒入生芝麻搗碎
頻服之則胎自下而子道不艱阻矣
次方丁香白桂氏性平五血五則行冬葵子急性
氏性走下陷滑則易生枳殼寬腸商山道士所

進此而公子藥也紅花蘇木入血不敗血使無
將帶苦茅茹由火結成性溫能行血免生月
而生吐而為產然非以射赤以開竅通血則此
藥少力難以速効孕婦腹痛腰痛用口挺急
胞破見紅即並生薑酒調下立時胎產矣
金匱又有烏金丸以難產作逆合九皆奇

陳皮丹枳殼丹以芳丹老桑子丹並苦茶并並

生地丹車前丹丹急性子丹鹿角屑丹麻黃

生薑芝麻黃楊頭砂仁丹衣

補血生丹射赤丹后枳殼丹白桂丹佐紅

臨月催生

花蘇木等而使取臣辛未同家辛未行無使
眩迷下也此才庶有甘溫行血而君老衰急性
性清善下而佐陳皮行氣和氣安陽而益
世川芎等藥而使身以行氣清血者有定見
然不若少方穩之速也獨麻黃一味殊不為晚
或取臣能開腠

補余親貧賤之家口甘養產身休苦友
產也姑婦妯娌扶掖生速更有山野婦人僻處
窮村惟有難產無穩婆少藥餌生腰腹痛
極踰時亦產聖臣常不覺其苦臣因產而

殞軀者百無一二此由平時氣盛運動無塵結
滯之患無隱慙交合之情胎元堅固是以應時
而生今富貴宦族奉養太過恣食肥甘貪淫
多合難產之故多由于此先哲言之最切先始祖
立免腦催生如煮二方一用于臨月即步人速胎達
生二方遠矣一用于坐草則屢試屢驗起死回
生誠秘製不傳之良方也

臨產胞漿先來者胎久不下方論第二

全方易產者胞水一來兒即轉身向下云胞破
漿水先來或一二日或二三日胎竟不下名濕漿

胞漿先來胎久不下

生此症最險由胞漿來者子道干濕胎不能下也

治宜大補元氣以助漿水不可妄投峻厲剝劑

乘耗元氣損血則愈難產可宜培榮清胎散

黃芩 芍藥 川芎 升麻 熟地 白芍 砂仁 丹參 香附 桂枝

生薑 蘇木 甘草 黃芪 赤芍 茯苓 白朮 枳殼

澤瀉 忍冬 牡丹 益母 煨乾 訶梨 瓜 令氣通暢

補接嬰兒身在此中九月以後自然轉才胞漿

于腎腎系于腰故腰痛腰不痛者未產也腰痛

重腰痠痛甚者兒欲生也但胞內有漿水者

胎胞之外有瘀血經裏胞水先來或一日二日甚

二三日腹痛而胎不下子道干涩胎欲出而反停
瘀血阻滯故不能生此時孕婦其驚且惧氣結停
疲惟大補元氣以助其精神逆瘀行血和氣併
當產婦精神充足仍可坐蓐努力不能血枯
干閉此方四物以大補陰血丹參逆瘀生新益母
和營養血冬葵之蘇以消胎產皮血以破滯
肉桂辛熱使藥性直入血分引血下行庶幾有
補于養一云爾

臨月嘔吐方論第三

全方孕婦臨產忽然嘔吐或胃氣虛寒或冬月

去裡衣太早，下体受寒，或胎上通心，下逆而嘔。
治宜和胃，溫中，順氣，加催生。下藥有它者，用辛
溫解之，嘔止則氣降，胎自下行。而為產矣。宜溫胃

湯

肉桂不反胃 厚朴不陳皮 不忌時不 苡仁不 黃芩不
車前子不 枳殼不 黑姜不 杏仁不 半夏不 砂仁不
生薑不 蘇子不 炒米不 粳米

補胎產嘔吐，下故有三胃氣。產者以溫中和胃。
而主犯外寒者，以散之。溫胃而主有它邪，
而未產者，先傷飲食者，以消食溫中為主。

若胎上逼心以致逆而嘔吐頻作則上下俱急
尤須順氣溫胃使胎氣下舒氣順即產產則
嘔吐即止矣此方外高半陳消食和中止嘔
順氣桂姜行血和氣寬腸流紅散帶草步
利散芳神助血氣順血行嘔自止胎易產也
臨產冷汗不止方論第四

余書產婦臨盆出冷汗不止者坐草人倉卒由留
氣念汗亦心液或努力太過氣虛不能固表
或腰腹痛久逼迫陰血腠理開張故汗出不止
也不可用參芪木香固表實氣之藥阻塞

生芝蔴 百毒殺

補四物重用所以補血不飲汗也常要則汗自止汗
止心神自足脫六不行故道而為產也葦子肉桂
辛溫甘溫行血去胎積散寒陽冬葵車前利
尿去水收元氣滯益母和血安胎補者有補
行者自行且補中有行行中有補即止汗可

也催生亦可也

臨產交骨不開方論第五

全方交骨在于宮之外，箕骨之內，左右兩處，交錯如人手，然十指之間，其中則內經所謂縫紉也。臨產則胎水淋下，交骨自開，然必胎腹順垂，兒頭翻身而下，交骨一撞，始下，此乃順產。若骨不開，由婦人平日失於調養，或胎前多病，致血氣虛弱，無加材料，伸手故。

生芝蘇三
此方每用時，用蟹爪三、龜板一枚，味辛，研細，用酒煮，新鮮者佳。

交骨不開