

足本丹溪心法

丹溪心法附餘卷之十六

火鬱門

脇痛七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛 木氣實 有死血 有痰流注 肝急 木氣實用蒼木川芎青皮當歸之類
痛甚者肝火盛以當歸龍會丸姜汁下是瀉火之要藥 死血用桃仁紅花川芎痰流注以二陳湯
加南星蒼木川芎 肝苦急急食辛以散之用枳芎川芎蒼木血病入血藥中行血 治咳嗽脇痛
以二陳湯加南星香附青皮青黛入姜汁 脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去尖并香附之類
有火盛者當伐肝木 左金丸治肝火 有氣鬱而胃脇痛者看其脉沉澁當作鬱治 痛而不得
伸舒者蜜丸龍會丸最快 脇下有食積一條扛起用吳茱萸炒黃連 控涎丹一身氣痛及脇痛
痰挾死血加桃仁泥丸服 右脇痛用推氣散出嚴氏方 左脇痛用前藥為君加柴胡或可治

入方
小龍會丸

當歸

草龍膽

酒洗

山梔

炒黃連

炒川芎

各半兩

大黃

煨半兩

蘆會

三錢

木香一錢

一方有黃芩柴胡各半兩无大黃木香一方有甘草柴胡青皮无當歸梔子
右為末入麝香少許粥糊丸如菉豆大每服五十丸姜湯下仍以琥珀膏貼痛處 龍會丸亦治
有積因飲食大飽勞力行房脇痛

當歸龍會丸

治內有溼熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却以生姜汁吞此丸

痛甚者須炒令熱服

草龍膽

當歸

大梔子

黃連

黃芩

各一兩

大黃

蘆會

半兩

木香

半錢

黃柏

兩麝香半錢

右十味為末麵糊丸

一方加紫胡川芎各半兩

又方加青黛半兩

蜜丸治脇痛

麵丸降火

柳青丸 瀉肝火

黃連半斤

右為末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

枳殼

桂心

片子姜黃

各半兩 一本作鹽 甘草炙錢半

右為末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

枳芎散

治左脇痛刺不可忍者

枳實

炒川芎

各半兩 粉草炙一錢半

右為末每服二錢姜棗湯下酒亦可

鹽煎散

和刺方治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉勝胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁

去壳甘草炙茯苓去皮草果仁去皮煨肉豆蔻

川芎

洗

茴香炒

蔓澄茄

大麥芽

枳榔

良姜

枳殼

蒼朮

陳皮

去白

冤活

厚樸

右以咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分去渣空心溫服

沉香升氣丸

御藥院方

治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香

枳榔

各二錢半

人參

訶子

煨去核

大腹皮

炒各半兩

白朮

紫蘇葉

香附子

炒

神麴炒麥蘖

烏藥

各一兩

陳皮

去白

甘草炒

姜黃

略四京

三棱煨蓬莪朮

煨益智

炒去殼

厚樸去皮姜製各二兩

右以咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去渣溫服

分氣紫蘇飲

治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急

見喘類

調中順氣丸

拔萃方

治三焦滯滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香 白豆蔻仁

青皮去白

陳皮去白

三棱地各

大腹皮

半夏湯炮七次各二兩

縮砂仁

枳榔

沉香各半兩

右為末水糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳皮湯送下

復元通氣散

和劑方

治氣不宣通或成瘡癰并閃挫腰脇氣滯不散

方見腰痛

枳殼煮散

治悲哀傷肝氣痛引兩脇

方見氣滯

一方治脇下疼痛如神效

小茴香

一兩炒

枳殼五錢

麝炒

右為末每服二錢鹽湯調下

十棗湯

治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用

甘遂

芫花

慢火炒紫色

大戟各等分

右為末水一大盞

棗十枚切開煮取汁半盞

調半錢人實更加一錢量虛實加減

控涎丹

見痛風

二陳湯

見痰類

左金丸

見火類

小柴胡湯

見溫熱

琥珀膏

見積聚

○或謂予曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方鹽煎散沉香升氣散分氣紫蘇散

調中順氣丸俱是辛溫之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其於降火未之有也病源是火而

用辛溫之藥治之則是火以濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之於書豈

肯妄作而誣後人哉但後人不善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每

度之凡左脇痛甚者即是肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之凡右脇痛

微者即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸等藥辛溫之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛

胃脘痛二證婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄於中發則上衝被濕痰死血阻滯其氣而

不得條達故作痛也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火氣之度乎得法矣
諺云香附縮砂婦人之至寶山藥從容男子之佳珍此之謂也

跌撲損傷七十五

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白朮和中童便煎炒 在下者可先須補接後下瘀血 在上者宜飲薑汁或和粥喫 切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

入方 治跌撲損傷 跌撲出血者薑汁香油各四兩酒調服之

治癰傷骨折及血出者
用滑石甘草為末人參湯調服次用生薑自然汁一盞米醋一盞獨核肥皂四箇敲破按於姜汁米醋中紗片濾過去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散 沒藥 乳香 各五錢 自然銅 煨 滑石 一兩 龍骨 三錢 赤石脂 三錢 麝香 一字 另研

右為末好醋浸沒煮多為上乾就炒燥為度臨睡服時入麝香杪以茶是留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極效

○世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工必在速效以罔利迎合病人之意而銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方 冬灰皮 阿膠 各等分

右炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芎藭湯 三因方 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸 白芍藥 芎藭 荊芥穗 百合 水浸半日等分

右以咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散 楊氏家藏 治打撲傷折肉損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹悶

紫金藤皮二兩降真香 續斷 補骨脂 無名異 煨細酒淬七次 琥珀 別研 蒲黃 牛膝 酒

浸當歸洗焙 桃仁 去皮尖各一兩 大黃 紙裹煨 樸硝 別研各一兩半

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即安

復元活血湯 拔粹方 治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡 鈹花粉 當歸 銘三紅花 甘草 銘一大黃 酒浸川山甲 三錢 桃仁 五十箇 酒浸研和泥

右以咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以利為度

當歸導滯散 聖惠方 治落馬墜車打撲傷血瘀大便不通浮腫痛昏悶畜血內壅欲死

大黃 一兩 當歸 二錢 半射香 少許

右為末每服三錢熱酒下和刺方只大黃當歸二味等分酒調下或以酒煎服亦可

雞鳴散 治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃 酒蒸一兩 桃仁 七粒 去皮尖 當歸尾 五錢

右為末酒一碗煎去渣五更雞鳴時服取下惡血即愈若氣絕不能言急以熱小便灌之即甦

奪命散 濟生方 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

大黃 黑牽牛 各二兩 紅蛭 用石灰慢火炒令乾黃色半兩

右為末每服二錢用煎酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末二錢崔之須下惡血成塊為愈

○已上諸方辛涼疎導瘀血之劑

花藥石散和刺方治一切金刃所傷打撲傷損身體出血者急於傷處糝藥其血自化為黃水如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立效若牛觔腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上糝藥血止立活如無桑白皮用生麻纒亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後糝藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃

上色明淨者四兩搗為粗末花藥石一兩搗為粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和塩泥固濟瓦罐子一箇候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠壘周圍自己午時從下著火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了羅極細磁盒內盛依前法服

沒藥降聖丹

和劑方治打撲閃肭筋斷骨折掣急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡

筋骨緩縱皮內刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力並皆治之

自然銅

火煨醋淬十二次研為末水飛過焙川烏頭生去皮臍骨碎補腦去毛白芍藥 沒藥

別研乳香

別研當歸 洗焙各一錢 生乾地黃 川芎 各一錢半

右並生用為細末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和丸每一兩作四丸每服一丸搥碎水酒各半盞入蘇木少許同煎至八分去蘇木熟服空心食前

治打撲內損筋骨疼痛本事方

沒藥

乳香 芍藥 川芎 川椒去目及當歸各半兩自然銅三錢半炭火燒

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛

處臥霎時連進有効

乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香 沒藥 川芎 白芷 芍藥 甘草 牡丹皮 生地黃

右為細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散 御藥院方 治打撲損傷痛不可忍者

白木 剉五兩當歸 焙白芷 沒藥 剉研肉桂 去皮乳香 剉研甘草 炒各一兩

右為末入研藥并研令勻每服二錢溫酒調下不拘時

乳香黃耆散 應驗方 治打撲損傷筋骨及瘡腫焮作疼痛

乳香 五錢另研沒藥 五錢另研黃耆 當歸 酒浸赤芍藥 川芎 甘草 麻黃 陳皮 各一

粟殼 去項蒂蜜炒一兩人參 去芦一兩

右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓溫服

接骨散 和劑方 治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍者此藥能接骨續筋止痛活血

定粉 二錢當歸 二錢鵬砂 二錢半

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

補損當歸散 和劑方 療墜馬落車傷腕折臂呼吸疼痛連進此藥其痛即止筋骨接續

澤蘭 炒附子 炮去皮臍當歸 炒蜀椒 炒出汗甘草 炙桂心 各三分川芎 炒六分

右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水菰菜

治打損接骨方 本事方

接骨木 半兩乳香 半錢赤芍藥 川當歸 川芎 自然銅 各一兩煨醋淬十二次

足升桑心去付余 卷十六 火鬱門

日

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫舉手丸如龍眼大如只打傷筋骨及閃肭疼痛者用藥一
凡好舊酒一盞浸化藥蒸熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

治打撲損傷骨折百一選方此藥專能接骨

夜合樹俗謂之萌葛即合歡花越人謂之烏鰐樹去粗皮炒黑四兩芥菜子炒一兩

右為末酒調二錢澄清臨臥服又以粗滓罨瘡上扎縛之

治打擱折骨損斷經驗方服此藥自頂心尋病至下兩手遍身遇受病處則蛄蛄有聲覺藥力習習

往來則愈矣

乳香沒藥蘇木降真香松明節川烏去皮炙自然銅火煨醋淬七龍骨半兩生用

地龍半兩去土油炒水蛭油炒半兩血蜎三錢土狗十箇油浸焙乾為末本草名蜈蚣

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下食前服

治打撲傷損經驗方用胡孫姜研爛取汁以酒煎服渣傳傷處

接骨散張子和方并治惡瘡

金頭蜈蚣一箇金色自然銅半兩燒紅醋淬乳香一錢研為細末銅錢文燒紅醋淬研細

金絲水蛭一錢半每箇作三截瓦上煨去氣道為度

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿血先用粗藥末少許小油少半是同打勻再

入小半是再接勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛

天明一宿自破便效如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一

盞熱調連渣溫服如骨折損以接定不疼如不折了喫了若立便止住疼痛此方累經効驗具述

神聖接骨丹 治打撲傷損跌折肢體

水蛭用糯米於砂內炒去米三錢 兔絲子 髮灰 好綿灰 沒藥 乳香 血竭各一兩 錢一文燒
七次醋淬七次另研射香一錢另研

右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下空心服約車行六七里聞骨作聲忌聽鐘
鼓砧杵之聲震動恐生盧節忌食鹽肉一服見效

續股散 治折傷筋骨

用半兩錢七箇以桑柴火燒紅好醋內淬之取錢上碎末再入珍珠末一分乳香沒藥少許同研
極細好酒調服

接骨散 治跌撲悶胸骨折疼痛 黃麻燒灰二兩 頭髮燒灰一兩 乳香五錢

右為末每服三錢溫酒調服立効

茴香酒直指方 治打墜肢體凝滯瘀血腰脇疼痛 破故紙炒 茴香炒 辣桂 各一錢

右為末每服二錢食前熱酒調服

木香調氣散 治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香 各二錢 藿香 甘草炙各八錢 砂仁 四錢

右為末每服二錢加紅曲末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅曲紅酒亦好

應痛丸經驗方 治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼朮一斤破故紙炒半斤 船上茴香兩 骨碎補去毛 穿山甲去膜去皮炒 生草烏一斤 如參大

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生薑二斤搗爛將草烏一處淹兩宿焙乾連前藥一處焙為細
末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十丸酒湯任下忌熱物

○已上諸方辛溫散痛接骨之劑

乳香消毒散

御藥院方

治一切傷折蹉跌燉腫疼痛不可忍者

乳香

另研沒藥另研白欬

白芍藥各一兩白芥子當歸各半兩

黃柏另研細末二兩滑石

二兩黃丹三錢加血竭半兩另研

右為細末入另研者一處再另研勻每用新水調如稠膏攤在紙花上貼患處

烏金散應驗方治打撲損傷敷藥

用小黃米粉四兩葱白細切一兩同於砂鍋炒至黑色杵為細末用好醋調成膏子攤於紙上貼於損傷病處後用杉木皮或板以紙色裹四面四片用絹袋扎縛不可動搖三日一換內服龍腦一方用葱白砂糖二味相等爛研傳之痛立止且無癰痕

治撲打傷折手足

用菴豆粉新鉄銚內炒令紫色用新汲井水調稀厚敷損處以紙將杉木片縛定立效

走馬散

經驗方

治折傷接骨

柏葉

生少用皂角生多用骨碎補去毛

荷葉生各等分

右為末於折傷揣定入原位以姜汁調藥加糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之

莫令搖動三五日後開看以溫葱湯洗之後再貼藥復夾七日如痛甚加沒藥

治打傷損臂方大成

南星

白芷

半夏

白芨

黃柏皮

赤小豆各等分

右為細末姜汁調傳患處蜜糖亦好

沒藥散

按粹方專治箭傷止血定痛

定粉

一兩枯白礬

二錢

另研沒藥

另研乳香

另研各一兩

風化石灰

一兩

右各研為細末和勻摻上

治諸般打撲傷損皮破血出痛不可忍者

右用赤石脂研末傳之效

金絲膏藥應驗方治打撲傷損閃肭疼痛風溫氣痛

當歸 川芎 蒼朮 香白芷 赤芍藥 木鱉子 大黃 草烏頭各半兩香油四兩港青

半斤松香半斤乳香二錢半另研沒藥二錢半另研

右前八味同香油四兩熬去渣漚青熬軟硬冬軟夢夏夢乳香沒藥攤膏藥時用之

立應金絲膏經驗方

當歸尾 香白芷 杏仁 草烏生剉用猪牙皂角不蛀者去皮各三錢葱連鬚葉肥者十莖 白膠香

三錢漚青明者八兩黃蠟一兩乳香另研為末沒藥另研為末各半兩清油七兩

右將前項六味入清油內依法熬漚去渣入白膠香漚青溶化攪勻入黃蠟又攪勻待冷入沒乳

至聖黑龍膏御藥院方治一切筋骨損傷疼痛

米粉四兩於銀器內炒成塊子褐色放冷研為細末後入二味乳香 沒藥研細各半兩

右研極細末每用一好酒或醋調如膏攤在紙上貼患處

一方 治跌撲損傷及金刃所傷 此藥止血散痛消腫

風化石灰 重羅過半兩五月五日以薑汁和酥乾海螵蛸半兩老松香 血竭 輕粉 乳香

沒藥 黃丹 飛過無名異去土松白脂去皮各半兩

右為極細末濕者乾糝乾則水調密調傳患處

淋瀝頑劑散 治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑劑葉一兩蔓荊子 白芷 細辛去苗防風去芦川芎 桂心 丁皮 羌活各一兩

右為末每用一兩鹽半匙葱白連根五莖藥水五升煎七沸去渣通手淋瀝痛處冷即再換宜

○已上諸方外治傳貼之劑

疥瘡七十六 附天庖瘡 楊梅瘡 凍瘡 脚上爛瘡 頭面瘡

丹溪心法

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根梢用及引經藥則可 又云諸瘡以當歸黃連為君連翹甘草黃芩為佐 諸痛痒瘡瘍屬火若稟受壯盛宜四物加大承氣湯下之 若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜四物加黃連黃芩大力子甘草在下焦者加黃柏 若肥胖之人生瘡而痛乃是溼熱宜防風羌活荆芥白芷蒼木連翹取其氣能勝溼

○諸瘡藥 膿窠治熱燥溼為主用無名異 乾疥開鬱為主用吳茱萸 虫瘡如癰狀退熱殺虫為主用蕪荑黑狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺虫樟腦松香退熱 頭上多加黃連方解石蛇床定痒殺虫松皮炭主膿 腫多者加白芷開鬱 痛多加白芷方解石 虫多加梨蘆班貓痒多加枯礬陰囊加茱萸 濕多香油調 乾痒出血多加大黃黃連猪脂調 紅色加黃丹 青色加青黛虫多加錫灰蕪荑檳榔 在上多服通聖散在下多須用下 脚腫出血分濕熱用藥

入方 瘡有三種

膿泡瘡治熱為主

黃芩 黃連 大黃各三錢 蛇床 寒水石三兩 黃丹半兩 白礬錢一 輕粉 白芷 無名異少許 木香少許

右為末油調敷

沙瘡 蕪荑錢二 剪草錢一 蛇床錢三 白礬 吳茱萸 黃柏各一錢 蒼朮 厚樸 雄黃各半兩 寒水石二錢 輕粉貼

右為末油調敷

疥瘡藥 春天發瘡疥開鬱為主 不宜抓破敷

白礬二錢 吳茱萸錢 樟腦錢 輕粉十盞 寒水石二錢 蛇床錢 黃柏 大黃 硫黃各一錢 楮柳錢

右為末香油調傳

又方 蕪荑 白礬粘 軟石膏 大黃 樟腦各半兩 管仲 蛇床略 一硫黃 雄黃各二錢半

右為末香油調須先洗瘡去痂傳之

一上散 雄黃三錢半 寒水石一兩 蛇床 白膠香 黑狗脊各一兩 黃連半兩 硫黃三錢半 吳茱

萸 白礬粘 五錢 斑貓十四箇去翅足

右硫黃雄黃寒水石另研如粉次入斑貓和勻蛇床狗脊等為極細末同研勻洗瘡令湯透去痂

用獵猪油調手心中擦熱鼻中嗅二三忘却擦上一上即愈如痛甚腫滿高起加寒水石一倍如

不苦痒只加狗脊如微痒只如蛇床子如瘡中有虫加雄黃如喜火灸湯洗加硫黃只嗅不止亦可愈也

附諸方 四物湯見補損 大承氣湯見傷寒

升麻牛旁子散 治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於頭面胃膈之際

升麻 牛旁子 甘草 桔梗 葛根 玄參 麻黃 連翹各一錢

右咬咀姜二片水二盞煎一盞服

升麻和氣飲 治瘡腫癰疥痒痛增寒發熱

甘草 陳皮各一兩半 芍藥七錢 大黃半兩 乾葛 蒼朮 桔梗 升麻各一兩 當歸 半夏

茯苓 白芷各二錢 乾姜 枳殼各半錢

右咬咀每服一兩水煎服

加味羌活飲 三因方專治四氣外搏肌膚發為癰疹增寒發熱痒

羌活 前胡各一人參 桔梗 茯苓 甘草炙 枳殼炒 川芎 天麻各半兩 蟬蛻去翅薄 荷各錢

右吹咀每服五錢水一盞姜三片煎七分溫服

當歸飲子 治內蘊風熱發為瘡疥風癬淫毒燥痒瘡

當歸 白芍 川芎 生薑 白蔘 黎 防風 荆 介 略 一何首烏 黃芪 甘草 各半兩

右吹咀每服一兩水煎或為末每服一二錢亦得

苦參丸 御藥院方 治肺受熱毒遍身生瘡

用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

○已上諸方內消之劑

輕粉散 寒水石一斤 硫黃 樸硝各二兩 松香五兩 枯礬二兩 輕粉五錢

右為末香油調搽

硫黃散 硫黃 川椒 石膏 白礬 等分

右為細末香油調搽

立効散 全蝎三十枚 巴豆三十粒 皂角七箇炒焦

右為粗末以清油四兩熬至焦黃色去渣次入大楓子蛇床子白礬末各一兩黃蠟二兩同煎成

膏以瓷罇收貯任意搽瘡

一方 白芷白礬各等分為細末入硫黃少許以香油搽調

治諸般疥癩瘡藥 蛇床子一斤大楓子一斤白礬五兩為末末末少用 檳榔一兩末

右糖油半斤調搽小兒頭瘡少加松香輕粉

水銀膏 此藥會稽徐彥劍傳大效

楓子 取肉四兩 輕粉一錢 水銀末要茶研不樟腦二錢半 礬生熟二錢半

右先將楓肉研膏次入餘藥勻臘月猪脂和稀用絹布裹任意捺

又秘方 黑狗脊 蘭茹 藁本 蛇床子 硫黃 井泉石 剪草 百部 藜蘆各等分

右碾為細末用香油捺手心內捺鼻間之

一方 治疥癬諸瘡

雄黃五錢樟腦五分大楓子取肉班貓各十雙狗脊 蛇床子 寒水石 硫黃各五錢

右為極細末疥瘡用柏油調捺癬瘡用柏油調捺

治疥瘡 大楓子 杏仁各十粒

右同羊脂搗均以暴火烘油出捺之

胡粉散濟生方治一切瘡癬瘡痒甚者

胡粉一分硫霜半分大草烏生蠲蛭稍七枚雄黃 硫黃各另研斑貓一枚射香少許

右為末先用羊蹄菜根蘸醋捺動次用少許藥捺患處

如意散宣明方治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸 牛李子 荊芥穗各一兩半輕粉半錢信砒二分牡蠣半兩

右為細末研勻每臨時臥炒一錢油調遍身搓磨上一半如後痒不止更少旋塗之股髀之間香越愈

又治疥藥方 蜜陀僧 蛇床子 硫黃 枯礬 胡椒

右為末香油調傳

○已上諸方外散之劑

丹溪心法

○天庖瘡 用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒蜜調傳極妙 從肚皮上起者是裏熱發於外也還

服通聖散 見斑疹類

○楊梅瘡 新增 附諸方

治楊梅瘡方 硃砂二錢雄黃一錢半苦參 荊芥穗 天麻 麻黃 牛旁子 面粉鎔槐角子

右為細末用糖心雞彈為丸梧子大每服三十九丸用雞湯或羊肉湯送下一日一服表出毒氣再

不服忌一月房室神效

又方 土茯苓四兩牙皂 地骨皮 五加皮 白蘚皮各一兩

右作二十服用灯草車前子為引子煎服

又方 冷飯團一名上茯苓一斤五加皮 白蘚皮 防風 白芍藥 木瓜各一兩半皂角子

白丑各三粒生地黃酒洗地骨皮 牛膝去蘆黃連去須槐花 川芎 尋風藤 威靈仙 白茯苓

苓 杜仲炒斷絲白芷 當歸酒浸洗各一兩甘草炙半兩荊芥穗一兩半

右吹咀二十服每服水一鍾半酒半鍾共煎至一鍾飯後溫服服動此藥可用後又開黃楊梅瘡並治

又方 當歸 連翹 羌活 荊芥穗 薄荷葉 枳殼 黃柏 茯苓 車前子 防風 木通

芍藥 川芎頭上山梔 桔梗 天花粉 姜蚕 白芷 甘草 金銀花 獨活各一兩紫

胡 前胡各半兩

右吹咀作二十服每服用水二鍾煎至八分溫服上多食後服下多食前服服此仍用黃藥並治

黃楊梅瘡方 雄黃 沉香銘三乳香沒藥 硃砂銘五血竭三分黑鉛 水銀各一錢

右為末均作紙燃七條用香油點灯放床上令病人兩腿抱住上用單被通身蓋之口噙冷水頻

頻換之則不損口頭一日用三條後每日用一條黃之有效

又方 水銀 板硃 黑鉛各三錢 白花蛇一錢