

第三十九冊

傷寒門

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新詩書局發行

圖書集成醫部全錄

欽定古今圖書集成醫部全錄第三十九冊目錄

卷三百四十三彙考三百四十三

傷寒門九

成無己傷寒明理論

- ①短氣——②搖頭——③痙瘓——④不仁——⑤直視——⑥鬱冒——⑦動——
- ⑧白利——⑨筋陽肉瞤——⑩熱入血室——⑪發黃——⑫發狂——⑬霍——
- ⑭畜血——⑮勞復——

張從政儒門事親

①解利傷寒——二

李杲十書

- ①辨陰陽——三 ②辨脈——三 ③辨內外——三 ④辨寒熱——四 ⑤辨手心手背——五 ⑥
- 辨口鼻——五 ⑦辨氣——五 ⑧辨頭痛——五 ⑨辨筋骨四肢——六 ⑩辨飲食——六 ⑪辨
- 渴——六 ⑫傷寒之因——六 ⑬冬傷於寒春必溫病——七 ⑭論兩感——七 ⑮論表裏中三
- 證——六 ⑯論傳經——六 ⑰太陽證——六 ⑱太陽頭痛——六 ⑲治不可越經——六 ⑳太
- 陽禁忌——六 ㉑當汗——六 ㉒不當汗——六 ㉓當汗不汗——六 ㉔發汗過多——六 ㉕不

當汗而汗——①血證——②知可解——③證知解不解——④脈知解不解——⑤九味羌活湯解利法——⑥當汗而下成協熱利——⑦裏傳表——⑧誤下變有輕重——⑨五苓散爲下藥——⑩藥有標本陰陽——⑪加減涼膈散——⑫陽明證——⑬陽明禁忌——⑭論汗下——⑮論諸白虎湯——⑯煩躁——⑰譫妄——⑱傷寒雜證發熱相似——⑲狂言譫語鄭聲——⑳陽證發斑——㉑陽證有九經——㉒三陽從中治——㉓論下——㉔少陽證——㉕少陽禁忌——㉖論半表半裏——㉗熱有虛實——㉘潮熱——㉙太陰證——㉚可汗——㉛可溫——㉜可下——㉝知可解——㉞太陰禁忌——㉟少陰證——㊱下利——㊲少陰禁忌——㊳六經發熱治法——元

卷三百四十四彙考三百四十四

傷寒門十

朱震亨心法

①傷寒傷風——元

王履齋洄集

①仲景傷寒立法考——②

③傷寒溫病熱病說——④

⑤三陰病或寒或熱辨——⑥

⑦陽虛

陰盛陽盛陰虛論——⑧

⑨三百九十七法辨——元

⑩四逆厥辨——四

元

元

元

卷三百四十五彙考三百四十五

傷寒門十一

陶華全生集

- ①提綱一四 ②統論一四 ③標本一五 ④傳足不傳手論一五 ⑤三陰無傳經一四
⑥辨正傷寒溫病熱證一四 ⑦辨傷寒傷風中寒不同一四 ⑧審證問因察形正名一四
⑨傳經證治脈要一五 ⑩辨內外傷一五 ⑪察色一五 ⑫聽聲一五 ⑬觀形一五 ⑭
視鼻一五 ⑮詳口唇齒牙一五 ⑯驗耳一五 ⑰看目一五 ⑱審舌一五 ⑲按心胃有
無痛處一五 ⑳問大小便通利一五 ㉑問渴與不渴一五 ㉒持脈手法一五 ㉓浮中沉
三候脈形狀主病一六

卷三百四十六彙考三百四十六

傷寒門十二

陶華全生集

- ①內外傷脈法一六 ②憑證不憑脈憑脈不憑證一六 ③傷寒見風脈傷風見寒脈一六

①禁忌一五 ②足太陽經證治一五 ③足陽明經證治一六 ④足少陽經證治一六 ⑤足太陰經證治一七 ⑥足少陰經證治一七 ⑦厥陰經證治一八 ⑧合併病一八 ⑨兩感誤治一七 ⑩急下急溫一七 ⑪脈浮可下脈沉可汗一七 ⑫可汗一七 ⑬不可汗一七 ⑭可下一七 ⑮不可下一七 ⑯可吐一七 ⑰不可吐一七 ⑱可溫一七 ⑲不可溫一七 ⑳用藥寒溫相得一七 ㉑發熱一七 ㉒惡寒一七 ㉓汗後不徹一七 ㉔熱一七 ㉕惡風一七 ㉖潮熱一七 ㉗寒熱往來一七 ㉘煩熱一七 ㉙煩躁一七 ㉚頭痛一七 ㉛頭眩一八 ㉜項背強一八 ㉝頭搖一八 ㉞無汗一八 ㉟自汗一八 ㊱盜汗一八 ㊲頭汗一八 ㊳手足腋下汗一八

卷三百四十七彙考三百四十七

傷寒門十三

陶華全生集

①身體痛一八五 ②動氣一八六 ③口渴一八六 ④口燥舌乾一八六 ⑤吐血一八六 ⑥衄血一八六 ⑦畜血一八九 ⑧嘔吐一八九 ⑨乾嘔一八九 ⑩噦噫氣一八九 ⑪呃逆一八九 ⑫胃脘滿一八九 ⑬結胸一八九 ⑭心下痞一八九 ⑮自利一八九 ⑯便膿血一八九 ⑰譫語一八九 ⑱鄭聲一八九 ⑲懊懣一八九 ⑳發斑一八九 ㉑發黃一八九

卷三百四十八彙考三百四十八

傷寒門十四

陶華全生集

- ①發狂——二七 ②心下滿——二〇 ③欬嗽——二〇 ④喘——二〇 ⑤心下悸——二一 ⑥身振——二三 ⑦戰慄——二三 ⑧腹滿——二三 ⑨腹痛——二三 ⑩小腹痛——二四 ⑪小便不通——二四 ⑫小便數——二五 ⑬小便難少——二六 ⑭小便自利——二六 ⑮不大便——二六 ⑯無表裏證——二七 ⑰陰陽證——二七 ⑱陽證似陰——二六 ⑲陰證似陽——二六 ⑳太陽脈似少陰少陰證似太陽——二九 ㉑陰證身熱而赤——二九 ㉒陰毒——三〇 ㉓胃中冷厥——三〇 ㉔除中——三〇 ㉕寒熱二厥——三〇 ㉖虬厥——三三 ㉗冷結膀胱——三三 ㉘短氣——三三 ㉙多眠——三三 ㉚晝夜偏劇——三三 ㉛不眠——三三 ㉜咽痛——三四 ㉝怫鬱——三四 ㉞驚傷——三五 ㉟奔豚——三五 ㊱狐惑——三五 ㊲漱水不欲嚥——三五 ㊳百合——三六 ㊴瘵瘵——三六 ㊵肉瞶筋惕——三七 ㊶肉苛——三七 ㊷鬱胃——三七 ㊸過經不解——三六 ㊹目直視——三六

卷三百四十九彙考三百四十九

傷寒門十五

陶華全生集

③瘡瘍不言——三元 ④遺尿——三元 ⑤循衣摸牀——二三 ⑥舌卷囊縮——二三 ⑦手足攣搐——二三 ⑧瘡後發腫——二三 ⑨瘡後喜睡——二三 ⑩瘡後遺毒——二三 ⑪瘡後發豌豆瘡——二三 ⑫勞復——二三 ⑬食復——二三 ⑭女勞復——二三 ⑮陰陽易——二三 ⑯瘡後虛弱——二三 ⑰瘡後昏沉——二三 ⑱瘡後飲酒復劇——二三 ⑲臟結——二三 ⑳瘡病——二三 ㉑大頭傷風——二三 ㉒溫病——二三 ㉓熱病——二三 ㉔時氣——二三 ㉕冬溫溫毒——二三 ㉖傷濕中濕風濕——二三 ㉗濕溫——二三 ㉘風溫——二三 ㉙溫瘧——二三 ㉚溫疫——二三 ㉛暑中喝——二三 ㉜寒疫——二三 ㉝霍亂——二三 ㉞婦人傷寒——三元 ㉟熱入血室——二元 ㊱妊娠傷寒——二四 ㊲產後傷寒——二四 ㊳痰證類傷寒——二四 ㊴食積類傷寒——二四 ㊵虛煩類傷寒——二四 ㊶腳氣類傷寒——二五 ㊷瘀血發熱類傷寒——二五

樓英醫學綱目.....二五

①節候用藥——二五 ②陰毒——二五

卷三百五十彙考三百五十

傷寒門十六.....二五

李梴醫學入門.....二五

①太陽經證——二五 ②陽明經證——二五 ③少陽經證——二五 ④太陰經證——二五 ⑤少陰經證——二五 ⑥厥陰經證——二五 ⑦日數——二五 ⑧標本——二五 ⑨榮衛——二五 ⑩經腑

趙獻可醫貫

- ①論傷寒——二五 ②溫病論——二五
③少陽禁汗禁下——二五 ④三陰有中有傳——二五 ⑤論傷足不傷手——二五 ⑥辨
傳足不傳手——二五 ⑦論表裏——二五 ⑧辨陰陽——二五 ⑨表裏俱無——二五 ⑩表裏俱有
——二五 ⑪當汗——二五 ⑫當下——二五 ⑬不可汗——二五 ⑭不可下——二五 ⑮不可灸——
二五 ⑯不可吐——二五 ⑰急下——二五 ⑱急溫——二五 ⑲過經不解——二五 ⑳暫補——二五
㉑大法——二五 ㉒論正傷寒名義——二五 ㉓傷寒——二五 ㉔傷風——二五 ㉕兩感——二五
㉖傷風見寒傷寒見風——二五 ㉗合病——二五 ㉘併病——二五 ㉙疫厲——二五 ㉚溫熱病
——二五 ㉛晚發——二五 ㉜冬溫——二五 ㉝暑暍——二五 ㉞寒疫——二五 ㉟風溫——二五 ㊱
風濕——二五 ㊲寒濕——二五 ㊳中濕——二五 ㊴濕痹——二五 ㊵瘧瘵——二五 ㊶溫瘧——二五
㊷霧露——二五 ㊸水證——二五 ㊹黃疸——二五 ㊺冒風——二五

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百四十三

傷寒門九

金成無己傷寒明理論

㊟短氣

傷寒短氣，何以明之？短氣者，氣短而不能相續者是矣。似喘而非喘者，有氣上衝而實非氣上衝也。喘者，張口擡肩，搖身滾肚，謂之喘也。氣上衝者，腹裏氣時時上衝也。所謂短氣者，呼吸雖數而不能相續，似喘而不搖肩，似呻吟而無痛者，短氣也。經所謂短氣者，衆實爲難辨之證。愚醫莫識之爲治，有誤者多矣。要識其短氣之真者，氣急而短促，謂之氣短者是也。短氣有責爲虛者，有責爲實者，要當明辨之。經曰：『趺陽脈微而緊，緊則爲寒，微則爲虛，微緊相搏，則爲短氣。』此爲短氣之虛者也。『短氣腹滿而喘，有潮熱，此外欲解，可攻裏也。』此爲短氣之實者也。又有屬表又有屬裏者，要當審視之。經曰：『短氣但坐以汗出不徹故也，更發汗則愈。』與其風濕相搏，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，甘草附子湯主之。『者是邪在表而短氣者也。』乾嘔短氣，汗出不惡寒者，此表解裏未和也。十棗湯主之。與其太陽病醫反下之，短氣煩躁，心懊憹，陽氣內陷，心下因輟，則爲結胸，大陷胸湯主之。『是邪氣在裏而短氣者也。虛也，實也，在表也，在裏也，皆作短氣，又何以辨虛實也？大凡心腹脹滿而短氣者，邪在裏而爲實也。腹滿

滿而短氣者，邪在表而爲虛也。大抵短氣爲實，金匱要略曰：『短氣不足以息者實也。』又水停心下，亦令短氣，金匱要略曰：『食少飲多，水停心下微者短氣。』卽此觀之，短氣之由亦衆矣，必審其形候使的而不惑，必審其邪氣在表裏之不差，隨證攻之，了無不愈者矣。

⑤ 搖頭

傷寒搖頭，何以明之頭者，諸陽之會也。諸陽之脈，皆上於頭，諸陰脈皆至頸胛中而還陽脈，不治則頭爲之搖，傷寒搖頭有三，皆所主不同也。有曰：搖頭言者裏痛也，以裏有痛者言語則劇，欲言則頭爲之戰搖也。有曰：獨搖頭卒口噤背反張者，瘧病也，以風盛於上，風主動搖故也。裏痛非邪也，痛使之然。瘧病非逆也，風使之然。至於陽反獨留形體如煙熏直視搖頭者，又謂之心絕，蓋心藏神而爲陰之本，陽根於陰，陰根於陽，陰陽相根，則榮衛上下相隨矣，絕則神去而陰竭陽無根者，則不能自主持，故頭爲之搖矣。王冰曰：『滋苗者宜固其根，伐下者必枯其上，內絕其根，外作搖頭，又何疑焉？心絕者眞病也，風瘧裏痛者邪氣也，觀其頭搖，又當明其臧否焉。』

⑥ 瘧瘧

傷寒瘧瘧，何以明之瘧者，筋脈急也，瘧者，筋脈緩也。急者則引而縮，緩者則縱而伸。或縮或伸，動而不止者，名曰瘧瘧，俗謂若搐者是也。黃帝內經曰：『病筋脈相引而急，名曰瘧瘧。瘧謂之契合之契也，行則緩，臥則緊，從則縱。瘧疾之縱者，謂若放縱之縱也。以急爲瘧，以緩爲瘧，理至明矣。瘧瘧者，風疾也，而癰癰則瘧瘧焉。傷寒瘧瘧者，邪熱氣極也，熱盛則風搏併經絡，風主動，故四肢瘧瘧而不甯也。故風溫被火者，曰發微黃色，劇者如驚癰時，瘧瘧言其熱氣之劇盛也。傷寒病至於發瘧瘧者，疾勢已過矣，多難可制。內經曰：『太陽終者，戴眼反折，瘧瘧，絕汗乃出，大如貫珠，著身不流。』是見其瘧瘧爲已過之疾也。又有四肢繫習爲四肢動而不止，似瘧瘧而無力，不得伸縮者也。此爲肝絕，瘧瘧之證，雖難已，若能以祛風滌熱之劑，折其大勢，則瘧瘧亦有生者。若妄灼火或飲以發表之藥，則死不旋踵。經曰：『一逆尚引日，再逆促命期。』

⑤ 不仁

傷寒不仁，何以明之？仁柔也，不仁謂不柔和也。癢不知也，痛不知也，寒不知也，熱不知也，任其屈伸灸刺不知，所以然者，是謂不仁也。由邪氣擁盛，正氣爲邪氣閉伏，鬱而不發，榮衛血氣虛少，不能通行，致斯然也。內經曰：「榮氣虛則不仁。」鍼經曰：「衛氣不行，則爲不仁。」經曰：「榮衛不能相將，三焦無所仰，身體痺不仁。」卽是言之。知榮衛血氣虛少，不能通行，爲不仁者，明矣。經曰：「諸乘寒者，則爲厥。」鬱冒不仁，言此厥者是正氣爲寒氣所乘，爲厥氣也，非四肢逆冷之厥也。何者？蓋以鬱冒爲昏冒，不仁爲不知痛癢，得不爲尸厥之厥耶？經曰：「少陰脈不至，腎氣微少，精血奔氣促逼，上入胃脘，宗氣反聚，血結心下，陽氣退下，熱歸陰股，與陰相動，令身不仁，此爲尸厥。」其乘寒之厥，鬱冒不仁，卽此尸厥可知矣。昔越人入虢，診太子爲尸厥，以鬱冒不仁爲可治，刺之而得痊濟者，實神醫之診也。嗚呼！設或脈浮而洪，身汗如油，喘而不休，水漿不下，形體不仁，此又爲命絕，雖越人其能起之歟！

⑥ 直視

傷寒直視，何以明之？直視者，視物而目睛不轉動者是也。若目睛轉動者，非直視也。水之精爲志，火之精爲神，目者心之使也，神所寓焉。肝之外候也，精神榮焉。鍼經曰：「五臟六腑之氣，皆上注於目而爲之精，精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑睛，血之精爲絡氣，之精爲白睛，肌肉之精爲約束，裏攣筋骨血氣之精，與脈并爲系，上屬於腦，五臟血氣調和，精氣充榮，則目和而明矣。傷寒目直視者，邪氣壅盛，冒其正氣，使神智不慧，藏精之氣不上榮於目，則目爲之直視。傷寒至於直視，爲邪氣已極，證候已逆，多難治。經曰：「衄家不可發汗，汗出則額上陷，脈急，直視不能眴，不得眠，以肝受血而能視，亡血家肝氣已虛，目氣已弱，又發汗亡陽，則陰陽俱虛所致也。此雖錯逆，其未甚也。逮乎狂言反目直視，又爲腎絕，直視搖頭，又爲心絕，皆臟氣脫絕也。直視讞語喘滿者，死下利者，亦死。又劇者發則不識人，循衣摸牀，惕而不安，微喘直視，脈弦者，生，濇者，死。皆邪氣盛而正氣脫也。其或有目中不了了，睛不和，無表裏證，大便難，身微熱者，是非直視也。此爲內實也，可用大承氣湯大柴胡湯下之。直視爲不治之疾，目中不了了

爲可治之候，二者形證相近，其爲工者，宜熟視之。

鬱冒

傷寒鬱冒，何以明之？鬱爲鬱結而氣不舒也，冒爲昏冒而神不清也，世謂之昏迷者是也。鬱冒之來，皆虛極而乘寒則有之矣。經曰：「諸乘寒者，則爲厥，鬱冒不仁。」又曰：「太陽病先下之而不愈，因復發汗，以此表裏俱虛，其人因致冒，冒家汗出自愈。」所以然者，汗出表和故也。是知因虛乘寒，乃生鬱冒。金匱要略曰：「新產婦人有三病，一者病痙，二者病鬱冒，三者大便難，亡血復汗，寒多，故令鬱冒。」又曰：「產婦鬱冒，其脈微弱，嘔不能食，大便堅，所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出。」即此觀之，鬱冒爲虛寒可知矣。又或少陰病下利止而頭眩，時時自冒者，又爲死證。蓋謂其虛極而脫也。觀其鬱冒，幸無忽焉。

動氣

傷寒動氣，何以明之？動氣者，爲築築然動於腹中者是矣。臟氣不治，隨臟所主，發泄於臍之四旁，動跳築築然，謂之動氣。難經曰：「肝內證，臍左有動氣，按之牢若痛，心內證，臍上有動氣，按之牢若痛，肺內證，臍下有動氣，按之牢若痛，是臟氣不治，腹中氣候發動也。動氣應臟，是皆真氣虛，雖有表裏攻發之證，即不可汗下。」經曰：「動氣在左，不可發汗，汗則頭眩，汗不止，筋惕肉瞤，是發汗而動肝氣者也。動氣在左，不可下，下之則腹內拘急，食不下，動氣更劇，雖有身熱，臥則欲蹠，是下之而動肝氣者也。動氣在上，不可發汗，汗則氣上衝，正在心端，是發汗而動心氣者也。動氣在上，不可下，下之則掌握熱煩，身上浮冷，熱汗自泄，欲得水自灌，是下之而動心氣者也。動氣在右，不可發汗，汗則銼而渴，心苦煩，飲即吐水，是發汗而動肺氣者也。動氣在右，不可下，下之則津液內竭，咽燥鼻乾，頭眩心悸，是下之而動肺氣者也。動氣在下，不可發汗，汗之則無汗，心中大煩，骨節苦痛，目運惡寒，食則反吐，穀不得下，是發汗而動腎氣者也。動氣在下，不可下，下之則腹脹滿，卒起頭眩，食則下清，穀心下痞，是下之而動腎氣者也。且脾內證，當臍有動氣，經特曰：「臍之四旁動氣，不可汗下。」獨不言脾候，當臍有動氣者，以脾者中州爲胃，以行津液，發汗吐下

猶先動脾，况脾家發動氣者，詎可動之也。所以特不言之也。傷寒所以看外證爲當者，蓋不在脈之可見，必待問之可得者發汗吐下，務要審諦，舉此動氣類可知矣。

◎自利

傷寒自利，何以明之？自利者，有不經攻下自然漉泄者，謂之自利也。傷寒自利多種，須知冷熱虛實消息，投湯無致失差。雜病自利，多責爲寒，傷寒下利，多由協熱，其與雜病有以異也。表邪傳裏，裏虛協熱，則利不應下而便攻之。內虛協熱遂利，是皆協熱也。又合病家皆作自利，太陽與陽明合病，必自下利，葛根湯主之。太陽與少陽合病，必自下利，黃芩湯主之。陽明與少陽合病，必自下利，大承氣湯主之。三者皆合病下利，一者發表，一者攻裏，一者和解，所以不同者，蓋六經以太陽陽明爲表，少陽太陰爲在半表半裏，少陰厥陰爲在裏。太陽陽明合病爲在表者也，雖曰下利，必發散經中邪氣而後已，故以葛根湯以汗之。太陽與少陽合病爲在半表半裏者也，雖曰下利，必和解表裏之邪而後已，故與黃芩湯以散之。陽明少陰合病爲少陽邪氣入腑者也，雖曰下利，必逐去胃中之實而後已，故與承氣湯以下之。是三者所以有異也。下利家何以明其寒熱耶？且自利不渴屬太陰，以其臟寒故也。下利欲飲水者，以有熱也。故大便溲，小便自可者，此爲有熱；自利小便色白者，少陰病形悉具，此爲有寒。惡寒脈微，自利清穀，此爲有寒，發熱後重，泄色黃赤，此爲有熱，皆可理其寒熱也。凡腹中痛，轉氣下趨少腹者，此欲自利也。自利家身涼脈小爲順，身熱脈大爲逆。少陰病脈緊下利，脈暴微手足反溫，脈緊反去者，此爲欲解。下利脈大者爲未止，脈微弱者數者爲欲自止，雖發熱不死，是知下利脈大爲逆，而脈小爲順也。自利宜若可溫，理中白通諸四逆輩，皆溫臟止利之劑。又有腸胃有積結，與下焦客邪，皆溫劑不能止之，必也或攻泄之，或分利之而後已。經曰：「理中者，理中焦。」此利在下焦，宜赤石脂禹餘糧湯。復利不止，當利其小便，是泄在下焦，漉泄而聚利者也。少陰病自利清水，色純青，心下必痛，口乾燥，與下利三部皆平，按之心下硬，或脈沉而滑，或不欲食而譫語，或差後至年月日復發，此數者皆腸有積結而須攻泄者也。內經註曰：「大熱內結注泄不止，熱宜寒療，結伏須除，以寒下之，結散利止，大寒凝內，久利漉瀉。」

愈而復發，綿歷歲年，以熱下之，寒去利止，謂之通因通用。『下利雖有表證，又不可發汗，以下利爲邪氣內攻，走津液而胃虛也。故經曰：『下利不可攻其表，汗出必脹滿。』者是矣。大抵下利脫氣至急五奪之中，此爲甚者，其或邪盛正虛，邪擁正氣下脫，多下利而死。何以言之？經曰：『下利日十餘行，脈反實者死。發熱下利至甚，脈不止者死。直視，識語下利者死。下利手足厥冷無脈者，灸之不溫，脈不還者死。少陰病自利，復煩躁不得臥寐者死。』此數者皆邪擁正氣下脫而死者也。金匱要略曰：『六腑氣絕於外者，手足寒，五臟氣絕於內者，利下不禁。』嗚呼！疾成而後藥，雖神醫不可爲已。氣既脫矣，孰能治之？

筋惕肉瞤

傷寒筋惕肉瞤，何以明之？然在傷寒中，非常常有者，必待發汗過多，亡陽則有之矣。內經曰：『陽氣者，精則養神，柔則養筋，發汗過多，津液枯少，陽氣大虛，筋失所養，故惕然而跳，瞤然而動也。太陽病，脈微弱，汗出惡風者，不可服大青龍湯，服之則厥逆筋惕肉瞤，此爲逆也。』太陽病發汗，汗出不解，其人仍發熱，頭眩，身瞤動，振振欲僻地者，真武湯主之。動氣在左，不可發汗，發汗則頭眩汗不止，筋惕肉瞤。『卽是觀之，其由發汗多，亡陽陽虛可見矣。茲雖逆也，止於發汗亡陽而表虛，治以溫經益陽則可矣。或因吐下發汗，表裏俱虛而有此狀者，又非但發汗後所可同也。經曰：『傷寒吐下後，發汗虛煩，脈甚微，八九日心下痞硬，脅下痛，氣上衝咽喉，眩冒，筋脈動惕者，久而成痿，此爲逆之甚者也。』太陽病發汗復下之後，表裏俱虛，復加燒鍼，因胃煩，面色青黃，膚瞤者，難治。茲爲逆之甚者也。發汗吐下庸可忽諸！

熱入血室

傷寒熱入血室，何以明之？室者，屋室也，謂可以停止之處。人身之血室者，榮血停止之所，經脈留會之處，卽衝脈是也。衝脈者，奇經八脈之一脈也，起於腎下，出於氣衝，並足陽明經俠臍上行至胃中，而散爲十二經脈之海。王冰曰：『衝爲血海，言諸經之血，朝會於此。』男子則運行生精，女子則上爲乳汁，下爲月水。內經曰：『任脈通，衝脈盛，月

事以時下『者是也。王冰曰：『陰靜海滿而去血，謂衝脈盛爲海滿也。』卽是觀之，衝是血室可知矣。傷寒之邪，婦人則隨經而入，男子由陽明而傳，以衝之脈，與少陰之絡起於腎，女子感邪太陽，隨經便得而入，衝之經並足陽明，男子陽明內熱方得而入也。衝之得熱，血必妄行，在男子則下血，讖語在婦人則月水適來，陽明病下血，讖語此爲熱入血室者，斯蓋言男子不止謂婦人而言也。婦人傷寒經水適來，與經水適斷者，皆以經氣所虛，宮室不關邪得乘虛而入。鍼經有言曰：『邪氣不得其虛，不能獨傷人。』者是矣。婦人熱入血室，有須治而愈者，有不須治而愈者，又各不同也。婦人中風發熱惡寒，經水適來，得之七八日，熱除而脈遲身涼，和胃脅下滿，如結胃狀，讖語者，此爲熱入血室，當刺期門，隨其實而瀉之。與其婦人中風七八日，續得寒熱發作有時，經水適斷者，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。二者是須治而愈者也。婦人傷寒發熱，經水適來，晝則明了，暮則讖語，如見鬼狀者，此爲熱入血室，無犯胃氣及上二焦，必自愈，是不須治而愈者也。讖語爲病邪之甚者，何不須治而愈耶？且胃脅滿如結，胃讖語是邪氣留結於胃脅而不去者，必刺期門，隨其實而瀉之。寒熱如瘧，發作有時者，是血結而不行也，須小柴胡湯散之。二者既有留邪，必須治之可也。若發熱經水適來，晝日明了，暮則讖語，此則經水既來，以裏無留邪，但不妄犯熱，隨血散必自愈。經曰：『血自下，下者愈。』故無犯胃氣及上二焦，必自愈。所謂妄犯者，謂恐以讖語爲陽明內實攻之，犯其胃氣也。此無胃脅之邪，恐刺期門犯其中焦也。此無血結恐與小柴胡湯犯其上焦也。小柴胡湯解散則動衛氣，衛出上焦動衛氣是犯上焦也。刺期門則動榮氣，榮出中焦動榮氣是犯中焦也。脈經有曰：『無犯胃氣及上二焦。』豈謂藥不謂鍼耶？此其是歟！

發黃

傷寒發黃，何以明之？經曰：『濕熱相交，民當病疸。』疸者黃也，單陽而無陰者也。傷寒至於發黃，爲病之甚也。濕也，熱也，甚者則發黃。內熱已盛，復被火者，亦發黃也。邪風被火，熱兩陽相熏灼，其身必發黃。陽明病被火，額上微汗出，小便不利者，必發黃，是由內有熱而被火致發黃者也。陽明病無汗，小便不利，心中懊憹者，必發黃，是由陽明熱盛

致發黃者也。傷寒發汗已，身目爲黃，所以然者，寒濕在裏不解故也，以爲不可下也。於寒濕中求之，是由寒濕致發黃者也。濕亦令黃也，熱亦令黃也，其能辨之乎？二者非止根本元來有異，而色澤亦自不同。濕家之黃也，身黃如似熏黃，雖黃而色暗不明也。至於熱盛之黃也，必身黃如橘子色，甚者勃勃出染著衣，正黃如蘗，是其正黃色也。由是觀之，濕之與熱，豈不異哉？大抵黃家屬太陰，太陰者脾之經也。脾者土，黃土色也。脾經爲濕熱蒸之，則色見於外，必發身黃。經曰：「傷寒脈浮緩，手足自溫者，是爲繫在太陰。太陰當發身黃者是矣。熱雖內盛，若已自汗出，小便利者，則不能發黃，必也頭汗出，身無汗，劑頸而還，小便不利，渴飲水漿，此爲瘀熱在裏，身必發黃。黃家爲熱盛而治法亦自有殊。傷寒八九日，身如橘子色，小便不利，小腹滿者，茵陳蒿湯主之。此欲泄滌其熱也。傷寒身黃發熱者，梔子蘗皮湯主之。此欲解散其熱也。傷寒瘀熱在裏，身必發黃，麻黃連翹赤小豆湯主之。此欲解散其熱也。此數者泄滌解散，乃爲之不同，亦皆折火微熱之劑也。一或身黃脈沉結，少腹硬而小便不利，其人如狂者，又爲畜血在下焦，使之黃也，必須抵當湯下之而愈。黃家既爲病之已極，是以有不治之者多矣。非止寸口近掌無脈，鼻氣出冷，爲不治之疾。又若形體如煙熏，直視搖頭者是，爲心絕，環口黧黑，柔汗發黃，是爲脾絕，皆不治之診，醫者更詳視之。

發狂

傷寒發狂，何以明之？狂者，猖狂也，謂其不甯也。難經曰：「狂之始發也，少臥不餓，而自高賢也，自辨智也，自貴倨也，妄笑好歌樂也，妄行走不休也，狂家所起，皆陽盛致然。」內經曰：「陰不勝其陽，脈留薄疾，并乃狂也。」又曰：「邪入於陽則狂，邪入於陰則瘖。」難經曰：「重陽者狂，重陰者瘖。」脈經曰：「陰附陽則狂，陽附陰則瘖。」病源曰：「陽邪并於陽則狂，陰邪并於陰則瘖。」即諸經之狂，爲陽盛也明矣。又陽明之病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，心欲動，獨閉戶牖而處，甚則欲上高而歌，棄衣而走，踰垣上屋，其所上之處，皆非素能者，是謂陽邪并於陽明也。傷寒熱毒在胃，并於心臟，使神不甯而志不定，遂發狂也。傷寒至於發狂，邪熱至極也，非大吐下則不能已。又有熱在下焦，其人如狂者，經曰：「熱入膀胱，其人如狂。」謂之如狂，則未至於狂，但臥起不安爾。其或狂言目反直視，又爲腎