

重刊巢氏諸病源候總論卷四十四

婦人產後病諸候下

凡四十一論

產後月水不利候

手太陽少陰之經主下為月水太陽小腸之經少陰心之經也心主血脈因產傷動血氣其後虛損未復而為風冷客於經絡冷搏於血則血凝澀故令月水不利也

產後月水不調候

夫產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少乍在月前乍在月後故為不調也

產後月水不通候

夫產傷動血氣其後虛損未平復為風冷所傷血之為性得冷則凝結故風冷傷經血結於胞絡之間故令月水不通也凡血結月水不通則變成血瘕水血相并後遇脾胃衰弱肌肉虛者變水腫也

產後帶下候

帶下之病由任脈虛損任脈為經絡之海產後血氣勞損未平復為風冷所乘傷於任脈冷熱相交冷多則白多熱多則赤多也相兼為帶下也

又云帶下有三門一曰胞門二曰龍門三曰玉門產後屬胞門謂因產傷損胞絡故也

產後崩中惡露不盡候

產傷於經血其後虛損未平復或勞役損動而血暴崩下遂因淋瀝不斷時來故謂崩中惡露不盡凡崩中為小腹急滿為內有瘀血不可斷之斷之終不斷而加小腹脹滿為難若無瘀血則可斷易治也

產後利候

產後虛損未平復而起早傷於風冷風冷乘虛入於大腸腸虛則泄故令利也產後利若變為血利則難治世謂之產子利也

產後利腫候

因產勞傷榮衛脾胃虛弱風冷乘之水穀不結大腸虛則洩成利也利而腫者脾主土候肌肉土性本剋水今脾氣衰微不能剋消水水氣流溢散在皮膚故令腫也

產後虛冷洞利候

產勞傷而血氣虛極風冷乘之入於腸胃腸胃虛而暴得冷腸虛則泄遇冷極虛故變洞利也

產後滯利候

產後虛損冷熱之氣客於腸間熱乘血血滲於腸則赤冷搏腸間津液則變白其冷熱相交故赤白相雜連滯不止故謂滯利也

產後冷熱利候

產後藏虛而冷熱之氣入於腸胃腸虛則泄故成冷熱利凡利色青與白為冷黃與赤為熱不止熱甚則變生血冷極則生白膿膿血相雜冷熱不調則變滯利也

產後客熱利候

產後藏虛而熱氣乘之熱入於腸腸虛則洩故為客熱利色黃是也熱甚則黃赤而有血也

產後赤利候

赤利血利也因產後血虛為熱氣所乘熱搏血滲入腸腸虛而洩為血利凡血利皆是多熱熱血不止蘊瘀成膿血利也

產後陰下脫候

產而陰脫者由宿有虛冷因產用力過度其氣下衝則陰下脫也

產後陰道痛腫候

藏氣宿虛因產風邪乘於陰邪與血氣相搏在其腠理故令痛血氣為邪所壅否故腫也

產後陰道開候

子藏宿虛因產冷氣乘之血氣得冷不能相榮故令開也

產後遺尿候

因產用氣傷於膀胱而冷氣入胞囊胞囊缺漏不禁小便故遺尿多因產難所致

產後淋候

因產虛損而熱氣客胞內虛則氣數熱則洩少故成淋也

產後渴利候

渴利者渴而引飲隨飲隨小便而謂之渴利也膀胱與腎為表裏膀胱為津液之府婦人以腎繫胞產則血水俱下傷損腎與膀胱之氣津液竭燥故令渴也而腎氣下通於陰腎虛則不能制少故小便數是為渴利也

產後小便數候

胞內宿有冷因產氣虛而冷發動冷氣入胞虛弱不能制其小便故令數

產後尿血候

夫產傷損血氣血氣則虛而挾於熱搏於血血得熱流散滲於胞故血隨尿出是為尿血

產後大小便血候

夫產傷動血氣府藏勞損血傷未復而挾於熱血得熱則流行大腸及胞囊虛則血滲入之故因大小便血出也

產後大小便不通候

大小腸宿有熱因產則血水俱下津液暴竭本挾於熱大小腸未調和故令大小便澀結不通也

產後大便不通候

腸胃本挾於熱因產又血水俱下津液竭燥腸胃否澀熱結腸胃故大便不通也

產後小便不通候

因產動氣氣衝於胞胞轉屈辟不得小便故也亦有小腸本挾於熱因產水血俱下津液竭燥胞內熱結則小便不通也然胞轉則小腹脹滿氣急絞痛若虛熱津液竭燥者則不甚脹急但不通津液生氣和則小便也

產後小便難候

產則津液空竭血氣皆虛有熱客於胞者熱停積故小便否澀而難出

產後嘔候

胃為水穀之海水穀之精以為血氣血氣榮潤府藏因產則府藏傷動有血虛而氣獨盛者氣乘腸胃腸胃燥澀其氣則逆故嘔不下食也

產後欬嗽候

肺感微寒則成欬嗽而肺主氣因產氣風冷傷於肺故令欬嗽也

產後時氣熱病候

四時之間忽有非節之氣而為病者謂之時氣產後體虛而非節之熱氣傷之故為產後時氣熱病也診其脈弦小者足溫則生足寒則死凡熱病脈應浮滑而懸急以為不順手足應溫而反冷為四逆必死也

產後傷寒候

觸冒寒氣而為病謂之傷寒產婦血氣俱虛日月未滿而起早勞動為寒所傷則嗇嗇惡寒吸吸微熱數日乃歇重者頭及骨節皆痛七八日乃瘥也

產後寒熱候

因產勞傷血氣使陰陽不和互相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽相加故發寒熱凡產餘血在內亦令寒熱其腹時刺痛者是也

產後瘥候

大瘥者由夏傷於暑客在皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發故瘥休作有時其發時節漸晏者此由邪客於風府邪循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作日晏其發早者衛氣之行風府日下一節二十一日至尾骶二十二日入脊內上注於伏衝之脈其行九日出於缺盆之內其氣既上故其病發更早其間日發者由邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日蓄積乃發產後血氣損傷而宿經傷暑熱令因產虛復遇風邪相折陰陽交爭邪正相干故發作成瘥也

產後積聚候

積者陰氣五藏所生聚者陽氣六府所成皆由飲食失節冷熱不調致五藏之氣積六府之氣

聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沈伏故痛不離其部聚為陽氣陽性浮動故痛無常處產婦血氣傷損府藏虛竭為風冷所乘搏於藏府與氣血相結故成聚也

產後癥候

癥病之候腹內塊按之牢強推之不移動是也產後而有癥者由藏虛餘血不盡為風冷所乘血則凝結而成癥也

產後癖候

癖病之狀脅下弦急刺痛是也皆由飲食冷熱不調停積不消所成產後藏虛為風冷搏於停飲結聚故成癖也

產後內極七病候

產後血氣傷竭為內極七病則舊方所云七害也一者害食二者害氣三者害冷四者害勞五者害房六者害任七者害睡皆產時傷動血氣其後虛極未平復犯此七條而生諸病凡產後氣血內極其人羸疲萎黃冷則心復絞痛熱則肢體煩疼經血否澀變為積聚癥瘕也

產後目瞑候

目不痛不動但視物不明謂之目瞑肝藏血候應於目產則血虛肝氣不足故目瞑也

產後耳聾候

腎氣通耳而婦人以腎繫胞因產血氣傷損則腎氣虛其經為風邪所乘故令耳聾也

產後虛熱口生瘡候

產後口生瘡者心藏虛熱心關竅於口而主血脈產則血虛藏有客熱氣上衝胸膈熏發於口故生瘡也

產後身生瘡候

產則血氣傷損腠理虛為風所乘風邪與血氣相搏藏府上熱熏發肌膚故生瘡也

產後乳無汁候

婦人手太陽少陰之脈下為月水上為乳汁妊娠之人月水不通初以養胎既產則水血俱下津液暴竭經血不足者故無乳汁也

產後乳汁溢候

婦人手太陽少陰之脈上為乳汁其產雖血水俱下其經血盛者則津液有餘故乳汁多而溢出也

重刊巢氏諸病源候總論卷四十四終

重刊巢氏諸病源候總論卷四十五

小兒雜病諸候一

凡二十九論

養小兒候

經說年六歲已上為小兒十八已上為少年三十已上為壯年五十已上為老年也其六歲已還者經所不載是以乳下嬰兒病難治者皆無所承按故也中古有巫方立小兒顛顛經以占天壽判疾病死生世所相傳有小兒方焉逮乎晉宋推諸蘇家傳襲有驗流於人間小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易傷損皆當以故絮著衣莫用新綿也天和暖無風之時令母將抱日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳之內重衣溫暖譬如陰地之草木不見風日軟脆不任風寒有當薄衣薄衣之法當從秋習之不可以春夏卒減其衣則令中風寒從秋習之以漸稍寒如此則必耐寒冬月但當著兩薄襦一複裳耳非不忍見其寒適當佳耳愛而暖之適所以害也又當消息無令汗出汗出則致虛損便愛風寒晝夜寤寐皆當慎之其飲乳食哺不能無疾癖常當節適乳哺若微不進仍當將護之凡不能進乳哺則宜下之如此則終不致寒熱也又小兒始生生氣尚盛無有虛勞微惡則須下之所損不足言及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣其冬月下之難將護然有疾者不可不下夏月下之後腹中常當小脹滿故當節哺乳將護之數日間又節哺之當令多少有常劑兒稍大食哺亦當稍

增若減少者此是腹中已有小不調也便當微將藥勿復哺之但當乳之甚者十許日輕者五六日身當如常若都不肯食哺而但飲乳者此是有癖為疾重要當下之不可不下不下則致寒熱或吐而發癰或致下利此皆病重不早下之所為也則難治先治其輕時兒不耗損而病速除矣小兒所以少病癰者其母懷娠時時勞役運動骨血則氣強胎養盛故也若侍御多血氣微胎養弱則兒軟脆易傷故多病癰兒皆須著帽項衣取燥菊花為枕枕之兒母乳母三時摸兒項風池若壯熱者即須熨使微汗微汗不瘥便灸兩風池及背第三推第五推第七推第九推兩邊各二壯與風池凡為十壯一歲兒七壯兒大者以意節度增壯數可至三十壯唯風池特令多七歲已上可百壯小兒常須慎護風池諺云戒養小兒慎護風池風池在頸項筋兩轅之邊有病乃治之疾微慎不欲妄針灸亦不用輒吐下所以然者針灸傷經絡吐下動府藏故也但當以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又以臍中膏塗之令兒在涼處勿禁水洗常以新水洗新生無疾慎不可逆針灸逆針灸則忍痛動則脈喜因成癰河洛間土地多寒兒喜病瘕其俗生兒三日喜逆灸以防之又灸頰以防噤有噤者舌下脈急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血灸頰以防噤江東地溫無此疾古方既傳有逆針灸之法今人不詳南北之殊便按方用之多害於小兒是以田舍小兒任自然皆得無橫夭又云春夏決定不得下小兒所以爾者小兒府藏之氣軟弱易虛易實下則下焦必益虛上焦生熱熱則生痰痰則成病自非當病不可下也

變蒸候

小兒變蒸者以長血氣也變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其輕者體熱而微驚耳冷體亦冷上唇頭白泡起如死魚目珠子微汗出而近者五日而歇遠者八九日乃歇其重者體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐喁無所苦也變蒸之時目白睛微赤黑睛微白亦無所苦蒸畢自明了矣先變五日後蒸五日為十日之中熱乃除變蒸之時不欲驚動勿令傍邊多人變蒸或早或晚依時如法者少也初變之時或熱甚者違日數不歇審計日數必是變蒸服黑散發汗熱不止者服紫雙丸小瘥便止勿復服之其變蒸之時遇寒加之則寒熱交爭腹痛夭矯啼不止者熨之則愈變蒸與溫壯傷寒相似若非變蒸身熱耳熱體亦熱此乃為他病可為餘治審是變蒸不得為餘治其變日數從初生至三十二日一變六十四日再變且蒸九十六日三變變者丹孔出而泄也至一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百三十日小蒸畢後六十四日大蒸後一百二十八日復蒸積五百七十六日大小畢蒸也

溫壯候

小兒溫壯者由府藏不調內有伏熱或挾宿寒皆搏於胃氣足陽明為胃之經主身之肌肉其胃不和調則氣行壅澀故蘊積體熱名為溫壯候小兒大便秘其糞黃而臭此腹內有伏熱宜將

服龍鬚湯若糞白而酢臭則挾宿寒不消當服紫雙丸輕者少服藥令默除之甚者小增藥令微利皆當節乳哺數日令胃氣和調若不節乳哺則病易復復則傷其胃氣令腹滿再三利尚可過此則傷小兒矣

壯熱候

小兒壯熱者是小兒血氣盛五藏生熱熏發於外故令身體壯熱大體與溫壯相似而有小異或挾伏熱或挾宿寒其挾伏熱者大便黃而臭挾宿寒者糞白而有酸氣此二者府藏不調冷熱之氣俱乘腸胃蘊積染漸而發溫溫然熱不甚盛是溫壯也其壯熱者是血氣盛熏發於外其發無漸壯熱甚以此為異若壯熱不歇則變為驚極重者亦變癇也

驚候

小兒驚者由血氣不和熱實在內心神不定所以發驚甚者掣縮變成癇又小兒變蒸亦微驚所以然者亦由熱氣所為但須微發驚以長血脈不欲大驚大驚乃灸驚脈若五六十日灸者驚復更甚生百日後灸驚脈乃善耳

欲發癇候

夫小兒未發癇欲發之候或溫壯運滯或搖頭弄舌或睡裏驚掣數齧齒如此是欲發癇之證也

癇候

癩者小兒病也十歲已上為癩十歲已下為癩其發之狀或口眼相引而目睛上搖或手足掣縱或背脊強直或頸項反折諸方說癩名證不同大體其發之源皆因三種三種者風癩驚癩食癩是也風癩者因衣厚汗出而風入為之驚癩者因驚怖大啼乃發食癩者因乳哺不節所成然小兒氣血微弱易為傷動因此三種變作諸癩正發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲突不隨也

發癩瘥後身體頭面悉腫滿候

凡癩發之狀或口眼相引或目睛上搖或手足掣縱或背脊強直或頸項反折或屈指如數皆由以兒當風取涼乳哺失節之所為也其癩瘥後而腫滿者是風癩風癩因小兒厚衣汗出因風取涼而得之初發之狀屈指如數然後掣縮是也其癩雖瘥氣血尚虛而熱未盡在皮膚與氣相搏致令氣不宣泄故停井成腫也

發癩瘥後六七歲不能語候

凡癩發之狀口眼相引或目睛上搖或手足瘳瘳或背脊強直或頸項反折屈指如數皆由以兒當風取涼乳哺失節之所為也而癩發瘥後不能語者是風癩風癩因兒衣厚汗出以兒乘風取涼太過為風所傷得之其初發之狀屈指如數然後發瘳瘳是也心之聲為言開竅於口其癩發雖止風冷之氣猶滯心之絡脈使心氣不和其聲不發故不能言也

驚癩候

驚癇者起於驚怖大啼精神傷動氣脈不定因驚而發作成癇也初覺兒欲驚急持抱之驚自止故養小兒常慎驚勿聞大聲每持抱之間常當安徐勿令怖又雷鳴時常塞兒耳并作餘細聲以亂之驚癇當按圖灸之摩膏不可大下何者驚癇心氣不定下之內虛則甚難治凡諸癇正發手足掣縮慎不可捉持之捉之則令曲突不隨也

風癇候

風癇者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣厚汗出腠理開風因而入初得之時先屈指如數乃發掣縮是也當與純心湯又病先身熱瘈瘲驚啼喚而後發癇脈浮者為陽癇內在六府外在肌膚猶易治病先身冷不驚瘈不啼喚乃成病發時脈沈者為陰癇內在五藏外在骨髓極者難治病發時身軟時醒者謂之癇身強直反張如尸不時醒者謂之瘈診其心脈滿大癇瘈筋攣肝脈小急亦癇瘈筋攣尺寸脈俱浮直上直下此為督脈腰背強直不得俛仰小兒風癇三部脈緊急癇可治小兒脈多似雀鬬要以三部脈為主若緊者必風癇凡諸癇發手足掣縮慎勿持之捉則令曲突不隨也

患癇瘥後便發候

癇發之狀或口眼相引目睛上搖或手足瘈瘲或背脊強直或頭項反折或屈指如數皆由當風取涼乳哺失節之所為其瘥之後而更發者是餘勢未盡小兒血氣軟弱或因乳食不節或風冷不調或更驚動因而重發如此者多成常疹凡諸癇止發手足掣縮慎勿持之捉則令曲

突不隨也

傷寒候

傷寒者冬時嚴寒而人觸冒之寒氣入腠理搏於血氣則發寒熱頭痛體疼謂之傷寒又春時應暖而反寒此非其時有其氣傷人即發病謂之時行傷寒者小兒不能觸冒寒氣而病傷寒者多由大人解脫之時久故令寒氣傷之是以小兒亦病之診其脈來一投而止者便是得病一日假令六投而止者便是得病六日其脈來洪者易治細微者難治也

傷寒解肌發汗候

傷寒是寒氣客於皮膚寒從外搏於血氣腠理閉密冷氣在內不得外泄蘊積故頭痛壯熱體疼所以須解其肌膚令腠理開津液為汗發泄其氣則熱歇凡傷寒無問長幼男女於春夏宜發汗又脈浮大宜發汗所以然者病在表故也

傷寒挾實壯熱候

傷寒是寒氣客於皮膚搏於血氣腠理閉密氣不宣泄蘊積生熱故頭痛體疼而壯熱其人本藏氣實者則寒氣與實氣相搏而壯熱者謂之挾實實者有二種有冷有熱其熱實黃而臭其冷實食不消糞白而酸氣此候知之其內雖有冷熱之殊外皮膚皆壯熱也

傷寒兼驚候

傷寒是寒氣客於皮膚搏於血氣使腠理閉密氣不宣泄蘊積生熱故頭痛體疼而壯熱也其

兼驚者是熱乘心心主血脈小兒血氣軟弱心神易動為熱所乘故發驚驚不止則變驚癇也
傷寒大小便不通候

傷寒是寒氣客於皮膚搏於血氣使腠理閉密不宣泄蘊積生熱故頭痛體疼而壯熱其大便不通是寒搏於氣而生熱熱流入大小腸故澀結不通凡大小便不通則內熱不歇故乾嘔或言語而氣還逆上則心腹脹滿也

傷寒腹滿候

傷寒是寒氣客於皮膚搏於血氣使腠理閉密氣不宣泄蘊積生熱故頭痛體疼而壯熱其腹滿者是熱入腹搏於藏藏氣結聚故令腹滿若挾毒者則腹滿心煩懊悶多死

傷寒咽喉痛候

傷寒是寒氣客於皮膚搏於血氣使腠理閉密氣不宣泄蘊積生熱故頭痛體疼壯熱其咽喉痛者是心胸熱盛氣上衝於咽喉故令痛若挾毒則喉痛結腫水漿不入毒還入心煩悶者死

傷寒嗽候

傷寒是寒氣客於皮膚搏於血氣使腠理閉密氣不宣泄蘊積生熱故頭痛體疼而壯熱其嗽者邪在肺肺候身之皮毛而主氣傷寒邪氣先客皮膚隨氣入肺故令嗽重者有膿血也

傷寒後嗽候

傷寒是寒氣客於皮膚搏於血氣使腠理閉密氣不宣泄蘊積生熱故頭痛壯熱體疼也瘥後