

第陸本

隰草類上五十三種

女節錄別女華錄別女選錄別日精錄別東生錄別傳延年錄治牆雅金慈日陰錄別國盈也月今九月菊有黃華事至此而窮處故謂之

之  
 名  
 也  
 曰  
 唐  
 天  
 寶  
 單  
 方  
 國  
 號  
 白  
 蘭  
 云  
 源  
 生  
 南  
 陽  
 山  
 谷  
 及  
 田  
 野  
 中  
 頤  
 川  
 人  
 手  
 為  
 回  
 轉  
 蘭  
 女  
 病  
 名  
 茶  
 古  
 為  
 主  
 雲  
 及  
 建  
 安  
 郡  
 頤  
 故  
 郡  
 並  
 名  
 年  
 故  
 草  
 可  
 也

內又名地黃一名地黃生華州川澤及田野正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實皆陰乾弘景曰菊有兩種一種莖紫氣香

慈蔥者  
 今近道處處有之取種更得又有白蘭莖葉都相以惟脫自五月取之山煙以蘭莖少用但難多尋宜常服之蓋曰白蘭生乎華五月花紫白

五、**頌曰**處處有之以高陽菊渾者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬寔然種類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微大味甚甘者為真

其莖青而大葉細如  
小葉者名苦蕒非真也  
苦蕒莖亦有兩種白  
莖葉大如艾葉莖青  
根細花白蕊黃具黃  
莖葉小如黃綠葉也  
今服餌家多用白者  
又有一種小葉者名  
苦蕒下如小葉子謂  
之味子菊云入藥亦  
皆遠宗近世有二十  
餘種垂單葉之小而  
黃綠葉也

小而不薄九月應候而開者是也鄧州白菊莖葉者亦入藥餘皆醫經不用綱目曰花大而香者為甘菊花小而黃者為茱萸花小而黃者為野菊花

解珍曰：此之品凡百種，宿根自生，莖葉花葉品不同。宋人劉夢泉苑至能史正志，皆有菊譜，亦不能盡收也。其莖有綠、蔓紫、赤、青、綠之殊，其葉有大、小、厚、薄、尖、秃之異，其花有千瓣、單瓣、有心、無心、有子、無子、黃白、紅紫、間色、深淺、大小之別。其志有甘苦辛之辨，又有夏前、秋開、冬前之別。大抵佳

單葉者味甘入藥菊譜所載甘菊鄆州白鄆州黃者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其花細碎品不甚高甚如蜂窠者中有細子亦可

持種樹葉及花皆可煑食白薇花稍大味不苦甘其秋月采之  
之無子者謂之土狗皮收之中能反透冠鏡國山有國鹽也  
○花 藥性溫 氣味苦平無毒 別錄曰甘服之曰甘若入藥苦者不入藥果曰花  
實並同 藥性溫 氣味苦平無毒 別錄曰甘服之曰甘若入藥苦者不入藥果曰花

菊花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者為苦薺惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至

能護序言甘菊一科可食仍入藥餌其條黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥具治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品類用甘菊入藥則者前青可曰不得用野菊名蓋意者爾欲舍換文堅則然云其為生

其野菊泄人正如黃精益壽鉤吻殺人之毒之才曰求及枸杞根桑根白皮為之使  
主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服

利氣輕身利氣輕身延年延年本本療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢利氣輕身延年本療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢治頭目風熱風定倒地腦骨痠痛身上一切瘡風入消

支川口象並與竹心或下九月月自生也立可食大麥自生去骨與元王子真下定好

青禾血脈無所不通惟不秋即自黃赤即目生翳云言明春目立去翳腫素主肝平不足古  
 白藥無味辛平無毒主治癰腫瘡人血毒

不白髮。染髮令黑。和巨勝茯苓靈丸服之。去風眩。變白不老。益顏色。藥全月  
生夏茂秋花冬實。備受四氣。飽經霜露。草枯不落。花稿不零。味香甜。

苦性燥平和昔人誤其能除風熱益肝補陰蓋不知其得金水之精莖尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則

熱酒用酒法而飲之入金水酒分紅者行婦人血分宜可入藥而助之存于其入其酒可治諸可受花可銀  
實可樂愛之可抗醴之可飲自本至末固不有功宜乎前賢比之君子仲農列之上品逸士采入酒罈騷人  
贊其落英費長房言九日飲菊酒可以

辭不祥神仙傳言康風子朱儒子皆以服菊花成仙荊州記言湖廣久病風最欽菊潭水多壽菊之貴重如此是豈罕哉可伍哉鍾會菊有五美贊

云區從意華天...  
中體輕神山食上  
杯京徽記言藥菊花量最難味未陳酒王次年九月始熟用之

**附方十六**

**服食甘菊**

王正方云王子詹幾白堊年久所甘菊三月上寅日采苗名曰玉英六月

上寅日采蘼名曰容成九月上寅日采花名曰金糖十二月上寅日采根莖名曰長生四味並陰乾五日取等分以成日合搗杵為末每酒服一錢

七或以蜜丸梧子去油服七丸一日三服百日輕減一年髮白變黑服之二年齒落再生五年十歲老翁變為壯童此玉鍊云正月采第五月五日采第九月采冬月水青靈寶方引九月九日白菊乾二斤茯苓一斤並燒研為末每服二錢溫酒調下日三服或以米過松脂和丸麻子

九日采花 服食之法 大毒服一丸主頭眩久服令人好顏色不憂藏器曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁蓮花汁地血汁穉汁和丹蒸服也

乾酒天寶年方治大婦人久患頭眩眼昏不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二十七壯并服此酒及散  
 永其去毒木夏白菊飲食乾青末空頓取一方寸匕和無交酒服之因再服新口三方寸也共不飲酒者旦和羹湯汁服亦得飲八

月合花收暴乾初取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中風乾頭霜菊蕊石膏川芎各三錢為末每餐服定膏菊蕊陳艾葉作搜膝灸則鹽入目

經七日服之日三次奉酒氣相續為佳○并頭圍經一錢半茶調下○簡便方月月生白帶也○吳氏扶壽方病久入生醫藥用芍藥芩連豆豉等分為末每用一錢以乾布餅一大張裹餅計一百文生薑白菊花礬石等分為散每用二三錢入蜜少二至三

蓋同煮候消盡食柿日食三枚淺者五七日遠者半月見效○見仁齋直指方

青交本草綱目  
卷十五  
草部  
一

100

◎根葉

卷之八

亦生上黨及  
狀如蒿艾之

諸痛久服

墨痛膀胱痛

行主疏折  
變成癰腫生

對爐別錄有  
名未用

月九月采實

生使絲條直  
之處獸無虎

州所上皆不

成而餅量痛  
血從大便出

向  
日  
以  
集  
解

苗短者為良  
湯陰者謂之

月葉間出穗

[illegible]



功藥 風症 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類

青蒿

青蒿 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類

赤瘡

赤瘡 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類

酒和服

酒和服 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類

良藥

良藥 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類

白蒿

白蒿 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類 藥性 藥效 藥用 藥法 藥理 藥名 藥類

牛草 經集解 白毛面青五月采治用時珍曰陳嘉謨本草雲全以為茹父誤矣 以氣味微苦有小毒主治解風勞治身體痛與甘草同





及甚諸藥不效或成瘡○陽痿遺精上平日又作月餘以夏枯草二兩煮附子一兩為末每服一錢分三次服之  
兩甘草四錢為末每服一錢半清茶調服下咽則愈  
簡便赤白帶下夏枯草花間時常飲之○徐氏家傳方血崩不止夏枯草六兩水二鍾煎七份食溫服甚奇則煎汁搗膏即愈  
海濱生汗斑白點夏枯草煎汁日洗之○乾坤生意  
易方○孫已  
外科經驗方

劉寄奴草

釋名寄奴明烏祿林專之見重於人皆青衣於楡林中撫琴問其故答曰我主爲劉寄奴所射今合葬傳之俗曰神何

[illegible][illegible]

曲

經 即草  
經 經子月  
國經六月  
月經目錄  
經書有凌  
雷緯五之  
名  
不角  
而青軟七  
八月者花  
似海荷結  
子無用五  
月六月采  
莖葉陰

麗

春草 宋 經 釋名 仙女蒿 定參 山 經 曰 春草生 嶺 峴 山 川 谷 嶺 峴 山 左 高 密 界 河 南 淮 陽 郡 潁 川 及 散 郡 汝 南 郡 等 並 呼 為 龍 羊 草 河 北 近 郡 沒 郡 並 名 義 蘭 父 上 雲 蒙 園 山 亦 有 名 空 參 草 又 名 仙 女 蒿 今 所 有 之 甚 療 瘡 貴 人 莫 能 知 時 珍

旋

**覆花**本無釋多金沸草經本品  
**金錢花**綱目滴溜金目盜庚雅真菊  
**戴櫻**綱目別錄云此花也與者金也謂其夏開黃花盜溜金氣也爾陽雜俎云金

錢花一名銀入戶洩自集  
梁苑平時進人中國  
二月以後生苗多近水  
有花近道人家園所種  
此花非蘭也見花條薛白  
人家養者花大蕊鏤藍瑛  
痛楚然其根細白俗相傳  
露水滴下即生故易栽亦  
不然

◎花修治  
藥子蒸之從已至午乾  
周氣味鹹溫有小毒



兩後布子如種麻法初生嫩葉亦可食其葉如小葉至五月開花如大菊乾而紅色後果來花開時以水淘布袋裝去黃汁又搗以酸粟米汁

清其汁五月收米淘淨搗碎入醋拌或煮成餅食之可收其子入藥者○花氣味辛溫無毒生常山入生新血調其苦溫陰中之陽故入心

分之二○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

入酒○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

時時已生心色藏于肝屬于肝經紅花汁與之同類故能行男子血脈通女子經水多則行血少則養血來瘀通其新血其功甚大

動其日乃藥此有各醫家以紅花汁與之同類故能行男子血脈通女子經水多則行血少則養血來瘀通其新血其功甚大

症○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

分之二○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

徐咽初服二三次日四○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

三日五分○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

瘡疽不出○主治產後血暈口噤腹內惡血不盡結成胎死腹中並酒煮服亦主毒瘡多用破留少用養血生新血調其苦溫陰中之陽故入心

久服益氣力。婦人崩中漏血，金瘡血內漏，止痛生肌肉及跌傷瘀血腹痛，關節緩急，去諸溫毒，通真血脉，助氣補五勞七傷破積結，於血消腫，毒腸風痔瘻乳癰癰婦人產前後一切病胎漏子宮冷面黃虛腫縮小便止泄精尿血。**明**  
二錢水煎服即愈。愈與士子會指特行痢疾。**附方**：新二小便淋瀝生續斷搗絞汁服即愈。前  
落之子以方傳人往往有驗。小兒痢疾之效。**附方**：切處氏一棧水三錢餘，蘇子娘胎動兩三月，連實宜服此川續斷酒浸杜仲  
九梧子大每服一丸，分三次開服。無感氣欲飲心頭硬，平案者隨斷皮一棧水三錢餘，蘇子娘胎動兩三月，連實宜服此川續斷酒浸杜仲  
三十九丸，每次下。後諸疾二分，三分服。人行一里，服無所忌。此藥產後垂危，子母皆錄寸打傷損，得之立效。衛生易局方  
**笑** 條下品。別釋名：苦板時珍曰：凡物穢以名之。集解：蘇子若餽則當五月五日采，暴乾，食之。今人以渴蘆下葦也。時珍曰：蘭雅鉤芡即此  
此苦笑也。笑如擲指中空，蓋頭有雲似前初生可食，許慎說文云：江南人食之下氣。今浙東人清明節採其嫩苗食之。一年不生者亦揚江  
和米為食，其色清久留不散，迤指南云苦笑大者名苦穉菜，如地膚味，苦初生有白毛入夏抽莖有毛，開白花甚繁，結細實，其無花實者名地  
草汁之入胆火家所用。○**田氣味**：苦微寒無毒。主治：面目通身漆瘡燒灰傅之亦可生食。鐵燒灰療金瘡極驗。治丹毒明大煎湯洗痔甚驗。註  
氣解時珍。

**盧本** 上稱釋名：蘭本蘇免油麻日華時珍曰：星之西北黑處謂之滿凡物黑色謂之盧此草秋後即黑。**集解**：劉俾曰：滿蘆生喬山山谷八月  
帝所華處乃在上部及出近道市人取用之俗中故有滿蘆之稱。唐蘇頌言：屬其美。又謂之盧。此藥俗呼為鬼油麻。蘇恭曰：白根花黃生葉長  
大如筋詩有西王母七月後皆黑于聚萬之類也。常用其莖葉及子未見用根。其根藏山南謂之木藜蘆有毒非滿蘆也。今人以馬刺似若  
笑亦非也。滿蘆自別。盧本南人用治北土用根乃樹性如棠桼樹高二三尺有每段蘆山人以洗瘡疥。得昇曰：盧似角蒿今曹克州下濕處最多。

六月七日星夜自大府乘車伏回詔館蓋聞荆北風氣相執於香頭上蓋有白虎子國因今歲東州郡及秦州皆有之舊刻空鑿以海為據  
 紫雲如草葉道花若下及枕旁有白其意之根如蔓者而細又相類荊州者然色准向人呼為老蒼北三州所生花難別而紫則相類但秦州者紫  
 更作鉅如八月來物而殊類用此與秦何州州所屬漢蓋花似紫又相類近於橘入本名雖虛一名曰曬虛云與苦同一種其根生肉白皮黑酸熟則令  
 莫如土不麻六七月按時中筆談云今方家所用滿虛乃真藥也無病一各酒虛合甘苦煎飲如牛骨牌頭者是也藥材用現今中外所謂滿虛者  
 時開滿乃滿虛者七秋深結果即添采  
 治虛感毒瘡癰疽痔濕痺下乳計久服輕身益氣且自聰明不老延年補止遺溺熱氣瘡疥如腐豆可作浴湯明通小腸池指尿血腸風赤  
 主

眼小兒壯熱損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補血長肉通經脈

設疊於東垣以爲手足陽明藥而方古也遺症蓋耳則以溫蓋爲有錢也順氣常傷寒論治瘧症及新六版中瘧疾一症之方外盡細要小

乃無輕塞也又治經絡凝滯乳內脹痛邪毒成癰服之自然肉消滿處一兩半蛇透十條炙其瓜  
○聖惠方治諸淋疾或膏入後米丸如梧子大每溫水下三十丸

○聖濟總錄產婦帶下

仁學下下葉十餘枚存性爲細末每服二錢用溫酒調下良久再以煎藥湯投之調之以通氣服之和平方月食肉爲滿處炒手兩地龍  
去上炒半兩爲末生薑二兩取汁入蜜三兩同煮三五沸一服發背疽二日但有熱發宜服之虛滿過毒下膿乃更宜投之  
去上炒半兩爲末生薑二兩取汁入蜜三兩同煮三五沸一服發背疽二日但有熱發宜服之虛滿過毒下膿乃更宜投之

炒一兩五分  
入於酒中  
以五合之  
每服二錢  
細末每服  
下三錢用  
水送下  
忌食煎炒  
和鹽之○  
聖濟錄

廉本經上品  
藥名爲滿盛別水米錄雄上同伏虎上天薺風氣此草附豆有皮如晉羽瘦瘠國故有飛廉飛龍飛輕之名也其狀身約文雀頭蛇生有肉能攷集解曰乘

家散其地。其地可長生。又入神月。月合。陰陽。則其地。陰陽。有別。名曰。耳。來。曰。北。有。一種。生。下。地。深。中。是。高。氏。所。說。者。一。種。生。山。上。者。有。一。種。相。似。

以馬訖晉笑者爲滿虛並非是也保昇葉如苦艾以致秋花紫子毛白所在平澤宮有五月六月采日乾乾日凡後勿用赤脂蔓與康

[illegible]

修治凡用紙一張去粗皮細切  
苦酒一盞煮一日乾細切用  
**氣味**苦寒有毒  
開曰苦鹹有毒  
得烏頭良忌麻黃  
**主治**骨節熱腫重酸疼久服令人身輕  
本經頭眩項重皮間邪風如蜂蟻

**針刺魚子**細起越瘡癰痔濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服氣明目不老可烹可乾用燒主治血瘕瘰癧蝕殺蟲小兒疳積散水漿服大效

新法頭拉道珍<sup>方</sup>則行力數倍于常本經別錄所列亦是至良之藥而後人不知用何哉<sup>附</sup>一丹專治口  
則非徒治下部毒如馬尾大損纏出無錢上苦痛成其痛則忍之若不痛

林下品釋名曰今華下竹可以簞笥故謂之筵凡席縣之細者爲筵粗者爲簞釋名曰今華下竹可以簞笥故謂之筵凡席縣之細者爲筵粗者爲簞

而青背白有短毛夏秋離着細莖青花其根黃白而輕虛二月八月采按陸機草木疏云等一科數十莖根在土中至春自生不須栽種揚州三劉諸國種之歲廣州便制取其皮以竹刮其表厚處自脫得葉如筋者煮之國語布令江浙國中高復如此宋張白芨如尊蔴花如白揭而長成

根氣味甘寒無毒味甘平治要胎貼氣丹

[illegible]

尚蘇子一升為末以酒漬此片熱水服之  
木槿乃為末每服一錢陳氏飲下日三服  
暴湯下一元以乾薑內蜜中蒸熟  
為末蜜一溫水下○聖濟總錄

主月 別錄名 時珍曰其莖葉  
中品 藥名 皆錄其根名 集解 別錄曰大青三四月采莖陰乾  
處處有之高二三尺葉圓莖三四月滿青有刺對生八月開小花紅色或紫結實大如鰕九月色赤

○莖葉氣味苦大寒無毒 主時氣頭痛大熱口瘡除時行熱毒

青湯又治傷寒頭身痛腰脊痛煩渴心煩口乾渴飲水不解者以青湯一斗分三服每服水一斗半煎一分溫服○高陽治眾入書月皮黑青乃血氣衰風  
 近來治法入書臨藥發赤煩渴有痛內亦用大青七枚時飲云海味煎成解心胃熱毒不持治傷寒方新曉風痺  
 大有益於計取之取兒口瘡大青一升二服以盧為足○千金煮一升熱病下痢因渴者大青湯煮三升分三服不赤石脂三兩○時後熱毒發  
 效○衛生易方方○兒口瘡大青一升二服以盧為足○千金煮一升熱病下痢因渴者大青湯煮三升分三服不赤石脂三兩○時後熱毒發  
 斑赤色煩渴大有四物湯用大青一兩兩服甘草各二錢半錢二分三服每服水一斗半煎一分溫服○高陽治眾入書月皮黑青乃血氣衰風  
 斑聲危者湯用大青七錢半絨  
 實寒之危者湯用大青七錢半絨  
 口中以酒送下○保幼大青方

**胡蘆巴**  
小青一握煨研入香白芷半兩酒調服手按處使黃水出為中藥發汗沙淋并去濕去風散寒  
**胡蘆巴**  
宋臣方用今廣州或云種出海南諸番蓋其國產服于吐帕家將雄雞骨燉外立生熱不及番中者其真好公醫治元

賦庶於為藥而唐已前方治... 不其用者草不著蓋是近出... 賦庶於為藥而唐已前方治... 不其用者草不著蓋是近出...

得樓亭桃仁治腰脫氣甚效... 九子酒則開空服日各一二... 妙為末酒糊丸梧子大每服... 有人病目不暗思食苦豆即...

附方新小腸氣痛... 鹽酒一兩為末酒糊丸梧子... 也者人病目不暗思食苦豆... 氣頭痛半為末姜湯或溫酒...

○楊氏家藏方... 氣頭痛半為末姜湯或溫酒... 也者人病目不暗思食苦豆... 也者人病目不暗思食苦豆...

蠱寶中品... 鄭玄注為蠱馬也通俗云一... 職呼為蠱馬也通俗云一名... 生之江東頗多種子陰處呼...

○寶修治... 身軀止心煩滿利大小便長... 通小腸消酒毒治黃病殺草... 寒亦不能食及腹內一切諸...

水賜風下血... 冷酒風下血有元瘡瘡破者... 水賜風下血有元瘡瘡破者... 水賜風下血有元瘡瘡破者...

喉痺多服令人瘧泄... 為馬蘭更無... 用根汁三合蜜一合慢火熬... 度一方單汁散之口噤者灌...

一切瘧疽... 瘧疽瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘧疽瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘧疽瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧... 瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧...

