

濟陰綱目

上海錦章書局
出版

濟陰綱目卷之十

關中 武之望叔卿父輯著 武林 徐弘衍瑤璋父訂正

丙陵 汪淇憺漪子詳釋 天都 查 望于周父參閱

臨產

○論臨產調理法

原旨度國蔡不裁錄
亦其由法也

惟生藥切不可早若
兒未轉身宜以補血
為主而寬氣佐之
中指屬心胞絡也

固血之說宜玩

八珍益母配法服法
俱佳

固血如開水致舟取
穩當

大全云。凡妊娠至臨月。當安神定慮。時常步履。不可多睡。飽食。過飲酒醴雜藥。宜先貼產圖。依位安鋪床帳。預備老練穩婆。備辦湯藥器物。欲產時。不可多人喧鬧。惶惶。但用老婦二人扶行。及凭物站立。若見漿水。腰腹痛甚。是胎離其經。令產母仰卧。令兒轉身。若兒頭向產門。方可用藥催生坐草。若心煩。用水調服白蜜一匙。覺饑。喫糜粥。止許。勿令飢渴。恐其力乏。不可強服催藥。早於坐草。慎之。

薛氏曰。欲產之時。覺腹內轉動。即當正身仰卧。待兒轉身。向下時。作痛。試捏產母手中指中節。或本節挑動。方臨臨盆。即產矣。若初覺不仰卧。以待轉胞。或未產而水頻下。此胞衣已破。血水先乾。必有逆生難產之患。若胎衣破而不得分娩者。保生無憂散。以固其血。自然生息。如血已耗損。用八珍湯料一劑。益母草半劑。水數十碗煎熟。不時飲之。亦有得生者。凡孕婦只腹痛。未產也。若連腰痛甚者。將產也。蓋腎候於腰。胞繫於腎故也。凡孕家宜預請有仁心知事穩婆。當以恩結其心。先與說知。倘有生息不順。只說未產。或遇雙胎。只說胎衣未下。恐驚則氣散。愈難生息。余家親驗之。大抵難產多患於鬱悶。安佚富貴之家。治法雖云胎前清氣。胎後補血。不可專執。若脾胃不實。氣血不充。宜預調理。不然。臨產必有患難。

○論臨產催生法

大全云。大凡生產。自有時候。未見時候。切不可強服催生滑胎等藥。或勢不得已。則服之。又云。切不可坐早。及令穩婆亂動手。凡催生藥。必候腰痛甚。胎轉向下。漿水破方可服。大法。滑以流通。滯若以驅逐。閉塞者。以開竅逐血。氣滯者。行氣。胞漿先破。疾困者。固血。

丹溪云。催生只用佛手散。最穩當。又勸提。

產調理法 臨產催生法 難產由於安佚氣滯

血暈血滿以水解之
在春月尤宜餘月亦
無害惟少與之

止紫蘇飲最穩當可
法

○論難產由於安佚氣滯

大全云。婦人以血為主。惟氣順則血和。胎安則產順。今富貴之家。過於安逸。以致氣滯。而胎不轉。或為交合。使精血聚於胞中。皆致產難。若腹或痛。或止。名曰弄胎。穩婆不曉。入手試水。致胞破裂。乾兒難轉身。亦難生矣。凡產直候痛極。兒逼產門。方可坐草。時當盛暑。倘或血暈。當飲清水解之。冬末春初。產室用火和燠。下部衣服尤當溫厚。免致胎寒血結。若臨月洗頭濯足。亦致產難。

○論難產由於氣虛不運

丹溪曰。世之難產者。往往見於鬱悶安佚之人。富貴奉養之家。若貧賤辛苦者。無有也。古方書止有瘦胎飲一論。而其書為湖陽公主作也。實非極至之言。何也。見有用此方者。其難自若。予表妹苦於難產。後遇胎孕。則觸而去之。予甚憫焉。視其形肥。勤於針指。回思旬日。忽有悟曰。此正與湖陽公主相反。彼奉養之人。其氣必實。耗其氣使平和。故易產。今形肥。知其氣虛。久坐知其不運。必氣愈弱。兒在胞胎。用母氣不能自運耳。當補其母之氣。則兒健易產矣。令其有孕。至六七月來告。遂以大全方紫蘇飲加補氣藥。與數十貼。因得兒而甚快。後遂以此方。隨母形色性氣。參時令。加減與之。無不應者。因名其方曰達生散。

○論難產由於血滯血乾

郭稽中曰。產難者。因兒轉身。將兒枕血塊。破碎與胞中。敗血壅滯。兒身不能便利。是以難產。急服勝金散。消其血。使兒自易生。陳無擇云。多因兒未轉順。坐草太早。或努力太過。以致胞衣破。而血水乾。產路澀。而兒難下。宜先服催生如神散。以固其血。設或逆生橫產。當用前法針刺之。

大全云。治胞漿先破。惡水來多。胎乾不得下。須先與四物湯。補養氣血。次煎濃葱湯。放冷。令穩婆洗產戶。須是軟曲洗。令氣上下通暢。更用酥油滑石末塗產口。裏次服神妙乳硃丹。或葵子加聖散。

○楊子建十產論

一曰。正產者。婦人懷胎十月。滿足。忽腰腹作陣疼痛。相似胎氣頓墮。至於臍腹痛極。乃至腰間重痛。設道挺出。繼之漿破血出。兒自遂生。

舉則則記不能轉生
於不可

此學養子法也可於
平日今兒女子熟聞

補正氣確是良工有
用人必五錢催生最
妙

如見此症可用凉水
水噴面醒之

母氣弱而倒產者當
服補藥若用力早者
又當別論

二曰傷產者蓋因人之生陰注陽定各有時日不可改易今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產却仍無事是名試月非正產也但一切產母未有正產之候即不可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却教產母虛亂用力兒身繞方轉動却被產母用力一遍使兒錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母用力未當之所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼產戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗助長無益而有害矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀道挺進已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產之正氣令兒速得下生四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐卧寒處當滿房著人常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭疼面赤昏昏如醉乃至不知人事

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一遍遂至身橫不能生下當令產母安然仰卧後令看生之人先推兒手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指舉其耳而正之須是產母仰卧然後推兒直上徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生

七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉使直下先露其足當令產母仰卧令看生之人推其足入去不可令產母用力分毫力亦不得驚恐使兒自順

八曰偏產者兒身未正產母用力一遍致令兒頭偏在左腿或偏右腿故頭雖露偏在一畔不能生下在當令產母仰卧次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏在穀道只露其額當令看生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外輕輕以推兒頭正便令產母用力送兒生也九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身回轉肚帶舉其肩以此露正頂而不能生當令產母仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下

收腸法妙絕

不孔不產也良藥是連藥其根惡毒者考本草並無生語然其毒惡亦或感其毒氣而胎下也
粥可飲者以其煩也又涼則性降
本草楓葉亦能催生今村婦亦每用之臨月洗浴和下和胃氣不足者亦可服用耳
法術神奇罕見聞見

茶或即車前或用草亦可性最溫和故君之

便產治驗法奇而正妙妙

十曰坐產者兒將欲生其母疲倦久坐椅褥抵其生路急於高處繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也

十一曰盤腸生者臨產母腸先出然後兒生趙都運恭人每產則大腸先出然後產子產後其腸不收甚以為苦醫不能療偶在建昌得坐婆一法而收之其法以醋半盞新汲水七分調停嘆產母面每嘆一縮三嘆盡收此良法也

○產難治驗

淳子意治留州王美人懷子而不乳召子意往飲以養鵲藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脈而脈躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血血如豆者三四枚

滑伯仁治一婦難產七日而不乳且食甚少伯仁視之以涼粥一盃搗楓葉煎湯調啖之旋乳或詰其理滑曰此婦食甚少未有無穀氣而生者夫楓葉先生先落後生後落故以作湯飲也

龐安常治一婦產七日而子不下百治不効龐視之令其家人以湯溫其腰腹具為上下拊摩孕者覺腸胃微痛呻吟間生一兒其家驚喜而不知所以龐曰兒已出胞但一手誤執母腸不能脫非符藥所能為吾隔腹捫兒手所在鍼其虎口痛即縮手所以遽生無他術也取兒視之右手虎口鍼痕存焉

一婦累日產不下服催生藥不効龐曰此必坐草太早心下懷懼氣結而不行非不順也素問曰恐則氣下蓋恐則怯精神怯則上焦閉閉則氣逆逆則下焦脹氣乃不行矣以紫蘇飲一服便產及治婦人子縣證紫蘇飲見胎前服法

吳菱山治一婦產難三日不下服破血行經之藥俱罔効吳因製一方以車前子為君冬葵子為臣白芷枳殼為佐使煎服遂產東醫異之吳曰本草謂催生以此為君毛詩採芣苢以防產難是也

劉復真遇府判女產不利已飲劉取紅花濃煎扶女子凳上以綿帛蘸湯會之連以澆帛上以器盛水又煖又淋久而甦醒遂生男子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫即產見亦神矣

一醫宿客店值店婦產數日不下下體已冷無藥可醫以椒橙茱萸等煎湯可下手則和臍腹產門處皆淋洗之氣溫血行遂產

○論交骨不開

其有用攻下之藥而無益者以產母之大氣竭而神大健也宜補之
惡意虛劇者朴硝同補劑下之何如

燒飯用何葉煎湯更妙

薛氏曰交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調攝以致血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芎歸湯補中益氣湯產門不開氣血虛也用十全大補湯地官李孟卿娶三十五歲女為繼室姪娘慮其產難索加味芎歸湯四帖備用至期果產門不開止服一帖頓然分娩

上舍費懷德之室產門不開兩日未生服前藥一劑即時而產上舍傳此方用之者無有不驗

一婦人分娩最易至四十姪娘下血甚多產門不開與前湯一劑又以無憂散勸許煎熟時時飲之以助其血而產

○論胎死腹中

準繩云產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難胞漿已破無血養胎枯涸而死故也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之

大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤之危急者毒藥下之

一穩婆之女勤苦負重姪娘腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許服之墮下利水而愈

一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以四物薑桂調補而愈

○臨產脈法 附驗看生死法

脈經云懷妊六七月脈實太牢強弦緊者生沉細者死○脈勾細易產大浮緩氣散難產

脈訣云欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分誕來朝日午定知生○身重體熱寒又煩舌下之脈黑

復青反舌上冷下當死腹中須遣母歸冥面亦古青細尋看母活子死定難應唇口俱青沫又出母子俱死總教掩

面青古亦沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳

○臨水東胎方

東胎丸 胎瘦易生服至產則已

白朮 枳殼各等分 右為末燒飯丸如桐子大八月一日食前服三五十丸溫水下

齊 各等分 右為末燒飯丸如桐子大八月一日食前服三五十丸溫水下
臨產脈法 臨水東胎方

加法俱妙甚

即東胎丸望法也若氣虛不足者當再酌之

此方為安送氣旺者設

兩方互服固妙然與氣虛者非宜

氣虛者宜之

產時太峻恐非胎產所宜

惟血氣弱者故臨月可服

達生散 孕至八九個月內服十數帖甚好易產

大腹皮錢三 人參 陳皮 紫蘇葉各五分 歸身尾 白朮各一錢 白芍藥錢一 甘草錢二

右切作一服入青葱五莖當楊腦七個即黃楊樹葉梢也食水煎服或加枳殼砂仁○春加川芎○夏加黃芩

○秋加澤瀉○冬加砂仁○氣虛倍參朮○氣實加香附陳皮○血虛加當歸地黃○形實倍紫蘇○性急多怒

加黃連柴胡○熱甚加黃芩○濕痰加滑石半夏○食積加山查○食後易飽倍黃楊腦○腹痛加木香官桂

又方 第九個月服 酒苓酒炒一兩虛弱人不宜涼藥者減半 白朮一兩 枳殼錢五 滑石各七錢半臨月十日前行小便多者減此一味

右為末粥九桐子大每服五十丸空心熱湯下○氣實人宜服多則恐損元氣

滑胎枳殼散 妊孕七八個月常宜服滑胎易產湖陽公主每產累日不下南方道人進此方

商州枳殼錢二 粉甘草錢一 右為細末每服二錢百沸湯點服日三服○溫隱居加當歸廣木香各等分

○許學士云枳殼性苦寒若單服之恐有胎寒胎痛之疾以地黃當歸蜜丸佐之可也名內補丸蓋枳殼散破血

有餘而內補丸補血不足也

內補丸 治妊娠衝任脈虛補血安胎與枳殼散間服

熟地黃二兩 當歸一兩 右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸溫酒或滾湯下

張氏方 治妊娠胎肥墮隘動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治腸中諸疾下氣寬腸

枳殼五兩 甘草一兩 香附子三兩 右為末薑湯點服如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者用葱白三寸

同煎服○婦人脾寒血氣成塊作刺熱酒調服○大小便不通用牽牛湯

保生無憂散 治妊娠身居安逸口厭甘肥憂樂不當食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢或瘦人血少胎弱臨產難

產八月服之則易生也

當歸 川芎 白芍藥 枳殼錢五 木香 甘草錢一 乳香另研 血餘燒存性另研各五分 右作一服水煎入乳

香血餘和勻不拘時服

神寢丸 瘦胎滑利易產臨八月服之神効

通明乳香另研 枳殼一錢 右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心酒下。

○難產催生方

三合濟生湯 以枳殼芎歸達生三方抽其精粹而成合此湯治臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

當歸三錢 川芎 枳殼二錢 香附子炒 大腹皮一錢 蘇葉分 粉草分 右用水煎待腰腹痛

甚服之即產○一方加白芷一錢

佛手散即湯 治妊娠因事仆跌子死腹中惡路妄行疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若子死腹中立便逐下若

腹痛隨止子母俱安又治臨產艱難胞衣不下及產後血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中血刺病痛

血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產後危急狼狽垂危等症

並皆治之○丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

當歸酒洗去 川芎各等分 右細剉分作四服每服先用水一盞煎將乾投酒一盞半煎五七沸溫服如

口噤搗開灌之如人行五里許再灌一服盡此四服便立產神驗○如產難倒橫子死腹中先用黑豆炒熟白

水童便各一盞用藥四錢煎服○如胞產五七日不下垂死及矮石女子交骨不開者加龜板并生育過婦人頭

髮燒灰為末每三錢酒調服

來甦散 治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭暈目眩口噤面青髮直不省人事

木香 神麴 陳皮白 麥草炒 黃耆 阿膠珠 白芍藥 芒根 甘草各三 糯米一合 生薑切碎

錢一 右剉細水煎把口灌之連進為妙

黑神散一名催生 治橫生逆產其功甚大並治胎前產後虛損月水不止崩漏等證

百草霜 白芷各等分 石為末每服二錢以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒煎進二服熱血得黑

則止此藥大能固血又免血涸甚妙○一方加白滑石煎芎歸湯調下

催生立應散 治難產及橫生逆產

車前子 當歸各一 冬葵子 白芷各三 牛膝 大腹皮 枳殼 川芎各二 白芍藥一錢 右剉水煎

熱入酒少許服立產。

榆白皮散 治妊娠滑胎易生。

榆白皮 甘草各二 葵子兩 右為末每服五錢水煎服。○一方單用榆白皮焙乾為末臨月日三服方寸七。

今產極易。

如聖散 專治孕婦難產。

紫蘇葉 當歸各等 右咬咀每服三五錢用長流水煎服。

催生散 治難產并胞衣不下。

白芷 滑石 伏龍肝 百草霜各一 甘草分五 右為細末用芎歸湯入酒童便各少許調服二次立効。

催生飲 治臨產生育艱難。

當歸 川芎 大腹皮 枳殼各等 白芷各等 右剉水煎溫服。一方無大腹皮有益母草火麻仁。

催生湯 候產母腹痛腰痛兒胞漿水下方服。

桃仁炒去 赤芍藥 牡丹皮 官桂 白茯苓去皮各 右剉一劑水煎熱服。

活水無憂散 專治十月已滿多因恚情及多喫熱毒之物瘀血相搏臨產橫逆之厄愴忙不謹觸死胎兒在腹服此一二貼加烏金丸二顆効如神。

益母草 急性子 當歸各四 陳枳殼兩 生地黃 蘇葉 赤芍藥各二 肉桂 川芎 陳艾各一 錢

甘草分 活鯉魚個 右分作二服每服用水三碗先將魚入水坐火上略溫急取魚出魚死則難取効矣後

下藥煎至二碗臨服之時加入好醋一茶匙每一碗和調烏金丸一顆如死胎不下急取無根水再煎藥相連服

二次

烏金丸

七聖散 一名七 臨產腰痛方可服。

當歸 玄胡索 香白芷 焙 白礬 薑黃 沒藥 桂心各等 右為細末每服三錢燒梨頭令紅淬酒調

下臨 時一二服立產。

白礬固止亦因血之意耶

此以破血為主血實氣盛者宜之若今人不辨氣血虛是一概混用可笑 烏金丸失查附

不益氣力治病而
專用大劑肉桂推生
此急因急用法也
妙妙

即非橫生亦可服

此方簡當小便取其
破血又有濁陰下降
之理兩摩法更妙

免腦丸其來尚矣然
男左女右手握藥出
臂未曾驗宜脫破後
藥至也不然脫未破
時藥入腸胃何以能
此再詢之高明者

一方 治難產累日氣力之盡不得生此是宿有病者且此方

阿膠二兩 赤小豆二升 右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烺每服五合不覺更服不過三服即出

勝金散 產難蓋因兜枕破與破血裏其子故難產但服此藥遂其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香末一錢 鹽鼓一兩以青布裏了燒紅急研細 右每服一錢用秤錘燒赤淬酒下

一方 治橫生先露手足

阿膠炒 滑石各一兩 冬葵子一合 右每服四錢水煎連進二三服○一方有酥油一兩

油蜜煎 治難產泥漿胎乾胎不得下

用香油蜂蜜小便各一碗和勻銅鍋內慢火煎一二錢涼去滓調白滑石末一兩或益草末攪勻頓服外以油蜂

蜜於母腹臍上下摩之或油煎一盞服之亦可○一方只用油蜜小便能下難產

免腦丸一名推生丹 治難產及橫生逆產

免腦臘月者去皮 明乳香二錢半 母丁香為末 麝香一錢另 右研勻用免腦髓為丸如雞頭大陰乾

油紙封裏每一丸破水後溫水下即產隨男左女右手中握藥出

柞木引子 治產難或橫或倒治爛腹中腹悶服之

生柞木一大握長一尺 甘草大者五寸 石用新汲水三升半入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至一升

半候產婦腰重痛欲坐草時溫飲一小盞便覺心下開豁如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

催生如聖散 黃蜀葵子不拘多少焙乾為末熱酒調下二錢神効如無子花亦可○若胎漏血乾難產痛極者并

進三服良久腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可服之○如打撲元胎紅花酒下

歌曰黃蜀子炒七十粒細研酒調濟君急若還臨危產難時免得全家俱哭泣

催生如意散 治橫生倒產

人參 乳香各一錢 辰砂二錢一分 右為末臨產時急用雞子清一個調藥末再用薑汁調開冷服即時順

產子母無恙

產子母無恙

五

此藥也末敢輕試

催生鉛丹 治橫逆難產 用黑鉛一錢將小銀子火土鎔化投入水銀一錢急攪結成砂子傾出以熟絹衣角扭

成丸子如菉豆大臨產時麝香水吞下二丸立下

三退散 治橫逆難產子死腹中 蛇退一條 蟬退十四枚 人退即男子頭髮如蛋大一團 右俱燒灰為末分三服酒調下

滑胎散 催生神効

益元散 蛇退一條燒存性 蟬退一條燒灰 穿山甲一斤燒存性 男子亂髮一團香油熬化 右為細末用蜜水一碗和

藥煎二沸入髮灰攪勻冷定服之立下

一方 治產不順 蛇退一條 蟬退一條 右入新瓦瓶內鹽泥固濟火燒存性為末煎榆白皮湯調下一錢三服

覺痛便生 一方用蛇退一條全者燒灰入麝香一厘酒調二錢面東服如橫生逆產以餘渣塗所出手足即順

也

神効乳砂丹 治難產

明乳香為末以猪心血為丸如桐子大珠砂為衣晒乾每服一丸嚼碎冷酒下良久未生再服或以蓮葉蒂七

個水煎化服二丸良久未生再服如胞漿先乾胎不得下急服大料四物湯滋其血氣并濃煎葱湯煮洗產戶

更用油燭塗產戶內却服前藥如胎死不下用朴硝五錢滾湯調下或子育散一服送下如胞衣未下酒水服

一丸即下產門不開用加味芫歸湯和服二丸此藥實驗如神合時須五月五日午時極妙或七月七日三

月三月及日初上辰日亦可

一方乳香珠砂等分為末麝香酒調下又方通明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用冷水醋少許調服扶立

令兩手拿石燕子二個急置靈藥堅遍行數步坐草便生更無痛楚此法似迂用者云甚驗

一方乳香研細五月五日滴水丸如雞頭大每服一粒無灰酒下名開骨膏一方用大珠砂於端午晒起以

百日為度研為細末取臘月兔體髓丸如菉豆大欲產時粥飲下一丸良久便生其藥男左女右手中握出晒珠

砂不得著雨

如神散 催生累切實驗於理固難通於事實殊効

此急症亦不得已也

即免胎丸意

奇方益以鎮墜為主
能產墜安信非虛語

用路上草鞋一雙取鼻梁上繩洗淨燒灰童便和酒調下三錢一名千里馬此藥甚奇

小品方 瘡橫生倒產手足先出
用鹽鉞刺兒手足入二分許兒得痛正轉即縮自當回順而生○一方用鹽塗兒足底又可急加於手并以鹽摩
產婦腹上即產

黃金散 治生產一二日難分娩者服之如神

真金箔大者五片小者七片以小磁鍾將水少許去紙入金在內用指研勻後再添水至十鍾一面先令一人扶
產婦虛坐又令一婦人用兩手大指按定產母兩肩肩井穴前藥溫服其胎立下○此催生聖藥如產水未足
又安能之

勝金丹 治難產神効 敗鬼毫筆一枝燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若產母虛弱及素有冷疾者恐頭
藕冷動氣即於銀器重湯燒過後服

催生萬應不傳遇仙丹

單麻子十四粒 硃砂 雄黃各一錢半 蛇退一條 燒 右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋洗

臍下安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤帛裹之須臾生下急取去藥一丸可用三次

知聖膏 治產難并治胞衣不下兼治死胎

單麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞即下連洗去不則腸出却用此膏塗頂上腸自縮入○一方單麻子百粒
雄黃一錢細研如上法塗之○一方單麻子三粒巴豆四粒各去殼入麝香研細貼在臍中歌曰三麻四豆脫衣

棠研碎將來入麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分張

立聖丹 治產難橫逆惡候死胎不下並治神驗

寒石四兩內二兩生 硃砂一兩 右同研如深桃花色每用三分并華水調如蒲糊以紙花剪如杏葉大攤上

貼臍心候乾再易不過三次便產

治難產雜方 益母草搗取汁七合煎半頓服立下無新者以舊收者一大把水七合煎服○一方今產婦兩手各

益母不惟催生抑且
心痛有驗

此法用之不違何故

先妙在椒洗法

巴豆惡傷睛

以寒救之亦是一法
然須因人而施毋妄
試也

齊
益母不惟催生抑且
心痛有驗
此法用之不違何故
先妙在椒洗法
巴豆惡傷睛
以寒救之亦是一法
然須因人而施毋妄
試也

凡產婦藥方不同胎氣各異諸方種種俱云神効然用者必計症體選之方驗不然恐服之無益

握石燕一枚須臾即下。○一方雲母粉半兩溫酒調服入口即產萬不失一。○一方桂心為末童便酒調服一錢

神効名救苦散。○一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下見頭帶生而下。○一方臘月兔頭煨為末葱白煎湯調

服二錢立生。○一方燒銅錢通紅放酒中飲之。○一方兒子二枚研末酒調下。○一方用魚膠一尺新瓦上煨灰

陳醋調服立下。○一方好墨新汲水磨濃服之墨水同光出。○一方取弓弩弦以縛服及燒弩牙令赤內酒中飽

之皆取法於快速之義也。○一方神麴末水服方寸七。○一方赤小豆為末東流水服方寸七。○一方當歸末酒

調一錢服不產再服。○一方車軸脂吞豆大許即產。○一方紅莧菜與馬齒莧同煮熟臨產食之即下。○一方車

前子為末酒服。○一方取丈夫視帶五寸燒存性酒調服下。○一方取槐樹東枝令產婦把之易產。○一方用紫

蘇煎湯調益元散服之即產。○一方用槐子十四粒即下。○一方取槐子上百枚蒲黃一合納酒中溫服須臾不

生再服之不服亦得。○一方生薑汁生地黃汁各半斤合煎熟頓服之

○治交骨不開

龜殼散 治交骨不開不能生育

當歸 川芎各一兩 敗龜板一個 婦人頭髮生髮過者一握燒存性 石為散每服五錢水煎服約人行五里即生如

胞死不下灼龜板亦可

○治胎死腹中

烏金散 治難產或熱病胎死腹中或因顛仆或從高墜下或產室驚搖或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到

經行先下惡露已盡胎不下子冷身冷不能自出但視產母面赤舌青是其候也面青舌赤母死子活唇青吐沫

子母俱斃又有雙胎或一死一活其候難知臨時觀變可也

熱地黃洗切細 真蒲黃 大當歸 交趾桂 楊芍藥 軍薑去皮 粉草各一兩 小黑豆四兩 百草霜錢五

右為末每用二錢米醋半合許沸湯六七分浸起溫服疑貳之際且進佛手散酒水合煎二三服探之若未死

子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後再進香桂散須臾如手推下常用催生更加滑石末半

兩葵子五十 槌碎黃梓葉七八片葱白二寸順流水煎湯調下蓋滑石能利小便梓葉行氣逐血葱白內通

陽氣氣盛血行即產矣

香桂散 下死胎。

服法妙

麝香五分另研一方 官桂三錢為末一分 右和勻作一服溫量便酒或葱湯調服須臾如手推下此方比
之用水銀等不損血氣。一方加白芷三錢。一方單用桂末一錢童便調下。名救苦散

平胃散 治死胎不下 指甲青舌青脹悶口中作臭

一平胃散也而所以
下死胎可見用法之
下窮如此蓋胃行則
元胎自行更投朴硝
則無不下矣妙妙

蒼朮米泔 陳皮 厚朴薑汁炒 甘草炙 右剉一劑酒水各一盞煎至一盞投朴硝半兩再煎三五沸
溫服其胎化血水下。或只用朴硝半兩研細以童便調溫服亦妙或用二錢以順流水調下

一方 治妊娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮各三錢 當歸炒 滑石七錢 瞿麥 葵子炒 茯苓 粉草 黃芩各半

右為麤末每服四錢水煎服

千金神造湯 治動胎及產難。子死腹中並妊娠兩兒一死一生服之令死者出生者安神驗。

蟹爪升 甘草兩一 阿膠兩三 右三味以東流水一斗先煮蟹爪甘草得三升去滓次內膠令烊頓服之不能

分再服若人因挖口內藥藥入即活煎藥作東向竈用薑新煮之

一方 治胎死腹中乾燥着背 葵子升 阿膠兩二 右以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

一方 治子死腹中或半生不下或半着脊骨在草不產血氣上澁母心而無顏色氣欲絕及治胞水早乾胎並不

下 猪脂初 蜜升一 淳酒升二 右三味共煎至二升半分溫二服不能服者隨多少緩緩服之

一方 治胎死腹中或半產不下

官桂錢五 牡丹皮 川芎 葵子各一錢 右為細末每服三錢葱白湯下

半夏湯 治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胞乾而不能產者

半夏錢一兩 桂錢半 大黃錢五 桃仁三十個去 右為麤末先服四物湯一二服次用此藥三錢生薑

三片水煎服如未効次服下胎丸

妙在先服四物湯

東流取其順下先煮
取其力全
煮薑新取輕虛之意
要知葵子多用方妙

治惟娠疾多難產者妙

危症極矣必黑鉛水銀方妙然症少緩者切不可用之

紫金藤即紫木香

大花粉亦能墮胎

亦可治鬼胎

以下二十餘方隨人取便用之

下胎丸 治產難脫衣不出橫倒者或兒死腹中母氣欲絕者

半夏製 白薇各半 右為細末滴水丸如桐子大食後用半夏湯下二三丸續服至五十丸一方三十九丸下加至五

凡十

一方 治生產不順胎死腹中胎衣不下臨產危急

蛇退一條全者香 麝香少 右為末童便酒各半盞調下一服即生効

霹靂奪命丹 治臨產暴然氣癢目翻口噤面黑唇青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活

用蛇退一條瓦 蟾退燒二錢 男子髮燒灰 乳香分五 黑鉛半錢 水銀七分半依前法作 千里馬即路上去即驚草鞋一隻取鞋

鼻洗淨燒 灰一錢 右為末以猪猪心血丸如桐子大金銀箔七片為衣每服二丸用急流水灌下或入伏龍肝調下上

着兒頭戴出為妙

宣明礪砂散 治胎死腹中不下

礪砂細燒 當歸各一兩 右研極細末分作二服溫酒調下如重車行五里不下再服

牛膝丸 下死胎

杜牛膝二兩 紫金藤 蜀葵根各七錢 當歸四錢 肉桂二錢 麝香分五 右為末米糊為丸如桐子大礪砂為衣

每服五十丸乳香湯交下

一方 治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥六兩 通草 桂心各三兩 牛膝 榆白皮各四兩 右細切用水丸升煮取三升去渣分三服頓飲即下

○一方 無榆皮有天花粉四兩大能墮胎

一字神散 治子死腹中脫衣不下脫破不生累有神驗

鬼曰不拘多少黃色者去毛研為末以手指擦之如粉極細為度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞煎至八分通口服立生如神

治死胎難方 用辰砂一兩以水煮數沸為末取酒服之立出○一方真珠一兩為末酒調服盡立出○一方落子

為末酒服方寸七。若口噤不開。格口灌之。藥下即活。○一方鹿角屑一兩。葱五莖。豆豉半合。水煎服。○一方鹿骨燒灰存性。為末。每服三錢。溫酒調下。○一方水銀半兩。桂末三錢。溫酒調下。粥飲亦可。○一方錫粉水銀各一錢。煮肉丸如大豆。大水吞下。立出。○一方用雞子黃一個。生薑自然汁一合。調勻頓服。分晚後用。雲臺子粥補之。○一方瞿麥二兩。剉碎。水八盞。服未出。再服。○一方龍心黃土為末。酒調服二錢。○一方鍋底墨。酒調服。○一方麥赤小豆同煮。濃汁服立出。○一方紅花酒煮汁。服二三。○一方以利斧煨赤。置酒中候溫飲之。其子自下。○一方用雌雞糞二十一枚。水二升五合。下米作粥食。即下。○一方用三家雞卵各一枚。三家鹽各一撮。三家水各一升。合煮。令產婦東面飲之。立出。○一方取犬尿一升。煮令沸飲之。○一方以黃牯牛糞。塗母腹上立出。○一方以牛糞炒令大熱。入醋半盞。以青布包裹於母臍上下熨之。立下。○一方用烏雞一隻。去毛細切。水煎三二升。候湯通。毛用衣帛蘸摩腹中。胎自出。○一方榆白皮煮汁。服二升。○一方治有孕數月未足。子死腹中。母欲悶絕。取大豆三升。醋煮濃汁三升。頓服。○一方用瓜萁根一味。焙為末。每服二錢。取順流水下。

○產後上

○論產後調理法

大全云。凡生產畢。飲熱童便一盞。不得使卧。宜開目少坐。須臾上牀。宜仰卧。不宜側卧。宜豎膝。未可伸足。高倚牀頭。後鋪衲褥。遮圍四壁。使無孔隙。免致賊風。及以醋塗鼻。或用醋炭及燒漆器。更以手從心膈至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血量逆。不問腹痛。不痛。有病無病。以童便和酒半盞。溫服五七服。酒雖行。血亦不可多。恐引血入四肢。且能昏暈。且頻食白粥少許。一月之後。宜食羊肉。猪蹄少許。仍慎言語。七情。寒暑。梳頭洗足。以百日為度。若血氣素弱者。不計日月。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰尋芳。最難治療。初產時不可問。是男是女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷齒。恐致血逆。須血氣平復。方可治事。犯時微若秋毫。成病重如山。癰不可戒。哉。陳藏器云。清淨汁與產婦服之。將安腹上則止。○產婦將息如法。臟腑調和。庶無諸疾苦。須先服黑神散。四物湯。四順理中丸。七寶散。若壯熱頭痛。此乳脈將行。用玉露散。頭目不清。是血量用清。

皆新產切實治法。須熱之。

喫藥

魂散粥食不美是胃氣虛用四順理中丸

○論產後大補血氣為主

產後最當大補深宜
審感路有無內傷外
感虛實何如應為合
理輕用淡參人所
易忽却最妙法云

丹溪曰產後當大補血氣為主雖有雜證以未治之○產後為補虛用參朮黃耆陳皮歸身尾川芎炙甘草如發熱輕則加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾薑○凡產後有病先固氣血○產後一切病多是血虛皆不可發表○新產後不可用苦藥以其酸寒能代生發之氣故也○大抵胎前母滯產後母虛

○論產後服熱藥之誤

此論世局方特擇其
血病治血以下尚有
寒者溫之熱者清之
凝者行之虛者補之
血少者止之五句似
不可少始識之以便
採擇

丹溪曰或問新產之婦好血已虧汚血或留彼黑神散非要藥乎答曰至哉坤元萬物資生理之常也初產之婦好血未必虧汚血未必積臍肝未必寒何以藥為飲食起居勤加調護何病之有誠有汚血體怯而寒與之數帖亦自簡便或有他病當求病起何因因病在何經氣病治氣血病治血何用拘執此方例令服餌設有性急者形瘦者本有怒火者夏月坐蓐者時在大令普結皆為禁藥生於將護之法尤為悖理肉汁發陰經之火易成內傷之病先哲具在訓戒胡為以羊雞滾汁作藥而又常服當歸建中湯四順理中丸雖是補劑並是偏熱臟腑無寒何處消受若夫兒之初生母腹暢寬便啖難子且喫火鹽不思難子難化火鹽發熱輾轉生證不知所因幸爾用藥甯不誤人子每見產婦之無疾者必教之以却去黑神散與夫難子火鹽諸品肉食且與白粥將理間以些少石首蒼者令甘滯食之半月後方與少肉若難子亦須豁開湯煮大能養胃却疾彼富貴之家驕恣之婦卒有白帶頭風氣痛腸築痰逆口乾經事不調髮充體熱等證皆是陽盛陰虛之病天生血氣本自和平曰盛曰虛又烏知非此等謬妄有以兆之耶

○論新產三病

諸此則知痙症亦有
外來不可專主氣血
不足而驟用補劑反
致不救也

仲景云問新產婦人有三病一者病痙二者病鬱胃三者大便難何謂也斷曰新產血虛多汗出喜中風故令病痙亡血復汗寒多故令鬱胃亡津液胃燥故大便難

產婦鬱胃即今世所謂血暈也

○產後諸忌

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至元虛羸百疾滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也