

北京常見樹木枝葉檢索表

(樹木學參考資料之一)

北京林學院
森林植物學教研組

1965、8

北京常见树木枝叶检索表
(树木学参考资料之一)

编者: 北京林学院森林植物学教研组

印刷: 北京林学院讲义室

校对: 刘一樵、康木生、郝廷和

编号: 65·554

开本: 787×1092毫米1/32

字数: 91,000

北京常見樹木枝葉檢索表

- 1. 葉針形、綫形、錐形或鱗形……………表一（1頁）
- 1. 葉為闊葉……………2
- 2. 單葉……………3
- 2. 復葉……………表二（3頁）
- 3. 對生或輪生……………表三（16頁）
- 3. 互生……………表四（26頁）

表一 葉針形、綫形、錐形、鱗形

- 1. 葉針形、錐形或綫形……………2
- 1. 葉鱗形……………16
- 2. 葉針形或錐形、橫斷面為半圓形、三角形或四稜形、但不扁平……………3
- 2. 葉扁平綫形……………14
- 3. 葉錐形、三枚輪生，稀二枚對生……………4
- 3. 葉針形、單生或2—5枚束生……………6
- 4. 葉近軸面（上面）有深溝槽、槽內只一條白色氣孔帶……
……………杜松 *Juniperus regida* Seib. et Zucc.
- 4. 葉近軸面無顯著溝槽，中脈兩側各有一條白色氣孔帶……
……………5
- 5. 葉背有微凹的細縱槽，近基部有兩條白點，葉寬短，緊密抱枝着生（葡萄灌木，高75厘米）……………偃柏
Sabina procumbens (Sieb.) Iwata et Kusaka

5. 叶背无縱槽亦无白点，叶較細长，疏松斜展（直立乔木）……………
 ……檜柏 *Sabina chinensis* (Linn.) Antoine
6. 針叶2—5枚束生，长4厘米以上……………7
6. 針叶单生，长3厘米以下……………13
7. 針叶2枚一束，叶鞘宿存……………8
7. 針叶3—5枚一束，叶鞘早落……………11
8. 冬芽褐色——淡褐色，树脂管边生……………9
8. 冬芽白色，針叶粗硬，深綠色，长6—12厘米，树脂管中生……………黑松 *Pinus thunbergii* Parl.
9. 針叶較細柔，长4—13厘米……………10
9. 針叶較粗硬，长7—15厘米，幼枝无白粉……………
 ……油松 *Pinus tabulaeformis* Carr.
10. 針叶长约4—6厘米左右，橫断面扁半圓形，通常扭曲……………
 ……樟子松 *Pinus sylvestris* var. *mongolica* Litvin.
10. 針叶长约5—13厘米，橫断面半圓形，直伸不扭曲……………
 ……赤松 *Pinus densiflora* Seib et Zucc.
11. 針叶三枚一束，树皮灰綠色，不規則片状剝落，內皮淡綠白色……………白皮松 *Pinus bungeana* Zucc.
11. 針叶五枚一束，树皮不为灰白色……………12
12. 小枝紅褐色，密生褐色絨毛，針叶較粗硬……………
 ……紅松 *Pinus koraiensis* Seib. et Zucc.
12. 小枝灰綠色，光滑无毛，針叶較柔軟……………
 ……华山松 *Pinus armandi* Franch.
13. 小枝黃褐色粗壯，被淡黃色柔毛，叶枕显著，几与小枝

- 垂直冬芽圓錐形……云杉 *Picea asperata* Mast.
13. 小枝較細弱，淡黃色或灰白色，通常光滑無毛，葉枕較細，常斜上生長，冬芽卵形……
- ……青杆 *Picea wilsonii* Mast.
14. 葉常綠，革質，小枝灰褐色，有毛，有平或凹的圓形葉痕……臭松 *Abies nephrolepis* Maxim.
14. 葉質薄，柔軟，冬季落葉，小枝沒有平圓形葉痕……15
15. 枝有明顯長短枝，葉在長枝上互生，在短枝上簇生……
- ……華北落葉松 *Larix principis-rupprechtii* Pilger.
15. 枝不分長枝短枝，枝葉均為對生……水杉 *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng
16. 莖綠色有節，鱗葉對生，膜質，莖部稍聯合……
- ……麻黃 *Ephedra sinica* Stapf.
16. 莖不為綠色，不具關節，鱗葉綠色……17
17. 鱗葉互生、柔軟、小枝紅褐色，有光澤……
- ……檉柳 *Tamarix chinensis* Lour.
17. 鱗葉對生，革質常綠……18
18. 連葉小枝圓筒形，同株樹木常兼有錐形及鱗形兩種葉形……
- ……檜柏 *Sabina chinensis* (L.) Antoine
18. 連葉小枝扁平，葉全部為鱗形……
- ……側柏 *Biota orientalis* Endl.

表二 复 叶

1. 羽狀复葉…… 2
1. 掌狀复葉或三出复葉……75

2. 一回羽状复叶..... 9
2. 二回羽状复叶..... 3
3. 二回奇数羽状复叶..... 7
3. 二回偶数羽状复叶..... 4
4. 小枝无刺, 小叶小, 长0.5—1厘米, 菜刀形, 中脉偏于一侧.....合欢 *Albizia julibrissin* Durcz.
4. 小枝有刺, 小叶大, 长1厘米以上, 中脉不偏斜..... 5
5. 老枝枝刺扁平.....
.....日本皂角 *Gleditsia japonica* Miq.
5. 老枝枝刺圆形(在幼枝上枝刺近基部处有时稍扁)..... 6
6. 小叶全缘, 叶较小, 长1—3厘米.....
.....野皂角 *Gleditsia heterophylla* Bge.
6. 小叶疏锯齿, 叶较大, 长3—8厘米.....
.....皂角 *Gleditsia sinensis* Lam.
7. 茎、枝、叶柄上密生褐色毛及针刺, 叶缘有不整齐的单锯齿.....槐木 *Aralia chinensis* L.
7. 茎、枝、叶柄上无皮刺..... 8
8. 复叶具4—9对羽片、小叶具疏缺刻状锯齿.....
.....楝树 *Melia azedarach* L.
8. 复叶羽片在4对以下, 小叶有不规则裂片或有疏大锯齿.....
.....欒树 *Koelreuteria paniculata* Lam.
9. 一回奇数羽状复叶.....20
9. 一回偶数羽状复叶.....10
10. 小叶有锯齿.....11
10. 小叶全缘(仅臭椿小叶基有1—4不明显的浅裂).....13
11. 总叶柄上有叶轴翅、冬芽裸露, 有柄.....

-楓楊 *Pterocarya stenoptera* DC.
11. 总叶柄上无叶軸翅、鱗芽无柄.....12
12. 复叶长20厘米以下、复叶頂端两枚小叶最大，小叶长方
状椭圆形，鋸齿細密，叶基歪斜.....
.....皂莢 *Gleditsia sinensis* Lam.
12. 复叶长25厘米以上，复叶頂端二枚小叶最小，小叶卵状
椭圆形，鋸齿疏大，叶基不歪斜.....
.....香椿 *Toona sinensis* (juss.) Roem.
13. 小叶四枚，总叶柄先端成刺状，两侧并有托叶刺.....14
13. 小叶八枚以上.....15
14. 小叶成远离的两对.....
.....錦鷄儿 *Caragana sinica* Rehd.
14. 小叶2对，紧密簇生.....
.....金雀儿 *Caragana rosea* Turcz.
15. 小叶小，长3厘米以下，枝常有刺.....16
15. 小叶較大，长4厘米以上，枝无刺.....18
16. 小叶叶背密生灰色平伏柔毛.....
.....北京錦鷄儿 *Caragana pekinensis* komarov.
16. 小叶叶背光滑或疏生柔毛.....17
17. 小叶长椭圆形，基部圓形，叶較大，长1—2.5厘米.....
.....树錦鷄儿 *Caragana arborescens* Lam.
17. 小叶倒卵形或倒卵状长圓形。基部楔形，叶較小，长
0.4—1厘米.....
.....小叶錦鷄儿 *Caragana microphylla* Lamark.
18. 小叶披針形，长5—9厘米，叶基常歪斜不对称.....
.....黃連木 *Pistacia chinensis* Mill.

18. 小叶长圆形至长圆状披针形，8—15厘米，叶基不偏斜
.....19
19. 小叶基部常有1—4不明显浅裂，裂片顶端有腺点，具臭味.....臭椿 *Ailanthus altissima* Swingle.
19. 小叶基部无裂片亦无腺点，叶揉碎后具有香味.....
.....香椿 *Toona sinensis* (Juss.) Roem.
20. 复叶对生.....21
20. 复叶互生.....35
21. 小叶有不明显的钝锯齿，叶缘有睫毛，齿隙间有透明油腺点，叶揉碎后有气味.....22
21. 小叶叶缘有锯齿或裂片，但齿间无透明油腺点，叶揉碎后无气味.....23
22. 小枝灰黄色，光滑不被柔毛，芽位于叶痕内（叶柄下芽）叶背沿脉有白色长毛.....
.....黄菠蘿 *Phellodendron amurense* Rupr.
22. 小枝灰绿色，被柔毛，芽明显位于叶痕上方，叶背沿脉有少许黄褐色短毛.....
.....达氏吴茱萸 *Evodia danielli* Hemsl.
23. 小叶叶缘有缺刻状疏大锯齿或裂片.....24
23. 小叶无裂片，锯齿较细密.....27
24. 相对两叶柄在基部连成环状，节处膨大，小叶3—7，小叶缘具疏锯齿或浅裂或全缘.....
.....羽叶槭 *Acer negundo* L.
24. 叶柄不为上述状况.....25
25. 小枝中空，常为四棱形，小叶常三枚.....
.....连翘 *Forsythia suspensa* Vahl.

25. 小枝为实髓心, 小叶 7—11 枚……………26
26. 小叶 9—11 枚 (少 7 枚) 叶背有柔毛至少沿中脉有毛…
……………美国凌霄 *Campsis radians* Seem.
26. 小叶 7—9 枚, 叶背光滑无毛……………
……………凌霄 *Campsis grandiflora* Loisel.
27. 复叶柄基部膨大, 相連成环状, 有 1—4 突起綠色腺点,
小枝具粗大而軟的髓心……………28
27. 叶柄基部不膨大, 亦不相連成环状, 无腺点, 小枝具硬
实髓心……………29
28. 小叶 5—8 枚, 卵形、橢圓形或卵状披針形, 叶緣粗鋸
齿, 先端較尖成鈎状……………
……………接骨木 *Sambucus racemosa* L.
28. 小叶 7—11 枚 (常 11 枚), 橢圓状披針形或披針形, 叶
緣鋸齿較銳直伸……………
……………席氏接骨木 *sambucus sieboldiana* Bl.
29. 小叶小, 长 2—5 厘米左右, 卵圓形或倒卵状橢圓形, 叶背
光滑无毛……………小叶白蜡 *Fraxinus bungeana* DC.
29. 小叶較大, 长 5 厘米以上, 叶背沿中脉有柔毛……………30
30. 小叶 3—7 枚, 通常 3—5 枚, 小叶有短柄, (柄长 0.4 厘
米以上) ………………31
30. 小叶 5—11 枚, 通常 5—7 枚, 小叶无柄或几无柄……………32
31. 小叶闊卵形至倒卵形 (少有橢圓形) 先端具长尾, 叶緣
鋸齿稀疏而粗鈍 (果实先端尖) ………………
……………大叶白蜡 *Fraxinus rhynchophylla* Hemsol.
31. 小叶长圓形至披針形, 先端漸尖 (果实先端鈍且微凹)
……………苦櫪木 *Fraxinus retusa* champ.

32. 小叶着生复叶軸处膨大，密生锈色毛，叶背沿脉处有黄褐色絨毛，叶緣具銳鋸齒……………
……………水曲柳 *Fraxinus mandshurica* Rupr.
32. 叶緣鋸齒疏淺，小叶着生复叶軸处不膨大，无锈色毛着生，或微有锈色毛……………33
33. 叶卵状披針形，先端长尖，叶較厚，表面深綠色有光澤（花序着生在老枝上）……………34
33. 叶卵状橢圓形至卵状长橢圓形，先端漸尖，叶質較薄，叶面淡綠色无光澤（花序着生在新枝上）……………
……………白腊 *Fraxinus chinensis* Roxb.
34. 小枝、叶柄、叶背密生灰色柔毛……………
……………毛洋白腊 *Fraxinus pennsylvanica* Marsh.
34. 枝叶光滑无毛或沿脉有毛……………洋白腊
Fraxinus pennsylvanica var. *lanceolata* Sarg.
35. 小叶全緣，（仅臭椿叶基有1—4不明显淺裂）……………36
35. 小叶叶緣有鋸齒或裂片……………50
36. 小叶基部常有2—4不明显淺裂片，裂片頂端有腺点、有臭味……………臭椿 *Ailanthus altissima* Swingle.
36. 小叶叶基无裂片亦无腺点……………37
37. 枝有托叶刺或皮刺……………38
37. 枝无刺……………40
38. 小枝叶柄密生紅褐色皮刺及褐色毛……………
……………毛刺槐 *Robinia hispida* L.
38. 小枝有托叶刺，但无紅褐色皮刺及刺毛……………39
39. 托叶刺两枝，扁三角形，小叶大，长3—5厘米，叶背光滑无毛……………洋槐 *Robinia pseudoacacia* L.

39. 托叶刺綫形，小叶小，长1厘米左右，叶背密生白色长柔毛.....
 北京錦鷄儿 *Caragana pekinensis komarov.*
40. 小叶內有透明油点有气味.....
 紫穗槐 *Amorpha fruticosa L.*
40. 小叶內无透明油点.....41
41. 芽包莖在叶柄內（叶柄下芽）.....42
41. 芽明显位于叶痕上方（腋芽）.....44
42. 小枝灰白色，具黃褐色皮孔，枝叶內含白色乳汁.....
 青麸楊 *Rhus potanini Maxim.*
42. 小枝暗綠色具明显白色皮孔，枝叶內无白色乳汁.....43
43. 小枝直立，斜上直伸.....
 国槐 *Sophora japonica L.*
43. 小枝卷曲下垂.....
 龙爪槐 *Sophora japonica var. pendula Loud.*
44. 小叶闊卵形，近圓形或橢圓形，长不足寬的1倍，先端鈍圓.....45
44. 小叶长橢圓形，卵状披針形或卵状橢圓形，叶长大于寬的1倍，叶先端漸尖.....48
45. 小叶5—11枚，小叶較大，长4—12厘米.....46
45. 小叶7—11枚，小叶小，长不足3厘米.....47
46. 小叶长6—12厘米，側脉先端明显向上弯曲，叶背无毛，或脉腋有簇生毛，小枝髓心片状.....
 核桃 *Juglans regia L.*
46. 小叶长4—7厘米，側脉不明显弯曲，幼叶密生白毛，老叶叶背被柔毛，小枝具坚实髓心.....

- 怀槐 *Maackia amurensis* Rupt. et Max.
47. 小叶长圆形, 长 0.5—1.5 厘米, 宽 0.2—0.8 厘米, (花序短于叶柄)
- 本氏木兰 *Indigofera bungeana* Walp.
47. 小叶倒卵形或椭圆形, 叶较大, 长 1—3 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, (花序长于叶柄)
- 吉氏木兰 *Indigofera kirilowii* Maxim.
48. 叶卵状披针形, 叶基两侧明显不对称
- 黄连木 *Pistacia chinensis* Bge.
48. 叶长椭圆形或卵状椭圆形, 叶基两侧对称
49. 总叶柄基部膨大成圆形节, 枝叶内无白色乳汁, 叶缘有时上下起伏波状, (缠绕灌木)
- (紫藤) *Wisteria sinensis* Sweet.
49. 总叶柄基部不膨大成节, 枝叶内含白色乳汁 (乔木)
- 漆树 *Rhus verniciflua* Stokes.
50. 小枝有枝刺、皮刺或托叶刺
50. 小枝无刺
51. 枝刺粗壮, 常集生于树干分枝处, 小叶 8—14 枚, 顶端一对小叶最大
- 皂角 *Gleditsia sinensis* Lam.
51. 小枝有皮刺或托叶刺, 无枝刺
52. 总叶柄有窄叶轴翅, 小叶内有透明油点, 有香味
- 花椒 *Zanthoxylum simulans* Hance.
52. 总叶柄无叶轴翅, 小叶内无透明油点, 无香味
53. 托叶小, 线形, 与叶柄分离, 小枝绿色, 皮刺疏生
53. 托叶较大, 披针形或线状披针形, 至少中部以上和叶柄

- 癒合.....55
54. 小叶 3—5 枚，較大，長 2—6 厘米左右.....
.....木香 *Rosa banksiae* Ait.
54. 小叶通常 5 枚，較小，長不足 2 厘米.....
重瓣黃木香 *Rosa banksiae* var. *lutescens* Voss.
55. 小枝有皮刺，葉背密生絨毛，托葉葉狀，小叶質厚，葉
面皺縮，.....
.....玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb.
55. 小枝及葉背光滑無毛或被薄柔毛.....56
56. 皮刺直伸，不為鈎狀，小枝紫紅色或為褐色.....57
56. 皮刺常彎曲成鈎狀，小枝常為綠色.....60
57. 小叶小，長 0.8—2 厘米左右，寬卵形近圓形或橢圓形.....
.....58
57. 小叶大，2 厘米以上卵形或橢圓形.....
.....山刺玫 *Rosa bella* R. et W.
58. 葉背有腺點，鋸齒較深而尖銳，葉橢圓形.....
.....報春刺玫 *Rosa primula* Bosulanger.
58. 葉背無腺點，鋸齒較細鈍，葉寬卵形或近圓形.....59
59. 皮刺寬扁，呈三角形，刺基寬約 0.5 厘米左右，小枝除
皮刺外，尚有刺毛着生（技拱形）.....
.....黃薔薇 *Rosa hugonis* Hemsl.
59. 皮刺窄，披針形，刺基約 0.2 厘米左右，小枝無刺毛.....
.....黃刺玫 *Rosa xanthina* Lindl.
60. 托葉下部通常有皮刺，小叶長橢圓形至倒卵狀橢圓形，
先端漸尖，葉軸及葉背有薄柔毛.....
.....野薔薇 *Rosa multiflora* Thuub.

60. 托叶下无皮刺, 小叶闊卵形到椭圆形, 先端圓形或突
尖, 叶軸无毛.....61
61. 小叶 3—5 枚, 較大, 长 2.5—6 厘米, 叶背灰綠色, 叶
面有光泽.....
.....月季 *Rosa chinensis* Jacq.
61. 小叶 5—11 枚, 較小, 长不足 3.5 厘米, 叶背疏生柔毛
.....达烏里蔷薇 *Rosa dahurica* Pall.
62. 总叶柄上有叶軸翅.....63
62. 总叶柄上无叶軸翅.....64
63. 小枝及叶背密生灰白色絨毛, 叶軸翅較寬, 鱗芽, 实髓
心.....
.....盐肤木 *Rhus chinensis* Mill.
63. 枝叶光滑无毛, 叶軸翅較窄, 裸芽有柄, 髓心片状.....
.....楓楊 *Pterocarya stenoptera* DC.
64. 小枝或叶背密生柔毛或腺毛.....65
64. 小枝或叶背光滑无毛或被薄柔毛.....66
65. 小枝髓心片状, 体内不含乳汁, 幼枝及叶背有柔毛或具
腺毛, 叶卵状长圓形或长圓形較寬.....
.....核桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim.
65. 小枝为实髓心, 体内含乳液, 小枝密生柔毛, 叶长圓状
披針形或披針形.....
.....鹿角漆 *Rhus typhina* L.
66. 小叶叶緣为复鋸齿.....67
66. 小叶叶緣为单鋸齿.....68
67. 小叶側脉在叶表面不下陷, 平滑, 总叶軸光滑无毛或微
有毛, 托叶披針形.....

-珍珠梅 *Sorbaria kirilowii* Regel.
67. 小叶側脉在叶表面下陷，叶面有皺紋，总叶軸被密毛，托叶橢圓狀披針形.....
-长蕊珍珠梅 *Sorbaria arborea* Schneid.
68. 小叶小，长1—2.5厘米，橢圓形至綫長狀圓形，叶緣反卷.....木本翻白草 *Potentilla fruticosa* L.
68. 小叶大，长在3厘米以上，叶緣不反卷.....69
69. 小叶叶緣具疏大缺刻狀鋸齒或不規則裂片.....
-藥樹 *Koelreutria paniculata* Lam.
69. 叶緣具較細密整齊的鋸齒.....70
70. 裸芽密背銹黃色絨毛，小枝綠色，內皮味苦.....
-苦木 *Picrasma quassioides* Benn.
70. 鱗芽，小枝不为綠色，內皮亦不苦.....71
71. 小叶无柄或近无柄，小叶小，通常长在5厘米以下.....72
71. 小叶有明显叶柄，小叶較大，通常在5厘米以上.....74
72. 无托叶，小枝黃褐色有光泽，小叶披針形，叶基楔形兩側稍有歪斜，叶背无毛.....
-文冠果 *Xanthoceras sorbifolia* Bge.
72. 有托叶，通常宿存，大，一側有鋸齒，小叶叶基圓形或为寬楔形，兩側对称.....73
73. 冬芽外面被短柔毛，小叶叶背具白霜（果实为黃白色）.....
-紅葉花楸 *Sorbus discolor* Hedl.
73. 冬芽外面密被白色絨毛，小叶叶背具稀疏絨毛，无白霜，叶柄被白色絨毛（果实为紅色）.....
-百華花楸 *Sorbus pohuashanensis* Hedl.
74. 小叶稍弯曲成鑷形，叶基歪斜不对称（一边窄楔形，一

- 边楔形)总叶柄基部不膨大成圆形节状.....
山核桃 *Carya illinoensis* K.Koch.
74. 小叶叶基圆形或阔楔形, 不歪斜, 总叶柄基部膨大成圆形节状.....
紫藤 *Wisteria sinensis* Sweet.
75. 三出复叶.....80
75. 掌状复叶.....76
76. 枝、莖密生皮刺、小叶5枚.....
刺五加 *Acanthopanax senticosus* Horms.
76. 枝莖不具刺.....77
77. 掌状复叶对生.....78
77. 掌状复叶互生.....79
78. 小叶倒卵状披针形, 叶缘为整齐细锯齿, 叶背光滑无毛.....
七叶树 *Aesculus chinensis* Bge.
78. 小叶卵状披针或长椭圆形, 羽状深裂或有缺刻状锯齿, 叶背具灰白色柔毛.....
荆条 *Vitex chinensis* Mill.
79. 小枝幼时具四稜, 卷须先端具吸盘, 小叶有柄, 中部以上有锯齿.....
红叶爬山虎 *Parthenocissus henryana* Dials. et Gilg.
79. 小枝圆筒形, 卷须先端无吸盘, 小叶披针形, 羽状深裂.....
附子叶蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bge.
80. 三出复叶对生.....81
80. 三出复叶互生.....83
81. 小枝绿色, 横断面四稜, 小叶全缘.....
迎春 *Jasminum nudiflorum* Lindl.
81. 小枝不为绿色, 黄褐色或灰褐色, 小叶叶缘有锯齿.....82

82. 小枝中空、叶緣鋸齒不整齐（同株上亦出現单叶情况）
連翹 *Forsythia suspensa* Vahl.
82. 小枝具实髓，叶緣鋸齒整齐.....
省沽油 *Staphylea bumalda* DC.
83. 小枝具卷須及吸盘，着叶处（节处）膨大（攀援灌木）
爬山虎 *Parthenociss tricuspidata* Planch.
83. 小枝无卷須及吸盘，着叶处（节处）亦不膨大.....
 （直立灌木）.....84
84. 小枝綠色，枝刺粗壮，略呈扁平，小叶近革質，叶柄有
 翼（有箭叶）.....
枸橘 *Poncirus trifoliata* Raf.
84. 枝叶不为上述情况.....85
85. 小叶大，頂端小叶长在10厘米以上.....86
85. 小叶小，叶长在8厘米以下.....87
86. 小叶闊卵形或斜卵形，小枝叶背密生褐色硬毛.....
 （攀援灌木）.....
葛藤 *Pueraria hirsuta* Matsum.
86. 小叶橢圓形，枝叶无毛，或仅叶背沿脉有毛.....
三叶椒 *Ptelea trifoliata* L.
87. 小叶长橢圓形或綫状披針形，长大于寬的1倍以上.....88
87. 叶卵形、橢圓形或倒卵形，长不足寬的1倍.....89
88. 小叶长橢圓形，长1—3.5厘米，寬0.4—1厘米.....
达烏里胡枝子 *Lespedeza dahurica* Schneid.
88. 小叶綫状披針形或倒披針形，长較寬大二倍以上（小叶
 长1.5—3厘米，寬0.5厘米以下）.....灯心
 草状胡枝子 *Lespedeza hedysaroides* Kitagawa.