



本草綱目蟲部目錄第四十卷

蟲之二

卵生類下二十二種

青蚨

拾
龐
降
附

蛻蝶

綱
目

蜻蛉

別
錄
卽
蜻
蛉

樗雞

本
經
卽
紅
娘
子

棗貓

綱
目

斑蝥

本
經

芫青

別
錄

葛上亭羹

別
錄
地
膽

壁錢

拾
遺

蜘蛛

別
錄

草蜘蛛

開
寶

水蛭

本
經

蟻

拾
遺
卽
土
蜘
蛛

蟹

開
寶

狗蠅

綱
目
壁
蟲
附

蠅

綱
目
白
蠅
附

青腰蟲

拾
遺

蛆

綱
目

蠅

綱
目

牛蠅

綱
目

人蠶 拾遺

右附方舊二十新八十一

本草綱目蟲部第四十卷

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨

拾遺

釋名 蛤蟬

蠅蠅

音謀

蠍蠍

音敦

蒲董

音萌

魚父

魚伯

集解

藏器曰青蚨生南海狀如蟬其子着木取以塗錢皆歸本處搜神記云南方有蟲名蠅蠍

形大如蟬辛則母飛來雖潛取之亦知其處殺其母塗錢以其子

則母飛來雖潛取之亦知其處殺其母塗錢以其子

塗貫用錢去則自還淮南子萬畢術云青蚨還錢

高誘註云青蚨一名魚父魚伯以其子母各等置

甕中埋東行垣下三日開之卽相從以母血塗八

十一錢子血塗八十一錢留子用母留母用子皆

自還也。時珍曰：按異物志言，蠍生南海諸山，雄雌常處不相捨。青金色，人采得以法末之用，塗錢以貨易于人，晝用夜歸，又能秘精縮小，便亦人間難得之物也。時珍曰：按異物志云，青蚨形如蟬而長，其子如蝦子，着草葉上得其子，則母飛來煎食甚辛。而美嶼神書云，青蚨一名蒲𧆉，似小蟬，大蒲上八八爲行，或九九爲行，如大蠶子而圓，取其母血及火炙子血塗錢市物，仍自還歸，用之無窮。誠仙術也。其說俱彷彿，但藏器云，子着木上，稍有不同。而許氏說文亦曰：青蚨水蟲也。蓋水蟲而產子於草木爾。

附錄龐降

時珍曰：

按劉恂嶺表錄異云，龐降生子

薄其名，自呼但聞其聲，而鮮能得之人。以善價求爲媚藥，按此形狀似蟬，可爲媚藥。與李珣海藥青恐亦雌雄不捨，秘精之類，在木之上者也。待

氣味辛溫無毒

主治補中益陽道去冷氣令人悅澤

藏器

秘精縮小

便

藥錄

蛺蝶

綱目

釋名

蛺蝶

音葉

蝴蝶

時珍曰蝶輕薄夾翅而飛

蛺蝶輕薄夾翅而飛

其交以鼻

其交以鼻

其交以鼻

集解

時珍曰

蝶蛾類也

大曰蝶

小曰蛾

其種甚繁

皆四翅

有粉褪

古今註

謂橘蠶化蝶

交則粉褪

古今註

謂橘蠶化蝶

莊子謂烏足之葉化蝶

蝶婢雅謂蔬菜化蝶

爾雅謂菜蟲化蝶

雜俎謂百合花化蝶

北戶錄謂樹葉化蝶

如丹青

野史謂綠裙化蝶

皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

謂緣蝶皆各據其所見者而信爾蓋不

羽化也朽衣物亦必生蟲而化草木花葉之化者乃氣化風化也其色亦各隨其蟲所食花葉及珊瑚化之物色而然楊慎丹鉛錄云有草蝶水蝶在水申嶺南異物志載有人浮南海見蛱蝶大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美

氣味

闕

主治小兒脫肛陰乾爲末唾調半錢塗手心以瘥

爲度

時珍

發明

時珍曰蝴蝶古方無用者惟普濟方載此方治脫肛亦不知用何等蝶也

蜻蛉

別錄下品

釋名

蜻蜓

亦作

蜻蛉

音

音

音

音

音

弘景紗羊綱目赤者名赤卒

(時珍曰)蜻蛚言其色青葱也
珍曰)蜻蛚言其狀伶仃也
或云其尾好亭而挺故曰蜻
或云其尾如丁也或云其尾如紗也

俗名紗羊言其翅如紗也按崔豹古今註云大而

色青者曰蜻蜓小而黃者江東名胡梨淮南名蠟

衣使亦曰天雞陶氏謂胡梨爲蜻蛉未致此耳
蟹亦曰赤弁丈人大而玄紺者遼海名紺

鄱陽名江雞小而黃者江東名胡梨淮南名蠟

集解(弘景曰)蜻蛉有五六種惟青色大眼一名

乘俗呼爲胡梨者入藥道家云眼可化爲青

珠其餘黃細及黑者不入藥保昇曰所在有之好

飛水際六足四翼宗奭曰蜻蜓中一種最大汴人

呼爲馬大頭者是也身綠色其雌者腰間有碧色

類眼皆大頭露目短頸長腰薄如紗食蚊飲露其色

一一道入藥用雄者此物生於水中故多飛水上其

眼皆大頭露目短頸長腰薄如紗食蚊飲露其色

水造化權輿云水蠶化蟲羅願云水蠶化蜻蛚

仍交于水上附物散卵復爲水蠶也張華博物蜻蛉

志亦言五月五日埋蜻蛉頭于戶內可化青珠未知然否古方惟用大而青者近時房中術亦有用地紅色者崔豹云遼海間有紺蠶蟲如蜻蛉而玄紺色六七月羣飛闇天夷人食之云海中青蝦所化也雲南志云瀾滄蒲蠶諸地凡土蜂蜻蛉蚱蜢之類無不食之也

氣味微寒無毒

主治強陰止精別錄壯陽暖水臟華

樗雞

本經中品

釋名紅娘子

綱目灰花蛾

時珍曰其鳴以時故得雞名廣雅作樗鳩廣志作鷯

雞皆訛矣其羽文綵故俗呼紅娘子灰花蛾云

集解

別錄曰生河內川谷樗樹上七月采暴乾弘景曰今出梁州形似寒蟹而小樗樹似漆而

臭亦猶莞青亭長在莞葛上也恭曰河內無此今出岐州此有二種以五色具者爲雄入藥良其青黑質白斑者是雌不入藥宗奭曰汴洛諸界尤多形類蠶蛾但腹大頭足微黑翅兩重外一重灰色
內一重深紅五色皆具頌曰爾雅云韞天雞郭璞注云小蟲也黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞然今人或蓄之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類郭說樗上一種頭翅皆赤者乃如舊說人呼爲紅娘子然不名樗雞疑卽是此蓋古今之稱不同爾時珍曰樗卽臭椿也此物初生頭方而扁喙向下六足重翼黑色及長則能飛外翼灰黃有斑點內翅五色相間其居樹上布置成行秋深生子在樗皮上蘇恭寇宗奭之說得之蘇頌引郭璞以爲莎雞者誤矣莎雞居莎草閒蟋蟀之類似蝗而斑有翅數重下翅正赤六月飛而振羽有聲詳見陸機毛詩疏義而羅願爾雅翼以莎雞爲絡緯卽俗名紡絲者

修治

時或用麵炒黃色去米麪用丸使去翅足以糯米

氣味苦平有小毒不可近目

別錄

主治心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕

本經

腰痛下氣強陰多精

別錄

通血閉行瘀血

宗主

癰癧散目中結翳辟邪氣療猘犬傷

時珍

發明

弘景曰方藥稀用爲大麝香丸用之時珍曰古方辟溫殺鬼丸中用之近世方中多用蓋

城陰經藥能行血活血也普濟方治目翳撥雲膏中與茺青斑蝥同用亦是活血散結之義也

附方

新

予宮虛寒

杏林摘要云婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或

漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散用紅娘子六十枚大黃阜莢草各一兩巴豆一百二

十枚爲末棗肉爲丸如彈子大以綿裹留繫用竹筒送入陰戶一時許發熱渴用熟湯一二盞解之後發寒靜睡要安三日方取出每日空心以雞子一枚胡椒末二分炒食酒下以補之久則子宮暖矣

瘰癧結核 用紅娘子十四枚乳香砒霜各一錢和作餅貼之不過一月其核自然脫下矣

衛生易簡方 **風狗咬傷** 不治卽死

十二箇斑蝥五箇並去翅足若四十歲各加一箇十五歲各加二箇青娘子三箇去翅足四十歲各一箇五六十年加二箇海馬半箇續隨子一分乳香沉香桔梗各半分酥油少許爲末十歲者作四服十五歲作三服二十歲作二服三十歲作一服○談塹翁方

橫痃便毒 雞子一箇開孔入紅娘子六箇紙包煨熟去紅娘子食雞子以酒下小便淋滲出濃血卽愈○陸氏積德堂方

棗貓

目綱

集解

時珍曰

棗

古方無考

近世方廣丹溪心法

小兒方用之

註云生棗樹上飛蟲也

大如棗子青灰色兩

角采得陰乾用之

缺

乾用

之

氣味

主治

小兒臍風

時珍曰

按方廣云

小兒初生以綿

裹臍帶離臍五

六寸紮定咬斷以

鴛翎筒送藥一

二分入臍大孔輕

輕揉散以艾炷

灸臍頭三壯結住勿打動候其自落永無臍風之

患萬不失一臍硬者用之軟者無病不必用也其

法用陰乾棗貓兒研末三箇真珠槌研四十九粒

炒黃丹五分白枯礬蛤粉血竭各五分

研勻如上法用臍有三孔一大二小也

斑蝥

本經下品

校正

陳藏器

蟹螯蟲係

釋名

斑貓

本經

蟹螯蟲

拾遺

龍蛇

音刺

斑蛇

時珍曰

斑言

其毒如矛刺也亦作蟹螯俗訛爲斑貓又訛斑
爲斑尾也吳普本草又名斑菌曰勝髮曰晏青
集解別錄曰生河內山谷亦生木石保昇曰斑貓所在

有之七八月大豆葉上甲蟲也長五六分黃黑斑
文烏腹尖喙就葉上采取陰乾用弘景曰此一蟲
四五變主療皆相似二三月在芫花上卽呼爲芫青
五月在葛花上卽呼爲葛上亭長八九月在豆花
上卽呼爲斑蝥九月十月復還地蟻卽呼爲地膽
此是僞地膽耳爲療猶同也其斑蝥大如巴豆甲
上有黃黑斑點芫青青黑色亭長身黑赤頭敦曰
芫青斑蝥亭長赤頭四件樣各不同所居所食所
效亦不同芫青嘴尖背上有一畫黃在芫花上食
汁斑蝥背上一畫黃一畫黑嘴尖處有一小赤點
在豆葉上食汁亭長形黃黑在葛葉上食汁赤頭
身黑額上有大紅一點也頌曰四蟲皆是一類但
隨時變耳深師方云四月五月六月爲葛上亭長

七月爲斑貓九月十月爲地膽今醫家知用茺青
斑蝥而地膽亭長少使故不得詳也恭曰本草古
今諸方並無王不留行蟲若陶氏所言則四蟲專
在一處今地膽出幽州茺青出甯州亭長出雍州
茺青斑蝥所在皆有四蟲出四處可一歲周遊四州乎
上陶蓋浪言爾時珍曰按本經別錄四蟲采取時
月正與陶說相合深師方用亭長所註亦同自是
說亦自欠明按太平御覽引神農本草經云春食陶
茺花爲茺青夏食葛花爲亭長秋食豆花爲斑蝥
冬入地中爲地膽黑頭赤尾其說甚明而唐宋校
正者反失收取更致紛紜何哉陶氏之王不留行
蟲雷氏之赤頭方藥未有用者要皆此類固可理
地膽餘見

修治

敷曰凡斑蝥茺青亭長地膽修事並漬糯米
小麻子相拌炒至米黃黑色取出去頭足尾

翅以血餘裹懸東牆角上一夜用之則毒去也大明曰入藥須去翅足糯米炒熟不可生用卽吐瀉人時珍曰一法用麩炒過醋煮用之也

氣味辛寒有毒

普曰神農辛岐伯鹹扁鵲甘有大毒○馬刀爲之使畏巴豆丹參空

青惡曾青甘草豆花時珍曰斑貓芫青亭長地膽之毒靛汁黃連黑豆葱茶皆能解之

主治寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石瘻

經別錄治瘰癧通利水道經權甄

血積傷人肌治疥癬墮胎

經別錄治瘰癧通利水道經權甄

療淋疾傳惡瘡瘻爛

華日

治癰瘕解疔毒猘犬毒沙

蟲毒蠱毒輕粉毒

時珍

發明

宗奭曰妊娠人不可服之爲潰人肉治淋方多用極苦人須斟酌之時珍曰斑蝥人獲得

之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走
下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云走
楊登甫云瘰癧之毒莫不有根大抵以斑蝥地膽矣
爲主制度如法能使根從小便中出或如粉片
或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒之行小便必
澀痛不可當以木通滑石燈心輩導之又葛洪肘
後方云席辯刺史傳云凡中蠱毒用斑蝥蟲四枚
去翅足炙熟桃皮五月初五日采去黑皮陰乾
大戟去骨各爲末如斑蝥一分二味各用二分合
和棗核大以米清服之必吐出蠱一服不瘥十日
更服此蠱洪州最多有老嫗解療之一人獲縑三
十疋秘方不傳後有子孫犯法黃華公若于則時爲都督因而得之也

附方

新九內消瘰癧不拘大人小兒經驗方用斑
蝥一個去翅足以粟一升同炒米焦去米不用入薄荷四兩爲末烏雞子清丸
如菜豆大空心臘茶下三丸加至五丸卻每日減