

可憎的性病

可怕的性病

江苏工业学院图书馆
史延胜
藏书章

中華民國二十六年五月

可怕的性病

在繁華都布，性病的流行，比較普通。性病即一般所謂花柳病，其為害比較甚大，非但可以危害本人，並且也可以遺傳到後代，這是多麼危險呵！因此我們不能不去研究他發生的原因及他為害的情形。

性病可分為三種，一曰白濁，一曰梅毒，一曰軟性下疳，茲分述於後：

(一) 白濁就是普通所謂淋病 (Gonorrhoe) 其病原菌是一種雙球菌，曰淋球菌。(Gonococcus) 係藉兩性性交而互相感染，感染之後，一天或三天，尿道外口即現燒灼，由此蔓延達於尿道前部，不斷的向外排泄白色的濃液，因其色濁，故有白濁之稱。從此不久，淋菌又可以順着尿道壁，移行達于尿道後部精囊輸出管輸入尿道之處，並且還可由精囊順着輸精管傳染到睪丸和副睪丸。睪丸和輸精管發炎之後，可以使排精之道閉塞，精液遂不能通過。此外攝護腺 (Prostate) 發炎後形成的瘢痕，也能阻礙精液的通過 而發生不生育之現像。白濁的膀胱化濃，在男子不若女子之多。在此種病變，其淋菌可藉輸尿管感染腎盂，而發生很嚴重腎盂及腎炎。

。白濁菌也可以侵入血管，順血道流入心臟，惹起心內膜炎（Endocarditis）可致死命，或移植到關節以內，而引起關節炎，等病變。婦女內部器官感染白濁之後，比較危險，而不易治療，子宮，卵巢及輸卵管發炎，其結果和男子一樣，也能發生不生產的惡果。淋菌由輸卵管也能感染到腹膜，發生腹膜炎（Peritonitis）其情形也很嚴重。

在婦女們，淋病也是一種很痛苦的病，婦女的陰道曲折不平，是隱藏淋菌的好地方。這淋菌遂由此向外，可以感染巴而脫林氏腺（Glandula Bartholini）向內又可以感染內部的諸生殖器官，如子宮，輸卵管，卵巢等是也。

淋菌也可以經直接的接觸，感染眼結膜，而發生極危險的結膜炎（Conjunctivitis）。對於這種危險的眼病，在初生兒避免的法子，就是當嬰兒初生出之時，用較濃的硝酸銀點眼。此種辦法，已普遍的實施於一切產科醫院，救了不少嬰兒。

白濁的確是男女不能生育的主要原因。據林次氏Lenz在德國統計的報告：『在一般男子不能生育的占百分之四十至五十，在女子占有百分之二十至二十五』。而在都市比這數目還要高些。又據白拉氏克氏 Blasko 的調查『男女因患此

病，對於國家，每年要有二十萬的生產損失』。沒有小孩的婦夫們，四分之一都是爲着患白濁而不受孕，而且患白濁的在上等階級尤占最多數，未來許多有天才的人材，竟因此不能出現，國家民族直接所受的害，是可想而知的。

(二)梅毒 (Syphils Lues) 梅毒的病原菌是一種螺旋菌 (Spirochaeta Pallida) 常于性交時感染之。感染之後，約四星期先于性器官病菌侵入之處，發生膿胞，由胞處生瘡，因其堅硬，所以我們叫他硬性下疳 (Ulcus durum)。除局部痛感以外，患者沒有旁的感覺。從此以後，病菌遂沿着淋巴道傳至鼠蹊腺 (Inguinaldruesen) 而發生腫脹，此即一般所謂無痛橫痃 (JndolenterBubo) 是也。梅毒由局部生瘡，以至鼠蹊淋巴腺腫，都還在第一步初發時期，(Primaere stadium)。在此期間，檢查血液，常爲陰性。不久，螺旋菌即侵入血管，順血行道散布全身，在此期間，檢查血液，則爲陽性，而此種現像，多發生於數月之後，梅毒病遂由初期入於次期 (Secundaere Stadium) 而皮膚上疹子的發生，乃是此期最重要的病症，雖然病人身上發疹子，病人並不覺得十分痛苦，他只覺着頭痛，和身上發熱，他對於他身上的病，毫不在意，而常忽視下去，但其內部的器管，都早已發生很嚴

重的變化。這時若就醫診治，則比較困難多矣。從此病遂入於潛伏時期，病人於不知不覺中，渡過次期，而入於第三期，（Tertiaerestadium）本期中病勢突然爆發，許多內臟和皮膚同時發生劇烈的炎症，和皮膠腫（Gumma abscess）等病變。

健康的身體，傳染梅毒後，在第一天或第一個月，若加以適當的治療，是可以完全滅絕的、治療愈早，治癒的希望愈大。

即在早期治療，吾人認為已完全治癒，但在事實上，于百分之二十中，仍還有復發的可能，這就是因為還有一部分梅毒菌，隱藏在體內，而未曾完全撲滅的原因。在這再發生的時期，梅毒菌可以使主動脈壁軟化，減少其彈力，而形成主動脈瘤（Aneurysma）。此瘤一方面可以壓迫其鄰近器官或組織。一方面因其血壓過高，可以破裂，而發生內出血的危險，同樣的在腦內，也能使腦動脈破裂，而發生中風（Apoplexie）等症。這種主動脈瘤和腦血管破裂，都是病人致死的原因。在復發性梅毒中，還有一種最普通的病，就是脊髓癆（Tabesdorsalis）病人起初常患不規則的腿痛和胃痛，末了發生麻痺（Paralyse）現象，由腿起始，漸延及膀胱大腸。

最後因呼吸肌的麻痺而致死亡。

在復發性梅毒很厲害的時候，往往發生各種精神病，如腦軟化，腦麻痺等，其顯而易見的病狀，就是言語障礙，而神經麻痺，眼障礙，癲狂等，病人就在此種精神異常之下，漸就死亡。

上述久後復發的梅毒，是不容易治療的，此種病人大都陷于死亡，即不死而其終身所受的痛苦，也是不能忍耐的。

患梅毒的夫婦，可以把梅毒經胎盤傳染到他的孩子身上，此種在子宮內被梅毒感染的胎兒，多半不到成熟就流產了，即不流產，而能正常的生出來，但因身患梅毒，往往也活不久，即不死，也都成為殘廢，不是癡人，便是癲狂，耳聾，口啞，目盲，飽受人間痛苦，於國家民族毫無益處。

我們應該特別注意的，就是梅毒在性病中，他的傳佈雖不若淋病之廣泛，但在病的本身上，他的傳染却是多方面的，如吃喝，接吻，或藉吸煙卷等，都有傳染的可能。

按林次氏Lenz的統計『這梅毒病的留毒，比較淋病還要高些，在大都會中，約有百分之四十到五十』白拉司克氏Blasko的報告：『柏林每年有百分之二，四，丹麥有百分之二，是梅毒患者，他們所得的比例數目，正相符合。』

(三)軟性下疳 (ulcus molle) 也是性病的一種，他的病原菌，是一種鏈狀桿菌，于性交時由粘膜或皮膚微傷處侵入體內。潛伏期約兩三天，初于侵入處生丘疹，繼則化膿成為潰瘍，邊緣不齊，周圍有紅暈，潰瘍處用手觸之，感覺柔軟，因之叫作軟性下疳。

潰瘍普通只一個，但有時也有許多一并齊發，或生後發現潰瘍，且能蔓延達于周圍，向下達于真皮，其形狀不一，有的成圓形或長圓形，大小亦不一致。

此病對於患者，有時發生痛苦，有時則毫不覺痛。再普通在患者於排尿時，微感痛覺及灼熱。

軟性下疳所生的部位，女子多在尿道外口，子宮外口、陰唇等部，男子多在龜頭，尿道外口，陰囊，或冠狀溝，此外如肛門周圍，陰部附近，陰阜，會陰，亦常有之，其他如手指，唇，舌，及身體各部，都有傳染的可能。既經染過的患者，雖不甚痛苦，但該病於治愈後，常留瘢痕，而發生障礙，甚而男女生殖器部，陷壞疽的狀態，結果女子不能受孕，男子造精器官失却作用，這也是很危險的。

本篇蒙吾師

李賦京博士代爲改誤敬附一言以謝

可怕的性病

史延祚

中華民國二十六年五月

可怕的性病

在繁華都布，性病的流行，比較普通。性病即一般所謂花柳病，其爲害比較甚大，非但可以危害本人，並且也可以遺傳到後代，這是多麼危險呵！因此我們不能不去研究他發生的原因及他爲害的情形。

性病可分爲三種，一曰白濁，一曰梅毒，一曰軟性下疳，茲分述於後：

(一) 白濁就是普通所謂淋病 (Gonorrhoe) 其病原菌是一種雙球菌，曰淋球菌。(Gonococcus) 係藉兩性性交而互相感染，感染之後，一天或三天，尿道外口即現燒灼，由此蔓延達於尿道前部，不斷的向外排泄白色的濃液，因其色濁，故有白濁之稱。從此不久，淋菌又可以順着尿道壁，移行達于尿道後部精囊輸出管輸入尿道之處，並且還可由精囊順着輸精管傳染到睪丸和副睪丸。睪丸和輸精管發炎之後，可以使排精之道閉塞，精液遂不能通過。此外攝護腺 (Prostate_a) 發炎後形成的瘢痕，也能阻礙精液的通過 而發生不生育之現像。白濁的膀胱化濃，在男子不若女子之多。在此種病變，其淋菌可藉輸尿管感染腎盂，而發生很嚴重腎盂及腎炎。

。白濁菌也可以侵入血管，順血道流入心臟，惹起心內膜炎（Endocarditis）可致死命，或移植到關節以內，而引起關節炎，等病變。婦女內部器官感染白濁之後，比較危險，而不易治療，子宮，卵巢及輸卵管發炎，其結果和男子一樣，也能發生不生產的惡果。淋菌由輸卵管也能感染到腹膜，發生腹膜炎（Peritonitis）其情形也很嚴重。

在婦女們，淋病也是一種很痛苦的病，婦女的陰道曲折不平，是隱藏淋菌的好地方。這淋菌遂由此向外，可以感染巴而脫林氏腺（Glandula Bartholini）向內又可以感染內部的諸生殖器官，如子宮，輸卵管，卵巢等是也。

淋菌也可以經直接的接觸，感染眼結膜，而發生極危險的結膜炎（Conjunctivitis）。對於這種危險的眼病，在初生兒避免的法子，就是當嬰兒初生出之時，用較濃的硝酸銀點眼，此種辦法，已普遍的實施於一切產科醫院，救了不少嬰兒。

白濁的確是男女不能生育的主要原因。據林次氏Lenz在德國統計的報告：『在一般男子不能生育的占百分之四十至五十，在女子占有百分之二十至二十五』。而在都市比這數目還要高些。又據白拉氏克氏 Blasko 的調查『男女因患此

病，對於國家，每年要有二十萬的生產損失』。沒有小孩的婦夫們，四分之一都是爲着患白濁而不受孕，而且患白濁的在上等階級尤占最多數，未來許多有天才的人材，竟因此不能出現，國家民族直接所受的害，是可想而知的。

(二) 梅毒 (Syphilis Lues) 梅毒的病原菌是一種螺旋菌 (Spirochaeta Pallida) 常于性交時感染之。感染之後，約四星期先于性器官病菌侵入之處，發生膿胞，由胞處生瘡，因其堅硬，所以我們叫他硬性下疳 (Ulcus durum)。除局部痛感以外，患者沒有旁的感覺。從此以後，病菌遂沿着恙巴道傳至鼠蹊腺 (Inguinaldruesen) 而發生腫脹，此即一般所謂無痛橫痃 (IndolenterBubo) 是也。梅毒由局部生瘡，以至鼠蹊淋巴腺腫，都還在第一步初發時期，(Primaere stdum)。在此期間，檢查血液，常爲陰性。不久，螺旋菌即侵入血管，順血行道散布全身，在此期間，檢查血液，則爲陽性，而此種現像，多發生於數月之後，梅毒病遂由初期入於次期 (Secundaere Stadium) 而皮膚上疹子的發生，乃是此期最重要的病症，雖然病人身上發疹子，病人並不覺得十分痛苦，他只覺着頭痛，和身上發熱，他對於他身上的病，毫不在意，而常忽視下去，但其內部的器管，都早已發生很嚴

重的變化。這時若就醫診治，則比較困難多矣。從此病遂入于潛伏時期，病人於不知不覺中，渡過次期，而入於第三期，(Tertiaerestadium)本期中病勢突然爆發，許多內臟和皮膚同時發生劇烈的炎症，和皮膠腫(Gumma abscess)等病變。

健康的身體，傳染梅毒後，在第一天或第一個月，若加以適當的治療，是可以完全滅絕的、治療愈早，治癒的希望愈大。

即在早期治療，吾人認為已完全治癒，但在事實上，于百分之二十中，仍還有復發的可能，這就是因為還有一部分梅毒菌，隱藏在體內，而未曾完全撲滅的原因。在這再發生的時期，梅毒菌可以使主動脈壁軟化，減少其彈力，而形成主動脈瘤(Aneurysma)。此瘤一方面可以壓迫其鄰近器官或組織。一方面因其血壓過高，可以破裂，而發生內出血的危險，同樣的在腦內，也能使腦動脈破裂，而發生中風(Apoplexie)等症。這種主動脈瘤和腦血管破裂，都是病人致死的原因。在復發性梅毒中，還有一種最普通的病，就是脊髓痨(Tabesdorsalis)病人起初常患不規則的腿痛和胃痛，末了發生麻痺(Paralyse)現象，由腿起始，漸延及膀胱大腸。

最後因呼吸肌的麻痺而致死亡。

在復發性梅毒很厲害的時候，往往發生各種精神病，如腦軟化，腦麻痺等，其顯而易見的病狀，就是言語障礙，面神經麻痺，眼障礙，癲狂等，病人就在此種精神異常之下，漸就死亡。

上述久後復發的梅毒，是不容易治療的，此種病人大都陷于死亡，即不死而其終身所受的痛苦，也是不能忍耐的。

患梅毒的夫婦，可以把梅毒經胎盤傳染到他的孩子身上，此種在子宮內被梅毒感染的胎兒，多半不到成熟就流產了，即不流產，而能正常的生出來，但因身患梅毒，往往也活不久，即不死，也都成為殘廢，不是癡人，便是癲狂，耳聾，口啞，目盲，飽受人間痛苦，於國家民族毫無益處。

我們應該特別注意的，就是梅毒在性病中，他的傳佈雖不若淋病之廣泛，但在病的本身上，他的傳染却是多方面的，如吃喝，接吻，或藉吸煙卷等，都有傳染的可能。

按林次氏Lenz的統計『這梅毒病的留毒，比較淋病還要高些，在大都會中，約有百分之四十到五十』自拉司克氏Blasko的報告：『柏林每年有百分之二，四，丹麥有百分之二，是梅毒患者，他們所得的比例數目，正相符合。』

(三)軟性下疳 (ulcus molle) 也是性病的一種，他的病原菌，是一種鏈狀桿菌，于性交時由粘膜或皮膚微傷處侵入體內。潛伏期約兩三天，初于侵入處生丘疹，繼則化膿成爲潰瘍，邊緣不齊，周圍有紅暈，潰瘍處用手觸之，感覺柔軟，因之叫作軟性下疳。

潰瘍普通只一個，但有時也有許多一并齊發，或生後發現潰瘍，且能蔓延達于周圍，向下達于真皮，其形狀不一，有的成圓形或長圓形，大小亦不一致。

此病對於患者，有時發生痛苦，有時則毫不覺痛，再普通在患者於排尿時，微感痛覺及灼熱。

軟性下疳所生的部位，女子多在尿道外口，子宮外口，陰唇等部，男子多在龜頭，尿道外口，陰囊，或冠狀溝，此外如肛門周圍，陰部附近，陰阜，會陰，亦常有之，其他如手指，唇，舌，及身體各部，都有傳染的可能。既經染過的患者，雖不甚痛苦，但該病於治愈後，常留瘢痕，而發生障礙，甚而男女生殖器部，陷壞疽的狀態，結果女子不能受孕，男子造精器官失却作用，這也是很危險的。

本篇蒙吾師

李賦京博士代爲改誤敬附一言以謝

