

足本丹溪心法

丹溪心法附餘卷之二十

婦人門上

經病九十二

○婦人經水過期血少也四物加參朮帶痰加南星半夏陳皮之類 經水不及期而來者血熱也

四物加黃連 過期紫黑有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連 過期淡色來者痰多也二陳

加川芎當歸 過期而來是血虛宜補血用四物加黃芪陳皮升麻 未及期先來乃是氣血俱熱

宜涼氣血柴胡黃芩當歸白芍生半夏附之屬 經不調而血水淡白宜補氣血參芪芎歸香附白

芍腹痛加膠珠艾葉玄胡索 經候過而作痛者乃虛中有熱所以作疼 經水將來作疼者血實

也氣滯四物加桃仁黃連香附 臨行時腰疼腹痛乃是鬱滯有瘀血宜四物加紅花桃仁義術玄

胡索香附朮香發熱加黃芩柴胡 紫色成塊者熱也四物加黃連柴胡之類 痰多占住血海地

位因而下多者目必漸昏肥人如此用南星蒼朮川芎香附作丸子服之 肥人不及數日而多痰

多血者虛有熱亦用前丸藥中更加黃連白朮丸服 血枯經閉者四物加桃仁紅花軀脂滿經閉

者以導痰湯加黃連川芎不可服地黃泥隔故也如用以薑汁炒 肥胖飲食過度之人而經水不

調者乃是淫痰宜蒼朮半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸臨經來時肚痛者四物湯加陳皮玄胡

索牡丹甘草痛甚者豆淋酒痛緩者童便芫花人炒條芩末為丸 經水去多不能住者以三補丸

加莎根龜板金毛狗春 陰虛經脉久不通小便澀身體疼痛四物加蒼朮牛膝陳皮生甘草又用

蒼朮丸加蒼耳酒芍藥為丸就煎前藥吞下入方 治經水過多

黃芩炒

白芍炒

龜板

炙各

黃柏

炒三

椿根

白皮

杜錢

香附子

半錢

右為末酒糊丸空心溫酒或白湯下五十九

又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子 一兩

黃連 半兩

吳茱萸 十粒

桃仁 五十個

紅麴 二錢

砂仁 三兩

麻祖木

右為末生薑汁化炊餅為丸梧子大服一百丸空心

又方 治一切瘀血為痛

香附 四兩

瓦礫子 二兩

煨一夜

桃仁 二兩

牡丹皮

大黃 蒸熟

當歸 各一兩

川芎

紅花 各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大空心溫酒下三五十丸

導痰湯

見痰類

三補丸

見補損

蒼莎丸

見咳嗽

附諸方

○月經不調

加減四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹疼痛

當歸

川芎

芍藥

熟苧 等分

右以水煎服加減於後

若經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脉微數本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半

分 經候過多本方去熟苧加生苧或只加黃芩白朮 經行身熱脉數頭昏本方加柴胡芩

經行數少或脹或痛四肢疼痛加延胡沒藥白芷與本方等淡醋湯調下末子 經候不調心腹

疼痛只用芎歸二味名君臣散 氣冲經脉故月事頻併臍下多痛加芍藥 經欲行臍腹絞痛

加玄胡枳郎苦練炒木香減半

經水澁少加葵花紅花 經水適來適斷或有往來寒熱先宜

服小柴胡湯後以四物和之 經後過而作痛血氣俱虛也宜本方對四君子湯服之

大溫經湯和劑方 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘵

血停留小腹急痛五心煩熱

阿膠碎炒 芎藭 當歸去芦 人參去芦 肉桂去皮 甘草炒 芍藥 牡丹皮各二

半夏二兩 吳茱萸洗七次 麥門冬去心 五

右咬咀每服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹和劑方 治婦人血海虛冷久無孕育及數墮胎一切經候不調崩中漏下積聚

諸症

秦艽二兩 京墨煨醋淬 人參去芦 石斛浸二兩 糯米炒一 川芎一兩 熟地黄酒

四 茯苓去皮 蒼朮粗皮 香附炒去毛 木香炒一 藁本去芦 當歸去芦 五 肉桂去粗皮 乾姜炮一 山藥半錢 澤蘭葉四兩 川椒去目 細辛去苗 一兩

桔梗炒二 桃仁去皮 大豆黃卷炒半 甘草炙二 蚕布燒灰 牡丹皮一兩半

右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子亦可

交加地黃丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生苾一斤 老生姜一斤 玄胡索 當歸 川芎 白芍藥各二兩 沒藥 木香各一

桃仁去皮 人參各半 香附子半斤

右將將地黃生薑各搗汁以生薑汁浸地黃祖地黃汁浸生薑祖皆以汁盡為度次將餘藥為末

共作一處日乾同為末醋糊丸如梧桐子大空心服五十丸姜湯下

內灸散和劑方 治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或疑積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭

眩皆治

足

婦人門

藿香葉 丁香皮 熟乾地黄洗焙 肉桂去皮各一兩半 甘草炙 當歸洗去 白朮 山藥

白芷各一兩 茴香一兩半 藁朮去芦 乾姜炮 川芎 黃芪去苗各一兩 木香一兩

陳皮四兩 白芍藥一兩

右為末每服三錢水一盞姜五片艾十葉同煎空心熱服溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生薑煎

活血散御藥院方治衝任經虛經事不調不以多少前後並皆治之

當歸 川芎 白芍藥 玄胡索各四兩 肉桂去皮一兩

右咬咀每四錢水一盞煎至七分食後熱服

溫經湯大全良方治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮 義朮各半兩 人參 甘草 牛膝各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸濟察方治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜治之

大香附砂盆擦去皮以米醋浸半日用瓦鍋慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧桐子日乾每服五十丸淡醋湯下一方香附子一斤艾葉四兩當歸二兩

製如前法治証一同名艾附丸

如聖丹聖惠方治婦人經脉不調赤白帶下

枯礬四兩 蛇床子二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裏放陰中用熱極再換

增損四物湯宣明方治月水不調心腹疼痛補血藏溫經注頗

川芎 芍藥 當歸 熟地黃 白朮 牡丹皮 各五錢 地骨皮 一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓通口服食前

丹參散大全良方治婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不下並治之兼治

冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參 法多小

右為末每服二錢酒調下經脉不調食前冷熱勞無時

桃仁散大全良方治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四肢虛翕不能飲食復中堅

痛不可行動月水或前或後或月水不來舉體沉重惟欲眠多思酸物

桃仁 甘草 半夏 各一兩 赤芍藥 生地黃 各二兩 澤蘭 牛膝 當歸 桂心

牡丹皮 人參 蒲黃 川芎 各一兩

右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至八分空心服

四製醋附子 喘竹堂方治婦人女子經候不調

香附子 去毛作四分

一分好酒浸七日 一分小便浸七日 一分鹽水浸七日 一分米醋浸七日 各焙

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十九空心食前鹽酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓

各一兩

○廣按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之

不瘳哉

本丹...
當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 熟羊 各半兩 牡丹皮 玄胡 各半 人參 黃芪 各半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九食前米湯送下

○廣按月信趨前為熱宜用涼藥以清熱退後為虛宜用溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此證便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

紅花當歸散 和劑方

治婦人血虛虛竭經候不調或斷續不來或積瘀塊腰腹痛肢體瘦弱

劉寄奴草 五兩

當歸 去芦

牛膝 酒浸各一兩

肉桂 去芦

紅花

白芷 各半

甘草 炙二兩

赤芍藥 一兩

紫葳 即凌霄花

蘇木 各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒調下

通經丸 濟生方

治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

川椒 炒去

蓬朮 炒去

乾漆 炒去

當歸 去芦

青皮 去白

乾姜 炒

大黃 炒

桃仁 炒

紅花

桂心 各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之丸如梧桐子陰乾每服五十九醋湯

溫酒空心下

千金桃仁煎簡易方治婦人血積癥瘕月水不行等疾

桃仁去皮尖 朴硝 大黃各二兩 蜜半兩

右和勻以酸醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大黃蜜末入內不住手攪度可圓時却下朴硝更不住攪良久出再丸如梧桐子五更初溫酒下五丸至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟇各樣以盡為度

六合湯和清方治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 白芍藥 官桂去皮 熟地黃酒洗 川芎 蓬朮炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服

凌花散濟衆方治婦人月水不行發熱腹脹

當歸酒浸 凌霄花 劉寄奴 官桂去皮 紅花酒浸俱煎藥 牡丹皮酒洗 川白芷

赤芍藥 延胡索各等分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熟服

玉燭散張子和方四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服四物湯見補損承氣湯見傷寒

三和湯張子和方四物湯涼膈散當歸各中停水煎服涼膈散見溫熱

一方 治室女月經不通

紫葳一兩 乾漆炒半 芍藥 蓬朮 當歸稍各半

右為末每服二錢空心酒調下

一方 療月經不通腹中痛

牛膝六錢 大黃 細辛 桃仁去皮尖雙仁五錢炒 川芎 當歸 水蛭三錢糯米炒

右為末糊蜜丸梧子大每服二十丸空心酒下

通經散聖惠方 治室女月水不通

雄鼠尿一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神效

導經丸聖惠方 治婦人經病不通臍腹連腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 甘草炒 官桂 桃仁炒一兩 大黃二兩 血竭二錢半

紅花小許 地膽二兩細切

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心溫酒下量虛實加減服之

溫經湯大全良方 若經道不行遠臍寒疝痛徹其脉沉緊此由寒氣客於血室血凝不行又為氣所

衝新氣與故血相搏所以作痛宜溫經湯及桂枝桃仁湯

當歸 川芎 芍藥 官桂 牡丹皮 蓬莪朮各半兩 人參 甘草 牛膝

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣食前溫服

桂枝桃仁湯大全良方

官桂 芍藥 生地黄各二兩 甘草一兩 桃仁去皮尖

右咬咀每服一兩姜三片棗子七枚水二盞煎至一盞去滓溫服

當歸散大全良方 治血脉不通

當歸 川山甲灰焙 蒲黃炒各五錢 辰砂一錢 麝香少許

右為末研停每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可

琥珀散經驗方 治心膈迷悶腹脹撮痛氣急痞塞月信不通等疾

烏藥二兩 當歸 蓬莪術各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生冷油膩等物產後諸疾用炒姜湯調下

萬病丸 拔萃方 治女人月經淋閉月候不來遠臍寒疝痛徹及產血氣不調腹中生瘕結而不散疾

乾漆枳碎炒令烟盡須 牛膝去苗酒浸一宿

右為細末生地黄汁一升入二味銀石器慢火熬候可丸如梧桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

通經散 楊氏方 治衝任下調經脉閉塞久而不通漸成堅瘦服尋常通經藥不効者正宜服之

班貓去翅 蜚蠊炒黑各 杜牛膝半兩

千金散 治經調不通

篇蓄 瞿麥各四錢 檳榔 麥蘖 小茴香各三錢 大黃錦文者

右為細末每服三錢臨臥溫酒調下

○經病疼痛

大烏金丸 治婦人三十六病思慮過度變生多疾孕育不成崩中帶下五心煩熱口苦咽乾飲食

無味身疼羸瘦面目痿黃手足酸軟經水不勻臍腹脹痛髮鬢黃落喜卧倦起產後惡血上行心

腹刺痛敗血不止及子宮一切惡疾

大艾葉 當歸醋炒 破故紙炒 茴香炒 熟地黄醋炒 南木香不見 吳茱萸 三稜

莪術醋炒 川芎醋炒 芍藥醋炒各 香附子六兩 延胡索一兩 紫荊皮四兩醋炒

右先將艾二兩香附子六兩米醋一升浸一日一夜冬月三晝夜煮乾炒令赤黑色入夜十二味同為末米醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽酒湯任下日二服如崩中下血

不止加棕灰一兩綿灰五錢蒲黃炒一兩百草霜七錢

玄胡索湯濟生方治婦人室女七情所感血氣相併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦但是一切血氣

經候不調皆治有效

當歸去芦

蒲黃

玄胡索

赤芍藥

片子姜黃

官桂各一兩

乳香

木香各三錢

甘草半錢

沒藥三錢

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散濟生方治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆攻心眩暈不省並皆治之

劉寄奴去梗

牡丹皮去木

熟地黃酒浸

玄胡索炒去

烏藥

赤芍藥

蓬莪朮

京三稜

當歸酒浸

官桂

各一兩

一方有菊花蒲黃炒去

烏藥

赤芍藥

蓬莪朮

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二

錢空心溫酒送下

三神丸濟生方治室女血氣相搏腹中刺痛經言不調

橘紅二兩

玄胡索法皮

當歸法各一兩

右為末酒煮米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心米醋湯下

當歸煎丸大全良方治婦人久積血氣發作刺痛肌瘦乏力月候不調

當歸三兩別

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索各一兩

右同當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子每服二十丸溫酒下

姜黃散大全良方治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

片姜黃四兩

蓬莪朮

紅花

官桂

川芎各一兩

玄胡索

牡丹皮

當歸各二兩

白芍藥三兩

右咬咀每服一兩水二盞酒少許煎至一盞去滓通口服食前

蠲痛散大全良方治婦人血氣刺痛

荔枝核燒存性五錢香附子炒一兩

右為末米飲調二錢食前服鹽湯亦可

牡丹散拔萃方治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川黃連炒各一兩 赤茯苓 生地黃 桃仁 當歸 官桂 赤芍藥 白朮

石膏去皮 木香各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓溫口食前服

牛膝散拔萃方治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝一兩 官桂 赤芍藥 桃仁 玄胡索 當歸 牡丹皮 川芎 木香各半兩

右為細末每服三錢溫酒調下食前

替灸丸秘方治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脉不通面色痿黃脚手疼痛四肢無力久無子息

此藥常服溫中暖臍調經有子服藥末盡即時有效

茯苓 艾葉各八分 香附子 當歸各四分 吳茱萸炒三兩 川芎 白芍藥各二兩

右用酸醋五升沙鍋煮藥乾為末醋糊丸如梧桐子每服五十九空心午前日二服用淡醋湯送

大延胡索散宣明方治婦人經病疼痛并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛平

心胃急痛尤宜服之

玄胡索 當歸 赤芍藥 京三稜煨 川練子去核 蓬朮煨 官桂去皮 厚朴製

木香 川芎錢半 桔梗 黃芩 大黃錢五 甘草一兩 檳榔二錢

右為末每服三錢水一盞煎六分去滓熱服食前日三服如惡物多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各五錢

延胡索散 大全良方治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索 當歸 川芎 官桂錢半 木香 枳殼 赤芍藥 桃仁錢五 熟地黃一兩

右咬咀每服八錢水一盞生薑三片煎至八分去滓通口食前服

當歸散 大全良方治婦人久積血氣痼痛小便刺痛四肢無力不能食

當歸 酒浸 赤芍藥 劉寄奴 沒藥 枳殼 玄胡索

失笑散 和劑方治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者

五靈脂 蒲黃各等分

右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎七分熱服

異方濟陰丹 秘方 治婦人內有血積經水不調腰腹疼痛

香附子 三稜 莪朮 陳皮去白 青皮 敗姜各一兩

右用黑豆半升醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘藥打糊

官桂 當歸 赤芍藥 白芍藥 生地黃 熟地黃 澤瀉 片姜黃 牡丹皮 乾姜

川芎 劉寄奴 澤蘭 人參 蒲黃紙炒 木香 白朮 玄胡索

右各一兩焙乾與前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸炒姜酒下艾醋湯亦得空心食前經事不行酒下心脾疼姜湯下或酒下

○經病發熱

逍遙散和劑方治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草酸半 當歸炷半 茯苓去皮 芍藥 白朮 柴胡去苗各

右咬咀每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎至七分溫服

人參荊芥散和劑方治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目眩煩渴盜汗或月水不調臍腹疼痛瘰癧塊硬等症

赤芍藥五兩 柴胡炷半七 牡丹皮五兩 荊芥穗 鱉甲醋浸去 羚羊角 酸棗仁

枳殼炷半 生乾地黄 人參去芦 白朮 肉桂去皮 防風去芦 當歸 芍藥

甘草各五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘時

油煎散和劑方治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澀

五加皮 牡丹皮 赤芍藥 當歸去芦各

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入前項藥同煎七分煎不得撻喫不得吹常服此

藥能肥婦人

滋血湯和劑方治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌體發熱疑為勞瘵宜以此藥滋

養通利

馬鞭草 荊芥穗各四 牡丹皮一兩 赤芍藥 枳殼炷半 肉桂去皮 當歸去芦

川芎各二兩

右咬咀每服四錢水一盞烏梅一個煎服以經調為度

牡丹散和劑方治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌體羸困漸成骨蒸並宜服之

桂心 牡丹皮 芍藥

延胡索炒

沒藥別研

陳皮去白各一兩

真蓬莪朮

鬼箭各三錢半

紅花

當歸去芦各二兩

乾漆炒半

蘇木半錢

甘草

烏藥各一

右以咀每服三錢水一盞煎七分不拘時

加味四物湯 治衝任虛損月水不行肥膚發熱如瘰癧狀

當歸

地黃 芍藥

川芎各一兩

柴胡半兩

黃芩二錢半

右以咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

茯苓補心湯濟寧方 治婦人去血過多虛勞發熱

四物湯一兩半參蘇飲三兩和勻生姜五片煎八分溫服

四物湯

見前

參蘇湯見胃寒

麥前散聖惠方 治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心胃煩壅

鱉甲醋炙

大黃煨

常山

赤茯苓

柴胡

白芍藥

當歸

乾漆炒烟

生地黃

石膏

各一兩

甘草半兩

右以咀每服一兩水一鍾小麥五十粒煎至半鍾去滓溫服食前有虛汗加麻黃根一兩治骨蒸

熱黃瘦口臭肌熱盜汗

黃芪散大金方 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不欲飲食

人參

黃芩

當歸各半

柴胡半兩

黃芪

地骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黃

赤芍藥各一兩

甘草二錢半

右以咀每服一兩水二鍾生姜五片煎至一鍾食前服

麥門冬散

大金方

治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬 前胡 赤茯苓各一 羚羊角 赤芍藥 桑白皮 黃芪各半 生地黃

甘草各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎一鍾通口服

犀角散拔萃方 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑 赤芍藥 地骨皮 紅花 甘草各五 柴胡 黃芪半兩 麥門冬 人參

枳殼 赤茯苓各半

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓通口服不拘時候一方有生地黃七錢半

地骨皮散大全良方 治婦人血風氣體虛發渴寒熱

柴胡 地骨皮各一 桑白皮 枳殼 前胡 黃芪各半 雪白茯苓 五加皮 人參

甘草 官桂 白芍藥各五

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至一鍾通口服

柴胡散大全良方 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 黃芪 赤茯苓 白朮各一 人參 地骨皮 枳殼製 生地黃 桔梗

桑白皮 赤芍藥各半 鰾甲二兩 麥門冬三兩 甘草

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至七分溫服

小柴胡湯大全良方 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故如瘧狀

柴胡八錢 半夏二錢 人參 甘草 黃芪 生地黃各三錢 麥門冬二錢

右咬咀每服八錢水一鍾姜五片棗二枚煎至八分去滓溫服

柴胡飲子宣明方治一切骨蒸積熱口乾煩燥寒熱往來肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芩 甘草 當歸 芍藥 大黃銍一 喘嗽者加半夏桔梗五味子銍五

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓溫服食後

柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱脉沉而芤

川芎 熟地黃 當歸 芍藥銍半 柴胡八錢 人參 黃芩 甘草 半夏銍各三錢

右每服一兩水一盞半生姜三片煎八分溫服

○廣按婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通之中有兼發熱者此分而為四也然四者之中若細推之不調之中有趨前者有退後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱也此又分而為八也大抵婦人經病內因憂思忿怒外因飲冷形寒何則人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱積不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也調其氣而破其血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱治之有道也歟抑嘗論之氣行血行氣止血止故治血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則凝結故治血病以熱藥為佐肉桂之類是也