

动物奥秘探索

DONGWU AOMI TANSUO


(四十)

DONGWUAOMITANSUO

吉林音像出版社
吉林文史出版社

动物奥秘探索

(40)



吉林音像出版社

吉林文史出版社

责任编辑:于泓

封面设计:绍然

动物奥秘探索

吉林音像出版社吉林文史出版社出版

三河德辉印务有限公司印刷

北京世纪千年书刊发行有限公司发行

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:206

字数:2,800 千字

2005 年 12 月第一版 2005 年 12 月第一次印刷

印数:1—5000 套

ISBN 7—80702—271—X/G·168


定价:592.00 元(全 40 册)



目
录

四声杜鹃	/1
红领绿鹦鹉	/3
斑尾鹃鸠	/6
蓝喉蜂虎	/8
绿翅金鸠	/10
三道眉草鹀	/11
褐河乌	/13
金腰燕	/14
棕头鹃鸠	/16
紫啸鸫	/19
(山)皇鸠	/21
冠鱼狗	/23
绿皇鸠	/25
紫林鸽	/28
暗绿绣眼鸟	/29
红翅凤头鹀	/31
黑天鹅	/33
厚嘴绿鸠	/34
山麻雀	/37
灰头绿鸠	/39





黄眉姬鹩	/ 41
红喉姬鹩	/ 43
黄脚绿鸠	/ 45
鸿雁	/ 47
领雀嘴鹩	/ 49
红顶绿鸠	/ 50
灰斑鸠	/ 52
西藏毛腿沙鸡	/ 53
扁嘴海雀	/ 55
家燕	/ 57
白鹡鸰	/ 59
乌鹩	/ 61
乌灰鹩	/ 63
大嘴乌鸦	/ 65
冠斑犀鸟	/ 67
双角犀鸟	/ 69
花冠皱盔犀鸟	/ 72
黑嘴鸥	/ 73
水鸫	/ 75
黑嘴端凤头燕鸥	/ 76
金眶鸻	/ 78



目
录

半蹼鹬	/80
灰头绿啄木鸟	/82
黑尾塍鹬	/84
松雀鹰	/86
中华攀雀	/90
白头鹎	/92
波斑鸫	/95
铜翅水雉	/98
鹊鹛	/100
草原鹛	/103
藏雀	/106
小鸫	/108
灰鹊鸫	/111
白喉斑秧鸡	/113
灰椋鸟	/114
棕背田鸡	/116
赤腹鹰	/118
凤头麦鸡	/121
小青脚鹬	/123
红腿斑秧鸡	/125
北红尾鹨	/126



目
录

蓝胸秧鸡	/128
大班啄木鸟	/130
苇鹀	/132
长耳鹑	/134
白头鹎	/135
林沙锥	/138
仙八色鸫	/139
灰翅噪鹛	/141
黑腹沙鸡	/142
震旦鸦雀	/144
红胁蓝尾鸲	/146
金色林鸲	/148
黄腹山雀	/150
栗斑腹鹀	/151
凤头潜鸭	/154



四声杜鹃

中文名：四声杜鹃

拉丁名：Cuculus micropterus

英文名：Indian Cuckoo

物种分类：脊索动物门→脊椎动物亚门→→
鸟纲→今鸟亚纲→→今颚总目→鹃形目→→杜鹃
科→→杜鹃属

分布范围：分布于欧亚大陆及非洲北部（包括整个欧洲、北回归线以北的非洲地区、阿拉伯半岛以及喜马拉雅山—横断山脉—岷山—秦岭—淮河以北的亚洲地区。），印度次大陆及中国的西南地区（包括印度、孟加拉、不丹、锡金、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫以及中国西藏的东南部地区等。），中南半岛和中国的东南沿海地区（包括缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国以及中国的东南沿海地区、香港、海南岛。），太平洋诸岛屿（包括中国的台湾省、东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛以及菲律宾、文莱、马来西亚、新加坡、印度尼西亚的苏门答腊、爪





哇岛以及巴布亚新几内亚。)

中国分布于东北至兰州以南各地，西至云南边境为夏侯鸟，在海南为留鸟。

动物简介：全长约 30cm。全身偏灰色，上体、两翼和尾褐色，喉至上胸谈灰色。尾羽具有宽黑色次端斑。下体自胸以下白色，密布黑色粗斑纹。雌鸟喉部和头顶均为褐色。

通常栖息于平原至低山的树林中，非常隐蔽，常只闻其声不见其鸟。食物以昆虫尤其以毛虫为主。叫声为响亮的四声 [ko—ko—ko—ko]，第三声音节略高，第四声音节最低。繁殖期 5~6 月，卵寄生于灰喜鹊、黑卷尾等雀形目鸟类巢中。卵一般为淡粉红色至白色，钝端有锈红色云状斑。



红领绿鹦鹉


中文名：红领绿鹦鹉

拉丁名：Psittacula krameri

英文名：Rose —
ringed Parakeet

物种分类：脊索动物
门→脊椎动物亚门→→鸟
纲→今鸟亚纲→→今颚总
目→鹦鹉形目→→鹦鹉科→
→鹦鹉属

分布范围：国外分布于非洲西部的沿海岛屿、塞内加尔、几内亚、埃塞俄比亚，往东一直到印度北部、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉国、缅甸、越南等地，共分化为 4 个亚种，中国仅有广东亚种，分布于福建福州市、广东珠海、万山群岛和附近沿海、香港和澳门一带。





保护级别：已被列为国家Ⅱ级重点保护动物；
《中国濒危动物红皮书·鸟类》列为未定种；
CITES1995年列入附录Ⅱ

动物简介：红领绿鹦鹉又叫粉红领鹦鹉，为中型鸟类体长38~42厘米，体重108克左右。雄鸟头部为辉绿色，与我国所产的其他鹦鹉均不同。在颈部的两侧和耳羽的后面逐渐变为淡蓝色。嘴的基部有一个窄的黑线，沿眼先向后延伸至眼睛。颊部、喉部为黑色，并向后和颈的两侧延伸，与后颈向下的一个狭形玫瑰红色颈环在颈侧相连接，也是它独有的特征之一。上体为辉草绿色，邻近玫瑰红色颈环处为蓝色，腰部和尾上覆羽特别辉亮，尾羽逐渐变长，中央尾羽最长，颜色为蓝绿色，基部较绿，具窄的黄色尖端，外侧尾羽越向外绿色越浓。翅膀为绿色，翅上的小覆羽和中覆羽略沾蓝色，大覆羽及飞羽为暗绿色。下体较淡，较背部呈更多的灰绿色，肛周、覆腿羽、翅下覆羽和腋羽为淡黄色。雌鸟的颊部、喉部没有黑色，头上没有黑纹和玫瑰红色的领环，尾羽较短，其余羽色与雄鸟相似。虹膜淡黄色，嘴珊瑚红色，脚和趾石板灰色或石板绿色。

红领绿鹦鹉为留鸟，主要栖息于山麓开阔的疏林地帯以及村庄、农田和乡镇庭园等地区。常



成群活动，有时与灰喜鹊、八哥、鸦类等在一起活动。叫声嘈杂，特别是早晨和傍晚，常常发出“嘎—嘎—”的连续叫声。飞行快而有力，有时飞得很高，然后又突然降落到树上。主要以榕果、木棉等植物果实与种子为食，也吃谷物和其他灌木浆果。

繁殖期为2~4月，少数早至1月即开始繁殖。求偶时两翅半张，头不时地从一侧向另一侧转动，尤以雄鸟为甚。通常营巢于天然的树洞或啄木鸟废弃的巢洞中，有时也自己啄洞筑巢，或者在旧的建筑物和墙壁洞中营巢。每窝产卵4~6枚。卵的形状为卵圆形，颜色为白色，大小为 $28\sim34\times 23\sim26$ 毫米。雄鸟和雌鸟轮流孵卵，孵化期22~24天。雏鸟晚成性，大约经过40多天的喂养即可飞翔。

中国分布的红领绿鹦鹉是大约在1900年时由外地引入香港的笼养鸟类不断逃入野外，逐渐在野外形成了野生种群，在香港等地较为普遍，有时可见到70只以上的大群。



斑尾鹃鸠

中文名：斑尾鹃鸠

拉丁名：Macropygia unchall

英文名：Bar-tailed Cuckoo Dove

物种分类：脊索动物门→脊椎动物亚门→→
鸟纲→今鸟亚纲→→今颚总目→鸽形目→→→鸠
鸽科→→鹃鸠属



分布范围：国
外分布于缅甸北
部、越南、老挝、
柬埔寨、马来西
亚、苏门答腊和爪

哇、克什米尔、印度东北部、尼泊尔、不丹、孟加拉国、中南半岛等地。中国为四川西部宝兴夏候鸟；云南西部盈江、沧源和南部勐腊、文山等地及福建西北部、广东及海，共分化为 3 个亚种，中国有 2 个亚种，华南亚种分布于福建、广东和海南，偶见于上海；西南亚种分布于四川和云南。

保护级别：《中国濒危动物红皮书·鸟类》列



为稀有种

动物简介：斑尾鹃鸠与其他鸠鸽类的区别在于尾呈凸尾形而较翅上。全长约 37~38cm，体重 160~230g。雄性成鸟前额和头侧呈沾灰的粉红色，头顶、后颈至上背呈红铜色，并闪耀翠绿色金属光彩；背和翅上覆羽及中央尾羽表面满布暗棕红色与黑色相间的横斑；飞羽纯黑褐色；颞、喉淡皮黄色；胸部亦呈红铜色，并散布少许黑色横纹；腹部至尾下覆羽呈皮黄色；外侧尾羽青灰色，次端和基部渲染黑褐色。雌鸟胸、腹部和尾下覆羽满布淡皮黄色与黑色相间的横，余部与雄鸟相似。虹膜粉红色，嘴黑色，脚紫红色，爪角褐色。尾羽较鸽类为长。

斑尾鹃鸠栖息于海拔 1800m 以下的热带雨林中，冬季也常出现于低丘陵和山脚平原地带的耕地和农田。通常成对活动，偶尔单只，很少成 10 多只结小群活动。行动从容，遇到危险时总要停留片刻才起飞。叫声低沉。主要以榕树的果实及野樱桃等果实和其他植物的浆果、种子、草子等为食，有时也吃稻谷等农作物。

繁殖期为 5~8 月，成对营巢于茂密的森林中，有时也在竹林中营巢。通常置巢于树枝上或竹枝上，以纤细的枯枝条和草搭成浅盘状巢，巢





甚简陋。每窝产卵 1 枚。偶尔 2 枚，卵的大小为 $30 \sim 38 \times 20 \sim 28 \text{mm}$ ；雌雄鸟孵卵育雏。

斑尾鹃鸠在云南西部和南部热带地区，历来尾珍稀种类，种群数量稀少，仅偶尔见到。约估计每百平方公里面积内，数量不足 1 只。繁殖力较低及乱捕滥猎，致使种群数量日趋减少。目前仅在边远偏僻的热带山区，偶尔尚可获见。



蓝喉蜂虎

中文名：蓝喉蜂虎

拉丁名：Merops viridis

英文名：Blue

—throated Bee Eater;
Blue — throated
Bee — eater

物种分类：脊
索动物门→脊椎动
物亚门→→鸟纲→
今鸟亚纲→→今颚
总目→佛法僧目→





→蜂虎科→→蜂虎属

分布范围：中国南部、东南亚、大巽他群岛及菲律宾。指名亚种为夏季繁殖于中国湖北及长江以南的不常见鸟。在海南岛为留鸟。

动物简介：别名红头吃蜂鸟。

中等体型（28 厘米，包括延长的中央尾羽）的偏蓝色蜂虎。成鸟：头顶及上背巧克力色，过眼线黑色，翼蓝绿色，腰及长尾浅蓝，下体浅绿，以蓝喉为特征。亚成鸟尾羽无延长，头及上背绿色。

虹膜—红色或褐色；嘴—黑色；脚—灰色或褐色。

叫声：飞行时发出 kerik, kerik, kerik 的快速颤音。

喜近海低洼处的开阔原野及林地。繁殖期群鸟聚于多沙地带。较蓝喉蜂虎少飞行或滑翔，宁呆在栖木上等待过往昆虫。偶从水面或地面拾食昆虫。





绿翅金鸠

中文名：绿翅金鸠

拉丁名：Chalcophaps indica

英文名：Emerald Dove

物种分类：脊索动物门→脊椎动物亚门→→
鸟纲→今鸟亚纲→→今颚总目→鸽形目→→→鸠
鸽科→→金鸠属



分布范围：中
国分布于云南西南
部、南部西双版纳
及东南部，广西、
广东沿海及海南、

台湾等省留鸟。国外分布于印度、缅甸、越南、菲
律宾及印度尼西亚等。

保护级别：《中国濒危动物红皮书·鸟类》中
列为易危种

动物简介：别名绿背金鸠。

全长约 23cm。头顶至枕后蓝灰褐色；额和眉
部白色；背、翅上羽和内侧飞羽金绿色；腰、尾