

西医学习中医試用教材

中药方剂学补充讲义

（内部使用）

陝西中医学院教育革命小組編

目 录

中草葯的一般知識.....	1	3. 牛筋条.....	12
一、怎样認葯.....	1	4. 支柱蓼.....	13
二、怎样采葯.....	2	5. 石榴花.....	14
三、草葯的性味功能.....	3	6. 二色补血草.....	14
四、草葯四大反常用中草葯.....	3	7. 铺地锦.....	15
一、抗菌葯.....		附方：止血方.....	16
1. 朱砂莲.....	3	1. 止血方一.....	16
2. 蜈蚣七.....	5	2. 止血方二.....	16
3. 秤杆七.....	6	3. 止血方三.....	17
4. 八角莲.....	7	4. 止血方四.....	17
5. 虎耳草.....	8	三、止痛葯.....	17
6. 鱼腥草.....	9	1. 铁牛七.....	17
7. 青牛胆.....	9	2. 金牛七.....	19
二、止血葯.....	10	3. 桃儿七.....	20
1. 人血七.....	10	4. 长春七.....	21
2. 见血飞.....	11	5. 祖师麻.....	22
		6. 太白米.....	23
		附方：止痛方.....	24
		1. 铁金牛止痛片.....	24
		2. 铁桃止痛片.....	24
		3. 太朱飞止痛片.....	24

四、接骨药.....25

1. 榑木根皮.....25

2. 蝇子草.....26

3. 过山龙.....26

4. 泡桐根皮.....27

5. 楸树皮.....27

6. 柳树根皮.....28

7. 六股筋.....29

8. 八角茴.....29

附方：接骨方.....30

1. 红飞天接骨膏.....30

2. 六八接骨散.....30

3. 藜芦接骨方.....31

4. 旬阳张河卫生所

接骨方.....31

5. 凤县接骨方.....33

五、其他.....33

1. 土贝母.....33

2. 七叶一支花.....34

3. 藤梨根.....35

4. 小救驾.....36

附：治癌方.....37

治癌方一.....37

治癌方二.....37

治癌方三.....37

治癌方四.....38

草药的一般知识

一、怎样認药

我省南有秦、巴山地，北有子午岭、黄龙山梢林区，自然条件优越，植物种类极多，俗话说：“秦地无闲草”，说明我省药源十分丰富。这样多的中草药，怎样识别呢？伟大领袖毛主席教导我们说：“世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。”只要我们认真的学，反复的认，中草药的识别也是不难掌握的。要掌握中草药，必须作到以下五点，即：一问，二看，三摸，四闻，五尝。

一问：毛主席教导我们：“**最聪明，最有才能的，是最有实践经验的战士。**”有些老草医，老药农，由于他们具有丰富的实践知识，往往只看到根或叶，就能准确地认出是什么药。我们必须拜他们为师，跟他们老老实实在地学。

二看：就是群众所说的“破苗”或“过苗”。这是认识中草药的开始，要细致地观察植物的全貌，掌握其根、茎、叶、花、果的特点，才能准确地识别各种药物。

三摸：是用手触摸、揉捻的办法来观察植物。触摸植物表面是粗糙还是光滑，揉捻时有无汁液流出，这些汁液的性状和颜色怎样，如牛筋条粘性很大，人血七根部有红色汁液。

四闻：揉碎叶子，剥开花果，撕开根皮，用鼻子闻一闻不同植物的气味，如小救驾具有浓烈的香味；鱼腥草有鱼腥气味等。

五尝：用嘴尝药，来鉴别草药的性味。如朱砂莲具苦涩味，太白米有麻辣味等。在尝药时，注意勿咽入腹内，以免中毒，若有麻味使人舌向后缩者，一般多是有毒之品，要慎重。

二、怎样采药

毛主席教导我们要“自力更生，艰苦奋斗，破除迷信，解放思想。”我们要用中草药防病治病，就应当自己动手，就地取材，采药的过程就是实践的过程，通过采药既锻炼了思想，又给国家和人民增加了财富。

1、掌握采药季节：药用植物，因为采集季节不同，治疗效果差异很大，我们必须根据药用部分的特性掌握采挖季节，以便使药物很好地发挥作用。

一般地说，采药季节应在药用部分所含有效成分最充沛时进行。如根和根茎在秋末、春初时采集；花类宜于含苞待放时采收；茎、叶、全草应在花朵初开、植物生长的全盛期采收。树皮在春夏之交采剥。果实在初成熟或未完全老熟时采摘，种子及核仁，应在完全成熟期采取；花粉在花期采。

2、掌握药物的生长环境：药用植物的生长与地势、土壤、气候等地理环境有非常密切的关系。如蜈蚣七多生于山谷水旁阴湿之处；朱砂莲多生于山区的沟边、滩地及乱石堆中；铁牛七多生于2500公尺以上的高山上。

三、草葯的性味功能

一般的说，草葯的性味功能和中药在原则上是一致的，但也有些草医有他们的独特见解，如镇坪县有这样的葯性功能歌：

涩长肉，酸提毒，苦退火，辣燥热，麻除风，甜的温性带补，淡的破血通经，辛味通关走气、行气活血，辣麻夹口杀人葯。

四、草葯四大反

金牛银牛怕热物，铁牛最怕甜酒服，芋七莫见枇杷叶，手参太参反藜芦。

常用中草药

一、抗菌葯

1. 朱砂莲

〔别名〕 朱砂七，猴血七，血三七。

〔基源〕 为蓼科蓼属植物朱砂莲。多年生草本。块根肥大与何首乌相似，不甚正齐，外皮深褐色，鲜根断面呈桔红或粉红色，具朱砂点，故名“朱砂七”。

干品呈黄色，嚼之唾液成桔红色，以手搓揉



手指也染成桔红色。茎缠绕，长3—4米，多分枝，中空，节明显，具褐色膜质鞘，基部木质化。单叶互生，长卵形或椭圆形，边缘有疏锯齿状齿，基部心脏形或近心形，先端锐尖，叶柄长0.5—4.5厘米。圆锥花序顶生或腋生，花小，白色或粉红色。瘦果三角形，黑紫色光亮。多生于山区的沟边，滩地及乱石堆中，主产于陕南巴山，秦岭，太白地区，长安亦有分布。药用块根，四季可采，除去泥土及毛根，晒干备用或鲜用。

〔性味〕 苦微涩平（偏凉）。

〔功效〕 清热抗菌，解痉止痛，止血止泻。

〔主治〕 菌痢，肺炎，胆道蛔虫症，胃肠炎，胃腹痛，溃疡病，顽固性呃逆，扁桃体炎，跌打损伤，外伤感染，疖痈，蜂窝织炎等，对泌尿系感染也有一定的疗效。

〔用法〕 0.5—3钱，水煎服。如用散剂或片剂，每次服2克，日3—4次。外用可配成20—30%凡士林软膏，或1%水溶液冲洗伤口。

本药副作用不大，少数病人可能出现轻度腹胀，恶心，或发生不易入睡或嗜睡现象；用量较大有时头痛，一般不需特殊处理，停药后上述反应多可自行消失。

〔附注〕 据初步实验，朱砂莲对葡萄球菌，链球菌，肺炎球菌，伤寒杆菌，副伤寒杆菌，痢疾杆菌等均有抑菌作用，对绿脓杆菌和大肠杆菌的部份菌株亦有抑菌效果。又朱砂莲之水浸液能使心脏收缩加强，对平滑肌有抑制作用。

2. 蜈蚣七

〔别名〕 中华抱茎蓼，鸡血七，倒生莲，鸡心七。

〔基源〕 为蓼科蓼属植物蜈蚣七。。多年生草本。高30—60厘米，根茎紫褐色，断面淡紫红色，圆柱形，或多呈稀念珠状，长10—20厘米，形似蜈蚣，故名“蜈蚣七”。茎平铺倾斜，节明显，纤细，上部分枝，枝端于秋季产生球状根茎，行无性繁殖，故名“倒生莲”。单叶互生，基生叶及下部基生叶具长柄，叶心状卵形或椭圆状心卵形。托叶鞘膜质，褐色，管状，长可近五厘米，易破裂。上部基生叶卵状披针形，圆锥花序顶生或腋生，花白色或红色，果实三角形，褐色，具光泽。多生于山谷，水边，沙地及林下阴湿处。主产秦岭，巴山地区，长安县山区亦有分布。药用其根，四季可采，去粗皮，鲜用或干用。

〔性味〕 涩微苦平，有小毒。

〔功效〕 抗菌消炎，止血止痛，收敛止泻，行气活血。

〔主治〕 菌痢，肺炎，败血症，肠胃炎，外伤出血，泌尿系感染，跌打损伤及劳伤等。

〔用法〕 1—2钱，水煎服。若用散剂或片剂，每次2克，日3—4次。

本药反鸡冠花、钩藤。少数病人服药后出现同朱砂莲一样的副作用，如腹胀，恶心，一般不需特殊处理，停药后即可消失。

〔附注〕 据初步试验，蜈蚣七对葡萄球菌，链球菌，肺炎球菌，伤寒杆菌，副伤寒杆菌，痢疾杆菌等均有抗菌作用，对绿脓杆菌的部分菌株亦有抗菌效果。本药的抗菌作用尚胜于朱砂莲。

3. 秤杆七

〔别名〕 天蓬伞，老蛇盘，索骨丹，黄药子，红药子，红苕七，红骡子，猪尿筒，猪尿筒七，宝剑叶，老汉求。

〔基源〕 为虎耳草科植物黄药子的根茎。多年生草本。根茎粗壮，扁圆形或圆锥形，大小视生长年令而异，肉质，外皮暗褐色，有横皱及不明显的纵皱，具少数鳞片及多数须根，鲜根断面呈粉红色或白色，茎直立，棕黄色，无毛。叶为掌状复叶，三出或五出，小叶长卵形或倒卵形，先端尖，基部楔形，边缘有锯齿，夏日茎顶开白色小花，排列成大形复圆锥花序，蒴果。多生于山坡阴湿的草丛中，主产于陕南山区，太白，洛南，长安县山区一带。药用根茎。秋季采收，洗净泥土，除去须根，切片晒干备用。

〔性味〕 苦涩寒。

〔功效〕 抗菌消炎，去腐生肌，活血止血，收敛止泻。

〔主治〕 红白痢疾、疖肿疮毒，外伤出血，吐血咯血，崩漏，脱肛及子宫脱垂（秤杆七用醋磨调敷局部）。

〔用法〕 每用1.5—3钱，水煎服。外用适

量。

〔附注〕 据初步实验，本药有一定的抑菌作用。

4. 八角莲

〔别名〕 一碗水，铁窝盖，鬼白，八角盘，独叶一支花。

〔基源〕 为小蘗科鬼白属植物八角莲。多年生草本。根茎为粗壮的结节块状，黄褐色，根须状。茎密被白色柔毛。叶一片，生于茎的顶端，叶片盾形，叶缘有6—8个角，并有刺状疏锯齿，下面密被柔毛。5—6月开花，单生或5—8朵，生于一短梗上，梗自近叶片处抽出，花为紫红色。浆果卵圆形，黑色，果期9—10月。生于高山的深谷或湿润草丛中。药用根，四季可采，晒干备用。

〔性味〕 苦微辛平，有毒。

〔功效〕 清热解毒，行气活血止痛。

〔主治〕 淋巴结核，腮腺炎、痈疖，毒蛇咬伤，跌打损伤（八角莲片同甜酒好醋各半拌匀，炒干，研细，每服五分，日两次，白糖水送下）。劳伤，胃痛（八角莲，蚤休各等分，研细，每服八分至一钱，日二次，温开水送下）。

〔用法〕 2—3钱，水煎服，外用适量。

〔附注〕 镇坪民间用此药加其他“七”药泡酒治劳伤，因能行气活血止痛，故有“打的骨头碎，要吃一碗水”的传说。

5. 虎耳草

〔别名〕 石荷叶，
金线莲，金线吊芙蓉、金线
吊梅。

〔基源〕 为虎耳草
科虎耳草属植物虎耳草。
多年生常绿草本。须状根多
而纤细，茎枝红紫色。叶根
生，圆形或肾形，肉质肥
厚，叶缘浅裂状，每一裂片
有疏生尖锐锯齿，叶面及叶



柄均被灰白色或浅红紫色粗长毛。夏秋间，自叶丛中抽出花梗，均着红紫色长毛，开白色花。结蒴果，卵圆形。喜生于山谷、溪边、林下阴湿的石隙中。药用茎叶，四季可采。

〔性味〕 微苦辛寒，有小毒。

〔功效〕 清热解毒，止血。

〔主治〕 化脓性中耳炎（鲜虎耳草捣烂，绞取自然汁滴耳中）；皮肤风疹瘙痒（鲜虎耳草捣烂，用纱布包裹，擦患处）；外伤出血，疖肿，脓肿（用鲜品捣烂外敷）。

〔用法〕 2—3钱，水煎服。

6. 魚腥草



〔别名〕 狗子耳，狗贴耳，野花麦，葇菜，臭菜。

〔基源〕 为三白草科葇菜属植物葇菜。多年生草本。全草有特殊鱼腥臭味。茎下部匍匐地下，上部直立。叶心脏形，全缘，有托叶，基部抱节。夏季梢上分枝，枝顶有穗，单叶对

生，穗上开浅绿色细花，穗下有白色总苞四片。结蒴果。多生于溇边，沟边潮湿处。药用全草，夏秋采集。

〔性味〕 酸辛微寒。

〔功效〕 清热解毒，利水。

〔主治〕 乳腺炎，蜂窝织炎，中耳炎，荨麻疹（用鲜品擦之），高血压，尿路感染，肾炎水肿，急性慢性肠炎，红白痢疾，内疝等。

〔用法〕 干品5钱至1两，鲜品2—4两，水煎服。疮疖肿毒等可用鲜品捣烂外敷。

7. 青牛胆

〔别名〕 地苦胆，金果榄，金古杭，金狗胆，三石菇，九牛胆，钢称锤，破石珠。

〔基源〕 为防己科金果榄属植物青牛胆。多年生

缠绕藤本。根深长可达1.5米，块根球形，椭圆形或肾形，常5——9个结连成串，表面黄白色，内面白色，味苦，茎细长，节上被短硬毛，单叶互生，有柄，叶片卵状披针形或箭形，先端尖或钝，基部箭形或戟状箭形，全缘。花单性，雌雄异株，雄花多数，集成总状花序，雌花4——10朵，亦集成总状花序，核果形似橄榄，成熟时红色，种子肾形，花期3——5月，果期8—10月。生于山坡灌木林下，主产于陕南宁强，长安县山区亦有分布。药用块根，秋季采挖，洗净，晒干切片备用。

〔性味〕 苦寒。

〔功效〕 清热解毒，消肿止痛。

〔主治〕 各种炎症，如急慢性扁桃体炎，咽喉炎，口腔炎，乳腺炎，腮腺炎，淋巴结炎，急性菌痢，肠胃炎，阑尾炎，疔疮以及扭伤，局部红肿等，还可治胃痛，溃疡病。

〔用法〕 (1) 内服：一般每日三次，每次2—3钱，用开水泡服。

治胃痛及溃疡病：将青牛胆切片晒干，研细末，每次一钱，每日二次（儿童减半），服药期间，忌食生冷，枯燥、酸辣等食物。

(2) 外敷：研末外用，量不拘多少。

二、止血药

1. 人血七

〔别名〕 金罌粟，野人血草。

〔基源〕 为罂粟科白屈菜属植物金罂粟。多年生草本。根块状。茎被褐色卷曲柔毛，体具红色液汁。叶柔软，倒卵状长圆形，琴式羽状深裂，裂片4—7对生，下部裂片近镰刀形，茎生叶2—3片，顶部2片对生，为节间所隔。花黄色，4—5朵簇生，蒴果狭细柱形，被柔毛。种子卵形，具鸡冠状附属物。生于高山林下阴湿处。产于陕南巴山一带。药用全草，四季可采，晒干备用。

〔性味〕 辛涩平。

〔功效〕 止血，活血调经，舒筋。

〔主治〕 外伤出血，跌打损伤，月经不调。

〔用法〕 1—2钱，水煎服。外用适量。

〔附注〕 曾作动物试验，止血效果良好。



2. 见血飞

〔别名〕 飞龙掌血，血见飞，大救驾，见血散，三百棒，破皮走血。

〔基源〕 系芸香科飞龙掌血属植物飞龙掌血。常绿藤状有刺灌木。根淡黄色，味辛辣，割皮表面即呈现血红色。茎具明显的皮孔及刺，叶互生，三叶复出，卵状披针形，先端

渐尖，基部狭楔形，边缘有波状细齿。10—12月开绿白色。

小花，单性，聚繖花序，顶生或腋生。浆果球形，如豌豆大小，熟时橙红色，生于山坡林缘，路旁或灌木丛中。产于太白山南部及安康地区。药用根皮及茎皮。全年可采，剥取根皮及茎皮，洗净，阴干或晒干备用。

〔性味〕 辛甘微苦温，有小毒。

〔功效〕 止血止痛，活血祛瘀。

〔主治〕 外伤出血，吐血，胃痛，风湿痹痛，外伤作痛，肋间神经痛，疖肿疮毒。

〔用法〕 4—6钱（皮），2—3钱（根），水煎服。散剂片剂酌减，也可泡酒服治劳伤。外用适量。孕妇禁用。

〔附注〕 陕南草医将本品列为接骨要药。

3. 牛筋条

〔别名〕 山胡椒，铁箍散，雷公树，假死树，洗手叶。

〔基源〕 为樟科植物。半常绿灌木或小乔木，高3—6米。树皮灰白色而平滑，幼枝初生有毛，后即脱落呈灰褐色。叶互生，长椭圆形至倒卵形，先端短尖，基部阔楔形，表面深绿色，有光泽，背面灰绿色，嫩时被短毛。雌雄异株，花黄绿色，单性。核果球形，紫色，似豌豆。多生于灌木丛中及荒坡草地。分布于秦、巴山地。药用叶及树杆，四季可采。

〔性味〕 苦寒。

〔功效〕 止血，收敛，祛风，消肿。

〔主治〕 其叶治外伤出血，风湿麻木，筋骨疼

痛，跌打损伤。树杆烧灰治疗烧伤（用香油调敷）。

〔用法〕 本药粘性很大，故常作为外用药的赋形剂，以外用为主。



4. 支柱蓼

〔别名〕 赶山鞭，九节梨，红三七，大红粉，蝎子七，九节棒，伞墩七。

〔基源〕 为蓼科蓼属植物支柱蓼。多年生草本。高20—40厘米。根茎肥厚，略弯曲，暗棕色或黑棕色，长2寸许，有环状节及疣状突，节处生有须根。断面粉红色或白色，粉质。茎细长，圆柱形。基生叶广卵

形，膜质，全缘，具长柄；茎生叶较小，叶鞘狭披针形，红褐色。七月开淡红色小花，花顶生或腋生，呈圆锥穗状花序。瘦果，三棱形（似荞麦）生长于高山阴湿地带。关中，陕南，太白山区均有分布。药用根茎。7—8月采挖。洗净，晒干，备用。

〔性味〕 苦涩平（偏凉）。

〔功效〕 止血止痛，活血调经，去腐生肌。

〔主治〕 外伤出血，刀伤，跌打损伤，劳伤月经不凋，血崩。麟游用本品水煎服治大骨节病，疗效颇佳。太白用此药治泄泻，红白痢疾，白带。

〔用法〕 3—6钱，水煎服。外用适量。

5. 石榴花

〔基源〕 为安石榴科安石榴属植物。落叶灌木或小乔木。多栽培。我省各地多有。药用花、果皮及根皮。夏秋可采，晒干备用。

〔性味〕 酸涩温。

〔功效〕 止血，涩肠。

〔主治〕 外伤出血，泻痢，滑精，便血，脱肛，血崩，带下，中耳炎（石榴花焙干研细，加冰片少许，吹耳内）。《中国经济植物志》载：“果皮为肠收敛剂，治慢性下痢及肠痔出血等，根皮有驱绦虫、蛔虫作用。果实煎汁可作扁桃腺炎、咽喉、口腔炎的含漱料”。可参考。

〔用法〕 皮多内服，每次2—3钱，水煎服。花多晒干研细末用于止血。

6. 二色补血草

〔别名〕 辽矾松，盐云草，扫帚草，匙叶草，黄狗窠窠。

〔基源〕 为矾松科补血草属植物二色补血草。多年生草本。高20—50厘米，茎数条丛生，直立或倾斜，上部有开散之分枝，绿色，平滑，不具叶，叶多数丛生于基部，铺散，匙形，先端圆，基部渐狭延伸成细长具翅之叶柄。花无梗，生于花序分枝之先端而位于一侧，数个集成一组形似禾本科植物之小穗。萼片为干膜质白色，花瓣白色，不落。果实长园形，有五棱，多生于道旁、沟岸，田边及