

濟陰綱目

上海錦章書局
出版

濟陰綱目卷之五

吳興 金德生聞風父輯著

錢塘

查學淳用拙父訂正

西陵 汪 淇澹河子箋釋

天都

查 望于周父參閱

○積聚癥瘕

○論婦人諸積形狀

準繩云。大。全。良。方。分。症。癖。諸。氣。癥。瘕。八。癥。腹。中。痰。血。癥。痞。食。癥。血。癥。凡。七。門。症。者。在。腹。內。近。臍。左。右。各。有。一。條。筋。脈。急。痛。大。者。如。臂。次。者。如。指。因。氣。而。成。如。弦。之。狀。故。名。曰。症。癖。者。僻。在。兩。肋。之。間。有。時。而。痛。故。名。曰。癖。亦。者。痛。也。癥。者。假。也。其。積。聚。浮。假。而。痛。推。移。乃。動。也。八。癥。者。黃。癥。青。癥。燥。癥。血。癥。脂。癥。狐。癥。蛇。癥。蠶。癥。積。在。腹。內。或。腸。胃。之。間。與。臟。氣。結。搏。堅。牢。雖。推。之。不。移。名。曰。癥。言。其。病。形。可。徵。驗。也。氣。壅。塞。為。痞。言。其。氣。痞。塞。不。宣。暢。也。傷。食。成。塊。堅。而。不。移。名。曰。食。癥。痰。血。成。塊。堅。而。不。移。名。曰。血。癥。若。夫。腹。中。痰。血。則。積。而。未。堅。未。至。於。成。塊。者。也。大。抵。以。推。之。不。動。為。癥。推。之。動。為。瘕。也。至。夫。疝。與。症。癖。則。與。痛。俱。痛。即。現。不。痛。即。隱。在。臍。左。右。為。症。在。兩。肋。之。間。為。癖。在。小。腹。而。牽。引。腰。脇。為。疝。恐。學。者。一。時。難。了。未。免。淆。亂。故。總。叙。而。條。析。之。

○論婦人八癥所因

病源曰。八癥者。皆胞胎生產月水往來血脈精氣不調之所生也。腎為陰。主開閉左為胞門右為子戶。主定月水生。子之道。胞門子戶主于精神氣所出入合於中黃門。主門四邊主持開元。禁閉于精。臍下三十名曰關元。主臟魂。婦人之胞。三焦之府。常所從止。然婦人血脈經絡合調。則月水以時來至。故能生子。而無病。婦人榮衛經絡斷絕。不通。邪氣便得往來。入合於臟。若生血未盡。而合陰陽。即使婦人血脈壅急。小腹重急。支滿胸脇。腰背相引。四肢痠痛。飲食不調。腹中惡血不除。月水不時。或月前月後。因生積聚。如懷胎狀。邪氣相干者。令人恍惚多夢。寒熱四肢不欲動。陰中生氣。腫內生風。甚者小便不利。苦痛如淋狀。面目黃黑。歲月久。即不復生子也。

黃癥者。婦人月水始下。若新傷墮。血氣未止。卧寢未定。五臟六腑虛羸。精神不足。因向大風便利。陰陽開闔。關節四。逆。中于風濕。氣從下上入于腹中。稽留不去。名為陰虛。則生黃癥。黃癥之聚。令人苦四肢寒熱。身重淋露。卧不欲食。

外有胎孕有癥瘕。三症亦當與此條參看。按七門之中。最。八其氣或聚或散。症癖之與癥瘕。俱見不。諸則隱亦可與癖。三積又男子為。孤女為癥。則症與。亦有同經男與女。八也。居一機。二曰血。何也。在病氣之中。未。當無飲而血。食。之內。未嘗無。食血入。未有。氣而成。形病也。故消。積之中。當行氣消。痰消痰之藥。為是。

左脇下有氣結牢不可破抑若腰背相引痛小水不利令人不產小腹急下引陰中如刺不得小便或時寒熱下赤黃汁令人無子當刺關元氣衛行以毒藥瘕下即愈

青瘕者婦人新產未滿十日起行以洗浣太早陰陽虛玉門四邊皆解散子戶未安骨肉皆痛手臂不舉飲食未復內臟吸吸又當風卧不自隱蔽若居濕席令人苦寒洒洒入腹煩悶沉淖惡血不除結熱不得散則生青瘕聚在左右脇下藏于背脊上與肩解腰下攣急腹下有氣起喜噎不可多食四肢不欲動搖手足面目黃大小便難其後為之不通利或不復禁狀如崩中此自過所致令人少子療之當刺胃管行以毒藥有法瘕當下即愈

燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而以夏月熱行疾步若舉重移輕汗出交流氣血未平而卒以恚怒致腹中猥咽不洩經脈攣急內結不舒煩慙少力氣上達胸膈背脊小腹墮急月水與氣俱不通和而反以飲清快心月水橫流溢入他臟不去有熱則生燥瘕之聚大如半杯上下腹中苦痛連兩脇下上引心而煩害飲食欲嘔吐胸及腹中不得太息腰背重喜卧盜汗足疲削久立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便秘難病如此者其人少子療之以長鍼按而刺之法度行以毒藥瘕當下即愈

血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣盛溢入他臟若大飢寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下未足左右走腸胃之間留絡不去內有寒熱與月水會合為血瘕之聚令腰痛不可俯仰橫骨下有積氣牢如石小腹裏急苦痛背脊疼深達腰腹下攣陰裏苦生風冷子門僻月水不時乍來乍不來此病令人無子療之瘕當下即愈

脂瘕者婦人月水新來若生未滿三十日以合陰陽脈絡分胞門傷子戶失禁關節散五臟六腑津液流行陰道動百脈關樞四解外不見其形子精與血氣相連犯禁子精化不足成子則為脂瘕之聚令人支滿裏急痺引小腹重腰背如刺狀四肢不舉飲食不甘卧不安席左右走腹中切痛時瘕時甚或時少氣頭眩身體解散苦寒惡風勝脫脹月水乍來乍去不如常度大小便血不止如此者令人無子療之當刺以長鍼行以毒藥瘕當下即愈

狐瘕者婦人月水當日數來而反悲哀憂恐若似遠行逢暴風疾雨雷震驚恐衣被沉濕罷倦少氣心中恍惚未定四肢懈惰振疾苦瘧瘧氣絕精神游亡邪氣入于陰裏不去則生狐瘕之聚食人子臟令人月水閉不通少腹癢滯

胸膈腰背痛。陰中腫。小便難。胞門子戶不受男精。不藏氣盛。令人嗜食欲嘔。喜睡多所思。如有身狀四肢不舉。有此病者。終身無子。其瘕有手足成形者。殺人未成者。可療。以長鍼。急持刺之。行以毒藥。瘕當下。即愈。

蛇瘕者。婦人月水已下。新止。適閉未復。胞門子戶勞傷。陰陽未平。榮衛分行。若其中風。暴病。羸劣。飲食未調。若起行當風。及涉泥塗。因衝寒太早。若坐濕地。名陰陽亂。腹中虛。若行道路。飲汗井之水。食不潔之食。吞蛇風之精。留絡不去。因生蛇瘕之聚。上食心肝。長大其形如漆。在臍上下。還疔左右。脇不得吐氣。兩股脛間苦疼。少腹多熱。小便赤黃。膀胱引陰中攣。急。腰目俱痛。難以動作。喜發寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者。殺人未成者。可治。瘕之有法。行以毒藥。瘕當下。即愈。

蠱瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷勞。汗出。衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。蹠立未安。顏色未平。復見所好。心為之開。魂魄感動。五內銳消。若入水洗沐浴。不以時出。而神不守。水精與邪氣俱入。至三焦之中。募玉門先閉。津液妄行。留絡不去。因生蠱瘕之聚。大如小棗。令人小腹內切痛。惡氣左右走。上下腹中苦痛。若黃若亡。持之躍手下引。陰裏腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘕有手足成形者。殺人未成者。可治。瘕有法度。以長鍼按瘕之。行以毒藥。瘕當下。即愈。

○論婦人瘕瘕

大全云。婦人瘕瘕。由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏。積于腹中。牢固不動。有可徵驗。故名曰瘕。氣道壅塞。故名曰瘕。得冷則發。冷入子臟。則不孕。入胞絡。則月水不通。

薛氏曰。前證若脾胃虛弱。用六君子加芎歸。若肝脾虛弱。用補中益氣及歸脾湯。若肝火鬱滯。佐以蘆薈丸。六味丸。外貼阿魏膏。患者須慎七情六淫。飲食起居。治者不時審察病機。而藥之庶幾有效。

○論食瘕

大全云。婦人食瘕。臟腑虛弱。月候來時。食生冷之物。脾胃既虛。不能消化。與臟氣相搏。結聚成塊。日漸生長。盤牢不移。故謂之食瘕也。

薛氏曰。前證若形氣弱。須先調補脾胃為主。而佐以消導。若形氣充實。當先疏導為主。而佐以補脾胃。若脾氣壅血。

薛氏之說可為病久虛羸者法

滯而不行者。宜用烏藥散散而行之。散用烏藥散或醋浸炒桂心當歸桃仁青皮木香各等分。未每二錢熱酒送下。脾氣虛而血不行者。宜用四君芎歸補而行之。若脾氣鬱血而不行者。宜用歸脾湯解而行之。若肝脾血燥而不行者。宜用加味逍遙散清而行之。大抵食積痞塊之證。為有形。蓋邪氣勝則實。真氣奪則虛。當養正關邪。而積自除矣。雖然堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可宜用。若病久虛弱者。不可輕試也。

○論血癥

大全云。婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相結。漸生顆塊。盤牢不移動者是也。皆因血氣勞傷。月水往來。經絡痞塞。惡血不除。結聚所生。久而不瘥。則心腹兩脇苦痛。害于飲食。肌膚羸瘦。問癥一也。何以知是血癥。曰。血外之証。蒼悶煩燥。迷忘驚狂。痰嘔汗多。骨熱肢冷。其蓄在下焦者。必臍下結急。外熱內痛。尺脈洪而數也。桃仁靈脂生地黃牛膝大黃甘草法逐之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損。五臟氣血乖違。而致。蓋氣主噓之。血主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。恚怒傷肝者。多患之。腹脇作痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣為主。治法當主於固元氣。而佐以攻伐之劑。必需之歲月。若期速效。投以峻劑。反致有悞。

○論腹中瘕血

大全云。婦人月經否塞不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。為風冷所乘。而得冷。則成瘕血也。血瘕在內。則時時體熱而黃。瘕久不消。則為積聚癥瘕矣。

薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用加味歸脾湯。若恚怒傷肝。用加味逍遙散。若產後惡露用失笑散。若肝脾虛損。用六君子柴胡。以補元氣為主。胃氣虛弱。用補中益氣湯。加茯苓半夏為主。大凡腹中作痛。畏手按者。此內有瘕血。若形體如常。屬病氣。元氣俱實。用桃仁承氣湯直下之。若痛而肢體倦怠。飲食少思。此脾胃受傷。屬病氣有餘。元氣不足。用當歸散調和之。若痛而喜手按。形體倦怠。飲食少思。此形氣病氣俱不足。用六君子炮薑芎歸純補之。若痛而大便秘。飲食難化。此脾腎虛寒。用六君子炮薑肉桂溫散之。若痛而作嘔。少食。此脾胃虛弱。用六君子炮薑蒼朮。若痛而嘔吐。不食泄瀉。用六君子薑桂。若兼手足逆冷。自汗。更加附子。此証多有因攻伐而致者。

立蘇專重脾胃其
言如此然亦一偏之
見擅攻劑之藥不得
其發反致傷氣以致
不救故不如善守之
為愈矣

○論瘕瘕

大全云。瘕者在腹內。近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰瘕也。瘕者為僻。僻在兩肋之間。有時而痛故曰瘕也。二者皆陰陽不和。經絡痞隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發作疼痛。○夫瘕瘕瘕瘕血氣塊硬發作則痛甚則欲死究而言之皆血之所為。僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍。甚而死一二日方省醫。坐併胎數年不愈。僕以蔥白散烏雞丸遂安。又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛。要一人扶定方少止。亦用此二藥而愈。尋常小小血氣用此二藥亦有奇效。故錄於後。

○論疝瘕

大全云。婦人疝瘕由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風冷入腹與血相結。所生疝瘕者。痛也。瘕者。假也。結聚浮假而痛。推移乃動也。婦人之病有異於丈夫者。或因產後血虛受寒。或因經水往來取冷過度。非獨飲食失節多挾瘀血氣所成也。其脈弦急者。生虛弱。小者死。尺脈滿而浮。牢為血實。氣虛其發腹痛逆氣上行。此為胞中有惡血。久則結成血瘕也。

薛氏曰。子和云。遺溺閉癰。陰痿浮痺。精滑白淫。皆男子之疝也。若血涸月事不行。行後小腹有塊。或時動移。前陰變出。後陰痔核。皆女子之疝也。但女子不謂之疝。而謂之瘕。

一婦人小腹痞脹。小便時下白帶。小水淋瀝。此肝經濕熱。下注用龍膽瀉肝湯而愈。

一婦人小腹脹痛。小水不利。或胸乳作痛。或脇肋作脹。或氣逆心吻。余以為肝火而血傷脾。用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈。

一婦人小腹痞悶。小便不利。內熱體倦。懶食用。八珍湯加柴胡山梔龍胆草治之而安。

○論腸覃

李氏曰。腸覃乃寒氣客於大腸。與胃相搏。大腸為肺傳送。肺主氣。氣得熱則行。得冷則凝。凝則清氣散而濁氣結。為瘕覃。延日久不已。瘕肉乃生。始如雞卵。久如懷胎。按之堅。推之移。月事時下或多或少。氣病而血未病也。宜二陳湯加香附以開之。或香粉丸。

巢氏止言胞門傷而此直指胞中惡血亦不病源來

女子亦有疝男子亦有瘕

藏氣精聚並起于氣
故有氣精氣聚之說
然謂氣精血聚者氣
聚而後血凝也其失
食失痰又各隨所積
而變見矣夫痰與血
食皆賴氣以行之行
化故氣行物生氣病
物病此百病所以皆
生于氣而破血消食
消痰之劑必用氣藥
者以此

厥梳散同用蓋取
義耳未必盡善
下不可輕漸字極妙

非腎精之症而謂虧
之症何歟
補中益氣何以能治
鬱結意取積氣外散
也

養當凡治肝陰之結

論婦人癥瘕並屬血病

準繩云古方有五積六聚七癥八瘕之名五臟之氣積名曰積故積有五六府之氣聚名曰聚故聚有六難病準繩
言之詳矣若夫七癥八瘕則婦人居多七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不
混夫癥者堅也堅則難破瘕者假也假物成形古人將婦人病為瘕疾以蛟龍等為生瘕然亦不必如此執泥婦人
瘕瘕並屬血病龍蛇魚鱉肉髮蟲瘕等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚臟腑假血而成自有活性亦猶承瘕中
僧病瘕者腹中有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結為瘕塊雖內所感之不同治法當以類相從所謂醫
者意也如以敗梳治蟲瘕銅屑治龍瘕麴蘖治米瘕石灰治酒瘕如此等類學者可以理解也

論治積須養正氣

薛新甫云婦人症癖癥瘕大抵因飲食起居七情失宜虧損臟腑氣血乖違陰絡受傷循行失度所致
羅謙甫云養正積自除必先調養使榮衛充實若不消散方可議下但除之不以漸則必有顛覆之害若不守禁忌
縱情嗜慾其有不喪者鮮矣

一婦人內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵漸大四十許經水三月一至肢體消瘦齒頰似蒼脈洪數而虛左關尤
甚此肝脾鬱結之証外貼阿魏膏午前用補中益氣湯午後用加味歸脾湯兩月許肝火稍退脾土少健午前補中
益氣下午味丸午後道遙散下歸脾丸又月餘日用蘆薈丸二服空心以道遙散下日晡以歸脾湯下喜其謹疾調
理年餘而愈

一婦人腹內一塊不時上攻或作痛有聲或吞酸痞悶月經不調小便不利二年餘矣面色青黃余以為肝脾氣滯
以六君加芎歸柴胡炒連木香吳茱萸各少許二劑却與歸脾湯送下蘆薈丸三月餘肝脾和而諸証退又與補中益
氣湯加茯苓牡丹皮中氣健而經自調

一婦人性多鬱善怒勤于女工小腹內結一塊或作痛或痞悶月經不調恪服伐肝之劑內熱寒熱胸膈不利飲食
不甘形體日瘦牙齦蝕爛此脾土不能生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝水當滋化源用補中益氣湯六味
丸至仲春而愈

五論

魚腥黃廷能發濕熱

用法痛快

宜熟調

松江太守何恭人性善怒腹結一塊年餘上齧蝕透血氣虛極時季冬肝脈洪數按之弦緊或用伐肝木清胃火之藥余曰真氣虛而邪氣實也恐伐肝木至春不能發生耳用八珍湯以生氣血用地黃丸以滋腎水肝木頓退因大怒耳內出血肝脈仍大煩熱作渴此無根之火也仍以前藥加肉桂二劑脈飲熱退因復大怒果卒於季冬辛巳日乃金剋木故也

李氏曰善治癥瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其大半而止不可猛攻峻施以傷元氣蓋脾胃正氣待其自化此開鬱正元散之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻擊之藥病重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

○論痰積用吐下

子和云戴人過謙遇一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如冰娶來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用我藥病可除孕可得卒從之戴人診其脈沉而遲尺脈洪大而有乃非無子之候也可不踰年而孕其良人笑曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白術調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠二子戴人嘗曰用吾此法無不子之婦此言不誣

三聖散用防風瓜蒂各三兩蒙蘆一兩為粗末以薑汁煎服製法詳見儒門事親○白術調中湯凡白朮茯苓澤瀉橘紅各半兩甘草一兩乾姜官桂砂仁藿香各二錢半為末白糖化蜜調服二錢無時

陽夏張主簿之妻。病肥氣。初如酒杯大。發寒熱。十五餘年後。因性急。感病益甚。惟心下三指許。無病滿腹如石片。不能坐卧。針灸匪矣。徒勞人耳。乃邀戴人診之。曰。此肥氣也。得之季夏戊巳日。在左脇下。如覆杯。久不愈。令人發痰。

瘡瓜蒂散吐之魚腥黃涎約一二缶至夜繼用舟車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六行凡有積處皆覺痛

後用白朮散當歸散和血流經之藥。如斯湧泄。凡三次愈。瓜蒂散舟車丸見雜病傷食痰飲二門。通經散用橘紅
獨乾三味各等分。細末每服三錢。臨卧溫淡酒調下。
前服○當歸散當歸杜蘅藜等分。為末。米飲調服。食前此。
吐去。通治者黃。

○脈法

脈經曰婦人疝瘕積聚脈弦急者生虛弱者死 少陰脈浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產

○通治諸積

開鬱正元散 治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚腹痛宜此利氣行血和脾消導

白朮 陳皮 青皮 香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 玄胡索 神麴 甘草 右剉每服一

兩生薑三片水煎服

大七氣湯 治癰瘕積聚隨氣上下心腹疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

京三稜 蓬朮 各煨 青皮 去白 陳皮 去白 香附 炒 藿香葉 益智仁 桔梗 肉桂 不見甘草 錢七

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

助氣丸 治三焦痞閉胸膈滿悶氣不流通結成積症癖氣塊並皆起之

京三稜 蓬朮 以上二味各用油紙包炙 青皮 去白 陳皮 去白 白朮 各十 枳殼 炒 檳榔 木香 各十

右為末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積女人脾血積小兒食積

京三稜 莪朮 各二味同 青皮 陳皮 乾薑 良薑 各一兩 香附子 二兩 右為末醋糊丸如桐子大每

服三十丸生薑湯下 虛者以補藥下之 一方加神麴麥芽

三稜煎 治婦人血瘕血癥食積痰滯

三稜 莪朮 各一青皮 去白 半夏 湯洗 麥芽 炒各 右用好醋六升煮乾為末醋糊丸如桐子大每服五十

丸淡醋湯下 痰積薑湯下

香稜丸 治一切積聚破痰癖消癰塊

木香 丁香 各半 枳殼 炒 三稜 酒浸 莪朮 剉每一兩用巴豆三十粒去壳 青皮 製 川棟子 肉 懷香 炒

按此諸藥方治氣血瘕食和平之劑海粉不入者若作丸更佳

此惟病氣形氣俱平者可用總重在隨氣上下若氣鬱生火者忌

此方削堅積破滯氣用白朮為佐而氣者不可輕服

胃寒氣實者可用

用藥巧處

上在氣行血流痰消食消也妙在用醋之多

此流行之法峻而不猛行而得中妙在用醋

凡消塊俱用熱藥行
氣劑堅之劑而此方
又以補中帶消其平
金方也用者式之

八癰之由皆自胞門
子戶藏受故用此方
以導之

等
右為末醋麵糊丸如桐子大朱砂為衣每服三十丸薑鹽湯或溫酒下無時

大硝石丸 治七癰八癰聚積痞塊及婦人帶下絕產腹中有癰瘕者當先下此藥但去癰瘕令人不困

硝石^{三兩} 大黃^{四兩} 人參 甘草^{各一兩} 右為末以三年苦酒三升置銅石器中先用大黃微火熬微沸常攪

不息至七分內餘藥復熬成膏至可丸即丸如桐子大每服二十丸米飲下三日一服婦人服之或下如雞肝
或如米汁赤黑等物二三升後忌風冷

阿魏膏 治一切痞塊

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲 生地黃 兩頭共 大黃 白芷 天麻 紅花^{四錢} 木

鱉子^{十粒} 槐柳桃枝^{各三} 亂髮^{雞子大} 右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮煎髮化仍去渣徐去黃丹

煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處鋪平半指厚以紙蓋
用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

○分治八癰

皂莢散 療黃癰導方

皂莢^{炙一兩} 蜀椒^{去汁} 細辛^{一兩} 右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中欲便溺則出之已則復

內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

療青癰坐導方

戎鹽一升 皂莢^{半兩} 細辛^{一兩} 右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但卧癰當下清如葵汁養

之如產法

療燥癰方

大黃^{如雞} 乾薑^{各二兩} 黃連^{三兩} 桂心^{一兩} 厚朴^{四兩} 郁李仁^{一兩} 去麤蟲^{三枚} 雞脰脰中黃膜^{一枚} 右搗散

早朝空腹以溫酒一盞和三錢頓服癰當下畢養之如產法三月勿合陰陽無子者當有

療血癰攻刺腹脇時痛導藥方

大黃 當歸各半 山茱萸 皂莢去皮各 細辛 戎鹽各半 右搗以香脂丸如指大每用一丸綿裹內陰中正坐良久瘕當自下養如乳婦法。

療婦人血瘕痛方。

乾薑 烏鰂魚骨破一桃仁 仁一兩去 右搗散酒服二方寸七日二一方無桃仁。

桃仁煎 治婦人血瘕血積經候不通。

桃仁 大黃各一 蠱蟲半兩 朴硝各一兩 右為末以醕醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大蠱蟲桃仁不住手攪煎至可丸下朴硝攪勻出之丸如梧桐子大前一日不用吃晚飯五更初用溫酒吞下五丸日午取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣之狀未下再服如鮮血來即止續以調補氣血藥補之○本事方云頻年在毗陵有一貴宦妻患小便不通臍腹脹不可忍眾醫皆作淋治以八正散之劑愈甚予診之曰此血瘕也非瞑眩藥不可去用此藥更初服至日午大痛不可忍遂卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛止即愈○此藥治病的切然猛烈氣虛弱者不可輕用。

療脂瘕方。

皂莢七錢半 礬石燒半 五味子 蜀椒法細辛 乾薑各半 右搗散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽不三行其瘕即愈。

導散方。

皂莢炙去子 吳茱萸 當歸各一 蜀椒去汁 乾薑 大黃 戎鹽各二 細辛炒 礬石燒 五味子各二 右搗篩為散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中坐卧隨意勿行走小便時去之別換新者。

療狐瘕方。

取新死鼠一枚裹以新絮塗以黃泥穿地坎足沒鼠形置其中桑柴火灼其上一日一夜出之研為末肉桂心末二錢半酒服二方寸七病當下甚者不過再服愈。

療蛇瘕方。

以上八歲方有未
但須認症耳
主症不明

此方散結破血行氣
消飲溫行特塊要藥

此方破結氣散結血
熱堅溫利亦可備用

秘授之丸不可妄視

大黃 黃芩 芒硝各半 甘草大如指 烏鰂魚骨二枚 皂莢六枚 去皮 右搗以水六升煮之三數沸絞去滓
下硝通寒溫服之十日一劑空心服之瘕當下

瘕瘕瘕方

大黃一兩 乾薑五錢 附子各半 人參各三錢 廩蟲一升 桂心一兩 細辛 土蛆各半 白朮一兩 右搗散
以酒服方寸七日三

○治瘕瘕

穿山甲散 治婦人瘕瘕及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢瘦弱

穿山甲炙 鱉甲醋炙 赤芍藥 大黃炒 乾漆炒 桂心各一兩 芎藭 芫花醋炒 當歸各半 麝香二錢 另研

右為末入麝和勻每服二錢熱酒調下無時

莖莖朮丸 治婦人瘕瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

莖朮半錢 當歸焙 桂心 赤芍藥 檳榔 昆布 琥珀研 枳殼 木香各半 桃仁 薑甲 大黃各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大食前米飲下二十丸

丁香丸 治婦人瘕瘕結塊不散心腹疼痛

雄雞糞炒黃 鱉甲各一兩 砂 當歸焙 芫花醋炒 乾巴豆去皮心油 右為末研勻醋煮麴糊丸如小豆大

當歸酒下三丸

桃仁散 治婦人瘕瘕心腹脹滿不能飲食體瘦無力

桃仁一兩 湯浸去皮尖雙仁 訶子皮 白朮 赤芍藥 當歸各七錢 三棱微炒 陳皮去白 薑甲醋炙 去根

右為散每服二錢水一盞入生薑一錢三分煎至六分去滓食前稍熱服○右方皆攻積之藥性多獷悍用者

慎之

○治食瘕

化積丸 治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈雜眩暈身熱時作時止

治瘕瘕 治食瘕 治血瘕

此丹溪先生法也緣古方率多香燥溫熱反能助火損氣此方以益氣而治右以山以益氣而治左其餘破氣消食散血誠難當藥也

行氣消飲磨積

治血積甚平穩

此方係改通而腰腿重痛須用行經藥方

平正致速

治陰經目

黃連一兩五錢用吳茱萸益 蘿蔔子 香附 山查各一兩 川芎 山梔炒 三棱煨切 神麴炒 桃仁去油

右為末蒸餅丸服

小三棱煎丸

治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及一切積滯不消心腹堅脹痰飲嘔噦噎膈脇肋刺痛

脾氣橫泄

三棱 莪朮各四錢 芫花二兩 右同入磁器中用米醋五升浸滿封器口以炭火煨令乾取出棧朮將芫花以

餘醋炒令微焦同棧朮焙乾為末醋糊丸如菜豆大一服十五丸生薑湯婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水

桑白皮煎湯下

礞砂丸 治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

礞砂 青礞石 穿山甲炙 三棱炒 乾漆炒令硫黃各半 巴豆三十粒去皮 右為末用軟飯丸如小豆大每

服二丸生薑橘皮湯下

礞石丸 治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛

青礞石 巴豆心油 朱砂 粉霜研并木香各二錢半 礞砂半 右研勻以糯米軟飯和丸如菜豆大每二丸空心溫

酒下取下惡物為度右二方犯礞砂巴豆非胃氣強壯而積氣堅頑勢不兩立者不可輕用也

○治血癥

增味四物散 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 三棱 黃芪 肉桂 乾漆炒烟盡 右為粗末每服五錢水煎服○余妻

曾患小腹積塊每遇寒觸劇痛不可忍諸醫治莫效余用此一服立止

六合湯 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 酒洗官桂 蓬朮煨切各 右咬咀每服四錢水煎空心服

血竭散 治婦人血瘕作痛臍下脹滿月經不行發熱體倦

當歸 芍藥 炒桂心 血竭 蒲黃炒各五分 胡索炒四分 右為細末每服二錢空心酒調下

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛。

牡丹皮 當歸 玄胡索 桂心各一兩 赤芍藥 牛膝 莢朮各一兩 三稜各一兩 右為粗末每服三錢水酒各半盞煎服。

當歸丸 治婦人月經不調血積証。

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黃 廣茂 京三稜各半 百草霜各二錢半 右為細末酒糊為丸如桐子

大沸水下六七十丸

大黃散 治婦人血凝血瘕食積痰滯。

川大黃七錢半 薑半斤 醋一兩 乾漆一兩 右為末用米醋一升煎為膏每服一錢食前溫酒調下。

大紅花丸 治婦人血積瘕瘕經絡滯血。

川大黃 紅花各二兩 蟲十個 右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸食後溫酒下。日

三服

○治腹中瘕血

桃奴散 治血蟲及瘕血停積經水不通男子跌撲損傷皆效。

桃奴炒 假鼠糞炒 玄胡索 肉桂 五靈脂 香附炒 砂仁 桃仁各等 右為末每服三錢酒調服。

大黃湯 治婦人血瘕不消及撲損血瘕。

大黃生用 桃仁湯浸去皮 肉桂去粗皮 郁李仁去皮 生薑 地黃各一兩 右粗搗篩每服三錢水酒各半盞

同煎至七分去滓溫服。

琥珀散 治婦人經絡痞閉腹內瘕血痛不可忍。

琥珀 乳香 沒藥各另研細末 右每服二錢水酒各半盞煎至七分入地黃自然汁二合再煎數沸去滓入

溫酒服不拘時候。

地榆散 治敗血。

三物固妙而入地黃汁不佳。

治腹中瘕血 治瘕癖

何首烏白芷有奇處

此治氣血痰飲無枉不可

昔有一女人患腹中

痛或血氣不和恐非

病在冷氣不和恐非

病在冷氣不和恐非

病在冷氣不和恐非

病在冷氣不和恐非

病在冷氣不和恐非

病在冷氣不和恐非

何首烏 肉桂 地榆 香白芷 各等 右為粗末每服二錢米泔一盞半沙糖一小塊煎至八分去滓空心

○治症癖

麝香丸 治婦人症癖冷氣兼症氣心腹痛不可忍

麝香 另研 阿魏 煨令乾 五靈脂 三棱 銘七 桃仁 錢花 醋炒 檳榔 各一 莪朮 桂心 沒藥 木香

當歸 各半 右為細末入麝香令勻粳米飲飯為丸如桐子大每服十丸淡醋湯下無時

治婦人症癖及血氣等神効方

用積猪肝一具可及十兩者以巴豆五十枚去外皮紫在肝內用醞醋三碗熬肝極爛去巴豆不用入京三棱末和調得所丸如桐子大每服五丸食前溫熱酒下

葱白散 專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛又治婦人胎前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血臍

宿冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶癖久服盡除但婦人一切疾病最宜服此 與後烏雞丸兼服

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 船上懷香 芍藥 青皮 木香 麥芽 苦楝子 熟地黃 三棱 莪朮 茯苓 神麴 人參 各等 右為細末每服三錢水一盞連葱白二寸拍破鹽半錢煎至七分內大黃訶子宜相度病狀如大便不利入大黃同煎不入鹽如大便自利入訶子煎

烏雞煎丸 治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之 烏雄雞一隻 烏藥 蛇牀 牡丹皮 人參 白朮 黃耆 各一 蒼朮 米泔浸切 海桐皮 肉桂 去粗 附子 炮

兩川烏 炮 紅花 白芍藥 蓬莪朮 陳皮 各二 玄胡索 木香 肉豆蔻 熟地黃 洗焙 琥珀 草薢 各半 右細剉用烏雄雞一隻湯燉去毛及腸肚將上件藥安放雞肚中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞

骨以油紙盛焙乾為細末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸○胎前產後傷寒蜜糖酒下○胎前氣悶肚熱炒薑酒下○赤白帶下生薑地黃酒下○產後敗血注心童子小便炒薑酒下○產後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下○胎前嘔逆薑湯下○催生炒蜀葵子酒下○安胎鹽酒下○室女經脈當通不通四肢疼痛煎紅花

此以益動肝氣而助其用耳本方用參或白朮以益三焦之氣紅花熟地白芍以益心包肝腎之血氣滯而不行者有養陳為藥木香以調之而滯而不行者有丹皮玄胡索以行之因肉桂以溫之其諸品類或以溫化其積或於血中行氣或於氣中行血或行表或行裏皆所以相贊成功總之以氣血為主溫行為用而此其所以為治胎前諸服也其白胎前諸病則有所未信血邪積而或成云皆血所為是說塊要訣然有上下左右之分而不可飲食積亦須有辨不飲食積一說即此方所用肉苁草菓意可知矣

凡脈繫小沉澁皆血凝氣滯之胎

此服法根丹溪先生意須知女子之病與男子不同

按此症二字雖相連然以方觀之只重在胎字蓋女人又有胎前之義故耳如山之高而突起不然

酒下○血氣攻刺心腹疼痛當歸酒下○血暈棧欄燒灰酒調吞下○血悶煎烏梅湯研砂下○子宮久冷溫酒或棗湯下空心日一服○血氣勞人參酒吞下○小腹疼痛炒回香鹽酒吞下○血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆酒下○常服溫酒醋湯任下並空心食前服○血邪研砂磨麝香酒下

夫症癖癥瘕血氣塊硬發渴刺痛甚則欲死究而言之皆血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍甚而死一二日方省醫巫並治數年不愈僕以葱白散烏雞丸遂安又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛要一人扶定方少止亦用此藥而愈尋常小小血氣用此二藥亦有奇効陳宜人病血氣作楚痛不可忍服諸藥無効召僕診之兩關脈弱沉為肝脈沉差繫此血氣漸成症癖也只以此二藥治之而愈又四明馬朝奉後院亦病此用藥治之亦愈

四等丸 治婦人症癖氣心腹疼痛飲食不消

大黃剉碎 訶梨勒去核 檳榔 木香各等

五丸亦得

又方 鼈甲醋炙黃川 大黃剉碎 三稜炮製各

木香 硃砂另 治婦人症癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不瘥者

木香 硃砂另 丁香 官桂 附子炮

三稜 猪牙皂角 乾薑炮各 巴豆霜減半

器中慢火熬次下巴豆霜大黃熬成膏將前藥末與膏子為丸如麻子大每服三五丸食後溫酒送下加至

大便利為度○右三方皆攻積之劑全無補性虛人禁用實者亦須以四君子四物兼服乃可

治症瘕

乾漆散 治婦人症瘕久不消令人黃瘦疰羸兩脇妨悶心腹疼痛

乾漆炒令 木香 芫花 醋炒 赤芍藥 桂心 當歸 川芎 琥珀研各 大黃炒 牛膝七錢 桃仁一兩 麝香

二錢 右為細末每服一錢溫酒調下無時

何彼皆連稱焉
此方治肝經居多

專在瘀血乃流行之
劑是知古人亦不專
主於熱矣在人自擇

氣血痼食皆宜第藥
太猛慎之

此方以氣為主而血
藥止用一味然漆有
飛補之力又可以用一
當十也甚平穩宜備

當歸散 治婦人疝瘕血氣攻刺心腹疼痛不可忍

龍甲醋炙 當歸炒 桂心 檳榔 大黃劉微炒 川芎 吳茱萸湯泡 木香 青皮去白 各半兩 蓬莪朮 赤芍藥

桃仁湯浸去皮尖 右為散每服三錢薑一錢三分水煎熱服不拘時

硝砂丸 治婦人疝瘕及瘀血在臍時攻腹脇疼痛

川芒硝 硝砂各一 當歸 雄黃 桂心各半 大黃炮 三稜各一 右為細末米醋一碗熬大黃末為膏次入

餘藥末和丸如桐子大空心溫酒下十丸漸加至二十丸以利下惡物為度

巴豆丸 治婦人疝瘕及血氣疼痛

巴豆去皮 心醋煮 硝砂 大黃炒 五靈脂 桃仁各七 木香各半 以上 右煉蜜為丸如菜豆大淡醋湯空

心下五丸熱酒亦可

黑神丸

神麴 藁香各四 木香 椒炒香 丁香各半 檳榔四枚 漆六兩 半生半用重 右除椒漆外五物皆半生

半炒為細末用前生熟漆和丸如彈子大又用藁香末十二兩鋪陰地陰乾候乾并懷香收器中至極乾去懷

香治腎氣膀胱瘕瘕及疝墜五膈血崩產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿灰酒下一難產炒

葵子四十丸枚搗碎酒煎下○諸疾不過三服瘕氣十服膈氣瘕瘕五服血瘕三丸當瘕一婦人病腹中有

大塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸盡三服杯氣盡消終身不作

肺露丸 治傷寒於內氣凝不流結於腸外久為瘕瘕時作疼痛腰不得伸名曰腸覃

廣莖酒浸 三稜各一兩 乾漆炒去腥 川烏各五 硝砂 四錢 青皮 雄黃另研 茴香鹽炒 穿山甲炮 各輕粉一錢

麝香另研 巴豆皮切 關去 右除研藥外將巴豆炒三稜廣莖二味黃色去巴豆不用共為末入研藥勻生薑

汁打糊丸如桐子大每服二十九至三十九薑湯或酒下空心食前服

烏喙丸 治腸覃亦治乳餘并男子疝氣 烏喙炮去皮 錢半 夏湯洗 石膏 椒 藜蘆炒 牡蒙 茯苓酒浸 桂心 乾薑炮 各巴豆七個 右為末煉蜜丸