

四庫醫學叢書

薛氏醫案

二

上海古籍出版社

四庫醫學叢書

薛氏醫案

（明）薛己撰

（一）

上海古籍出版社

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十九

詳校官太醫院醫士臣許傑
編修臣金聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官助教臣卜維吉

膠錄監生員茅琳

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十九

明薛己撰

教氏傷寒金鏡錄

凡傷寒熱病傳經之邪比雜病不同必辨其脈證舌表裏汗下之庶有不誤况脈者血之府屬陰當其得病之初正氣相搏若真氣未衰脈必滑數而有力病久熱甚氣衰脈必微細而無力方數甚也但可養陰退陽此識

欽定四庫全書

薛氏醫案

脈之要也或初病即惡寒發熱後必有渴水燥熱之證或逆厥而利此熱證傳經之邪也若始終皆熱證惟熱而不惡寒故傷寒為病初則頭痛必無發熱惡寒渴水之症一病便有逆厥泄利或但惡寒而無發熱此寒證也此識證之妙也如古本者乃心之數於舌心屬火主熱象離明人得病初在表則舌白紅而無白胎等色表邪入于半表半裏之間其舌色變為白胎而滑見矣切不可不明表證故邪傳於裏未罷則舌必見黃胎乃邪

已入於胃急宜下之胎黃自去而疾安矣至此醫之不
依次誤用湯火失於遲下其胎必黑變瘰癧起此為難
治若見古胎如漆黑之光者十無一生此心火自炎與
邪熱二火相乘熱極則有薰化水象故色從黑而應水
化也若乃臟腑皆受邪毒日深為瘰癧必作熱症雖宜下
之乃去胃中之熱否則其熱散入絡臟之中鮮有不死
者譬如火之自炎初則紅過則新為黑色炭矣此凡則
害承乃制今以前十二舌明著猶恐未盡諸瘰癧復作二

欽定四庫全書

卷四十九

三

十四圖并方治列於左則區區推源尋流寔可決生死之

妙也清聖學士杜先生著

傷寒用藥說

夫醫者何猶防之將也凡視人疾在究其淺深之異而
療之且疾之襲人若寇之侵境方其至也必瞰其勢之
強弱先以安撫次以講和戒嚴守禦以防其返也如堅
然不退至再三忍強肆侮意謀土地當此之際奈何必
選將練兵剋期至戰寇滅乃已若倉皇無措則土地陷

矣豈非將者不識韜畧不知合變以致悞也可勝嘆哉
夫今之醫不閱方書不察脉理臨瘰癧茫然當解而不解
當吐下而不吐下畏首畏尾顛倒錯亂助病日深殊不知
醫乃司命其可輕忽如此大抵病之輕淺者即為和解
深重者使便攻擊故曰用藥之時膽欲大而心欲小
毋使君臣失職佐使不當反嫁疾焉苟能如將之用兵
進退合宜操存 lawful 疾之不愈也余每察脉用藥覺
有疑滯幸承先師之誨故始攝其要領以告後人云

欽定四庫全書

卷四十九

三

至正改元一陽吉日永和三仙至人蕭璜鳴書

驗證舌法

夫人之受病傷寒為甚傷寒之治仲景為詳人皆知之
而未必能行之者豈非以其法浩繁有難卒貫者乎舊
有故氏金鏡錄一篇專以舌色視病既圖其狀復著
其情而後別其方藥開卷昭然一覽具在雖不期乎
仲景之書而自悉合乎仲景之道可謂深而通約而
要者矣予昔承乏在留都嘗刺之太醫官舍本甘繪

以五來恐其久而色渝因致謬誤乃分注其色於上使人得以意會焉

舌



舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之證也宜用小柴胡湯梔子豉湯治之

小柴胡湯

方見後

梔子豉湯

方見後

欽定四庫全書

辨別醫家
卷四十九

四

舌見紅色熱蓄於內也不問何經宜用透頂清神散治之

透頂清神散

豬牙皂角

細辛

白芷

當歸

右為末等分和勻令病人先嚥水一口以藥少許吹鼻內吐去水取嚏為度未嚏仍用藥吹入凡瘟疫之

家不拘已未患者皆宜用之



舌見純紅內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也君火熾盛反無水化宜涼膈散大柴胡湯下之

涼膈散

方見後

大柴胡湯

方見後

欽定四庫全書


辨別醫家
卷四十九

五

舌見紅色而有小黑色者熱毒乘虛入胃蓄熱則發癰矣宜用玄參升麻葛根湯化斑湯解之玄參升麻葛根湯即玄參升麻湯加葛根方見後

化斑湯

即白虎湯加人參方見後



舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所不勝者假火勢以侮脾土將欲發黃之候也宜用茵陳五

苓散治之

茵陳五苓散

方見後



舌見紅色尖見青黑者水虛火實腎熱所致宜用竹葉

石膏湯治之

方見後



欽定四庫全書

醫方類聚卷四十九

舌見淡紅色而中有一紅暈沿暗繞黑乃餘毒遺於心

胞絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是證也以承氣

湯下之

方見後



舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火燔灼熱毒炎

上故發裂也宜用涼膈散

涼膈散

方見後



舌見紅色更有紅點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾盛火在

上水在下不能相濟故也宜用小承氣湯下之

小承氣湯

方見後



舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有刺者此熱毒

欽定四庫全書

醫方類聚卷四十九

熾甚堅結大腸金受火制不能平水故也急用調胃承

氣湯下之

調胃承氣湯

方見後



舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥于肝經肝主筋故舌

見如絛形也用理中合四逆湯溫之

四逆湯

乾薑

兩

附子

一枚去皮

甘草

六錢二

字半

右每服五錢水一鍾煎六分不拘時溫服

理中湯

服法

如前

人參

甘草

乾薑

白朮

炒



舌見黑色水尅火明矣患此者百無一生治者審之

余在留都時地官主事鄭汝東妹婿患傷寒得此舌

欽定四庫全書

醫方類聚

卷四十九

傷寒

論

附子

理中湯

人參

甘草

乾薑

白朮

炒

理中湯

服法

如前

人參

甘草

乾薑

白朮

炒

院內醫士曾禧謂當用附子理中湯人咸驚駭遂止

亦冀能療困甚治棺曾與之隣往視之謂用前藥猶

有生理其家既待以死據從之數劑而愈大抵舌黑

之症有火極似水者即杜學士所謂薪為黑炭之意

也宜涼膈散之類以瀉其陽有水來尅火者即曾賢

士所療之人是也宜理中湯以消陰翳又須以老生

薑切平擦其舌色稍退者可治堅不退者不可治

弘治辛酉金臺姜夢輝患傷寒亦得此舌手足厥冷

吃逆不止衆醫猶作火治幾致危殆判院吳仁齋用

附子理中湯而愈夫醫之為道有是病必有是藥附

子療寒其效可數奈何世皆以為必不可用之藥寧

視人之死而不救不亦哀哉至於火極似水之症用

藥得宜效應不異不可便謂為百無一治而棄之也

教氏傷寒金鏡錄圖方



欽定四庫全書

醫方類聚

卷四十九

傷寒

論

附子

理中湯

人參

甘草

乾薑

古見夫白根黃其表證未罷也須宜解表然後方攻

之如大便秘者用涼膈散加硝黃泡服小便秘者用五

苓散加水通合益元散加薑汁少許以白滾湯調服

涼膈散

生甘草

二連翹

四兩

山梔

一兩

大黃

二兩

黃芩

薄切

葉

朴硝

各一兩

右每服一兩水二盞淡竹葉二十餘片煎至一盞去

粗入生蜜少許熱服以利為度

五苓散 加茵陳即茵陳五苓散

澤瀉 二錢五分 茯苓 二錢 猪苓 二錢 白朮 各一兩 桂 五錢 木通 五錢

滑石 二兩 甘草 一兩

右為末每服五錢入薑汁并蜜各少許白滾湯調下



古見弦白心黑而脉沉微者難治脉浮滑者可汗沉實者可下始病即發此色乃危殆之甚也速連調胃承氣

湯下之 欽定四庫全書 卷四十九

調胃承氣湯

甘草 三錢 大黃 六錢 硝石 二錢

右用水一鍾半先煎甘草大黃將熟去粗下芒硝再煎三五沸頓熱服



舌大白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不至

甚者五苓散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此亦危證也

五苓散 方見後

白虎湯

知母 一錢五分 甘草 一錢 石膏 四兩 粳米 一握

右每服一兩用水一鍾半入糯米先煎下諸味再煎去粗服之加人參亦可

解毒湯

欽定四庫全書 卷四十九

黃連 一兩 黃柏 五錢 黃芩 五錢 山梔子 二十箇

右每服五錢水一鍾半煎至一鍾去粗頓熱服



古見白胎中有黑點亂生者尚有表證其病來之雖惡宜涼膈散微表之表退即當下之下用調胃承氣湯

涼膈散 方見前

調胃承氣湯 方見前



舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎與命門也
宜急下之服解毒湯下三五大連則難治如初服量加

大黃酒浸泡

解毒湯方見後



欽定四庫全書

卷四十九

十二

舌見微黃色者初病即得之發識語者由失汗表邪入裏也必用汗下兼行以雙解散加解毒湯兩停主之

雙解散加解毒湯

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 麻黃 連

翹 芒硝各半兩 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石三兩

甘草二兩 荊芥半兩 白朮 山梔各半兩

右每服一兩水一鍾半薑三片煎八分服不拘時一

云有桂枝二兩



舌中見白胎外則微黃者必作泄宜服解毒湯惡寒者

五苓散方見前

五苓散方見前



欽定四庫全書

卷四十九

十三

舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯合天水散主之可下者大柴胡湯下之表裡雙除臨證審用之

小柴胡湯

柴胡四錢 黃芩 甘草 人參 半夏各二錢

右每服一兩水一鍾半薑三片棗一枚煎一鍾溫服

天水散

甘草一兩 桂府滑石六兩

右各另為末每服五錢入生薑汁并蜜各少許用白

滾湯任意調服如發表用豆豉蔥頭煎湯調服

大柴胡湯

柴胡四錢 黃芩各一錢 芍藥五分 半夏二錢 大黃五分 枳

實二錢

右吹咀每服八錢水一鍾半薑三片棗一枚煎一鍾

溫服



欽定四庫全書

傷寒論

十二

舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱已入胃宜急下之若下遲必變黑色為惡證為亢害鬼賊邪氣深也不治宜用調胃承氣湯下之

調胃承氣湯方見前



之
舌左白胎而自汗者不可下宜白虎湯加人參三錢服



舌右白胎滑者病在肌肉為邪在半表半裏必往來寒熱宜小柴胡湯和解之

小柴胡湯方見前



舌左見白胎滑此臟結之證邪併入臟難治

欽定四庫全書

傷寒論

十五



舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之證無有表者五苓散益元散兼服須待黃盡方可下也

益元散方見前

五苓散方見前



舌見黃而有小黑點者邪通六腑將入五臟也急服調胃承氣湯下之次進和解散十枚四五也

調胃承氣湯

方見前

和解散

藥本

桔梗

甘草

各錢五

蒼朮

三錢

陳皮

厚朴

各錢二

錢各一

右水一鍾半薑三片棗二枚煎七分去渣不拘時

服

欽定四庫全書

卷四十九

七



舌見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服涼膈散二服合進之脉弦者宜防風通聖散

天水散

方見前

涼膈散

方見前

防風通聖散

方見前



舌見黃而色有腸瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴

急宜大承氣湯下之若身發黃者用茵陳湯下血用抵當湯水在脇內十葉湯結胸甚者大陷胸湯痞用大

黃瀉心湯

大承氣湯

厚朴

各錢三

枳實

各錢二

芒硝

二錢

大黃

三錢

芒硝

二錢

右每服一兩水一鍾半先煎枳實候熟入大黃再煎數沸入芒硝煎三五沸去粗熱服

茵陳湯

欽定四庫全書

卷四十九

七

茵陳

五錢

大黃

三錢

山梔子

七枚

右每服一兩水一盞半先煎茵陳半熟次入二味再煎去粗通口熱服

抵當湯

大黃

三錢

水蛭

糯米炒

炒去羽

七個

足七箇

右作一服水一盞半煎一鍾去粗通口服

十棗湯

芫花

醋浸

大戟

甘遂

各等分

炒

右每服二錢弱人減半以水一鍾半大棗十枚劈碎

煎取八分去粗通口服

大陷胸湯

大黃

芒硝 三錢 甘遂 一分

右用水二鍾先煎大黃至一鍾去粗下芒硝煎三五沸再下甘遂末溫服取利

大黃瀉心湯

大黃

黃連 黃芩 各三錢 五分

欽定四庫全書

卷八十九

金匱要略

卷八十九

右作一服水二鍾煎一鍾去粗通口溫服若有宿食痰飲者加半夏二錢



舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大承氣湯下之熱退可愈必三四下方退五次下之而不退

者不治

大承氣湯

方見前



舌見黃而黑點亂生者其證必渴譫語脉實者生脉瀦者死循衣摸床者不治若下之見黑裏亦不治下宜大承氣湯

承氣湯

大承氣湯 方見前



欽定四庫全書

卷八十九

金匱要略

卷八十九

舌見黃中黑至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治宜用調胃承氣湯主之

調胃承氣湯 方見前



舌見外淡紅心淡黑者如惡風未罷用雙解加解毒湯相半微汗之汗罷急下之如結胸煩躁目直視者不

治非結胸者可治

雙解散

方見前

解毒散

方見前



舌見灰色尖黃不惡風寒脈浮者可下之若惡風惡寒者用雙解散加解毒湯主之三四下之見黃黑不治

雙解散

方見前

解毒湯

方見前

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九



舌見灰黑色而有黑紋者脈實急用大承氣湯下之脈浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二三



舌根微黑尖黃脈滑者可下之脈浮者當養陰退陽若惡風寒者微汗之用雙解散若下利用解毒湯十生七

八也

雙解散

方見前

解毒湯

方見前



舌根微黑尖黃隱見或有一紋者脈實急用大承氣湯下之脈浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二三

已上三十六舌乃傷寒驗證之捷臨證用心處之有

無一失

欽定四庫全書

薛氏醫案
卷四十九

薛氏醫案卷四十九

欽定四庫全書

薛氏醫案卷五十

明薛己訂

錢氏小兒直訣一

脈法

脈弦急

氣不和

脈沉緩

傷食

脈促結

虛

脈浮

為風

脈沉細

為寒

脈

亂治

欽定四庫全書

薛氏醫案

一

欽定四庫全書

薛氏醫案

二

薛按脈者人身之造化病機之先見用藥之準繩不

可不先明諸心者也全幼心鑑云小兒一歲以前看

虎口食指寅卯辰三關以驗其病脈紋從寅關起不

至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過

辰者十不救一其脈紋見有五色如因驚必青薄刺

色紫當以類而推之一歲後則可用一指轉側辨其

三部脈弦急浮沉四五歲後脈七八至而細數者為

平九至者傷十至者困六至五至者為虛為寒弦緊

者為風癰弦急為客忤其變態者脈必散亂骨間有

熱脈則沉數若浮而不調為鬼祟浮大而數為風熱

伏結為物聚微細為疳積為腹痛浮而洪為有蟲浮

而遲為胃寒此論脈之大要耳然小兒血氣未實驚

則氣散氣散則脈亂矣又當參以三部五脈三部者

乃看面上氣色虎口脈紋寸口一指脈五脈者上按

額前下診太衝并前二部謂之五脈也治法雖分虛

實然實者病氣實而形氣虛也虛者形氣病氣俱虛

也經云真氣奪則虛邪氣勝則實又云虛則補其母

實則瀉其子東垣先生云形病俱實當瀉之形病俱

虛當補之

詳見後圖下

面部症

左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎若色赤

者熱也宜隨症治之

薛按左腮屬肝其色青者為順白者為逆若色赤主

肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛瘰癧赤主潮熱

痰嗽右腮屬肺其色白者為順赤者為逆若赤色甚

者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤澀或淋閉不通額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛癰瘕啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚疳骨熱鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便秘而鼻燥衄血額屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

目部症

欽定四庫全書

醫部全錄
卷五十一

三

目內色赤者心實熱導赤散淡紅者心虛熱生犀散青者肝實熱瀉青丸淡青者肝虛熱地黃丸黃者脾實熱瀉黃散微黃者脾虛熱益黃散白而混者肺實熱瀉白散目無睛光者腎虛也地黃丸主之

薛按目者五臟之精華各有所主白睛屬肺黑睛屬肝上下眼胞屬脾紅脈屬心瞳人屬腎此五臟之正色也然白睛本屬肺而見紅色此心剋肺之賊邪也見青色此肝乘侮之微邪也見黑色此腎乘肺之實

邪也見黃色此脾乘肺之虛邪也餘倣此

五臟虛實寒熱

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困卧而悸心熱則合面睡或上竅咬牙者導赤散主之○心氣實而喜仰卧者瀉心湯主之

薛按前症若心小腸實熱宜治以前藥若心肝血虛用五味異功散加當歸若因心血不足用秘制安神丸若肝心血燥用柴胡梔子散若因肝心血虛用六

欽定四庫全書

醫部全錄
卷五十一

四

味地黃丸若因脾虛食鬱生痰而驚悸不安者宜用四君子以健脾神麴麥芽以消導山梔柴胡以清熱如用前方病氣雖去前症仍作急調補元氣或反甚急溫補元氣凡此多因妊娠厚味七情或小兒乳哺失宜或乳母飲食鬱怒所致病氣既見形氣已虛必當推其所因而以助胃壯氣為主佐以治病之劑為善餘倣此

肝主風實則面青目直叫哭壯熱煩急頓悶虛則咬牙

呵欠○肝熱則手尋衣領及亂捨物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之

薛按前症若肝木實熱生風而自病肺金實熱而尅木者宜用前二藥以瀉其邪氣之實若肝經風熱而目直等症者用柴胡梔子散以清肝火加味四物湯以養肝血若腎虛而咬牙諸症者用六君子湯以健脾土六味地黃丸以滋腎水苟不審其症之虛實而妄用前藥則虛虛之禍不能免矣

欽定四庫全書

卷五十五

五

肝有風則目連翳得心熱則發搐或筋脈牽掣而直視用瀉青丸以治肝導赤散以清心○肝熱則目赤或兼青發搐者亦用前二藥風甚則身反張強直用地黃丸以補腎瀉青丸以治肝

薛按前症若肝經實熱而自病宜用瀉青丸若肝經血燥而自病用抑肝散腎水虛不能生肝者宜用地黃丸若脾土虛不能培木者宜用六君子湯凡肝經既病風火相搏則肝臟虧損若不固根本必變他症

百出也

脾主困實則身熱引飲用瀉黃散虛則吐瀉生風用異功散 面白腹痛口中氣冷不思飲食或吐清水以益黃散溫補脾虛下利用調水丸 呵欠多睡者脾氣虛而欲發驚也

薛按前症若發熱作渴喜冷飲食或泄瀉色黃睡不露睛屬形病俱實宜用瀉黃散疏導之若發熱口乾惡冷飲食或泄瀉色白睡而露睛屬形病俱虛宜用

欽定四庫全書

卷五十五

六

異功散調補之若脾氣下陷者補中益氣湯升補之寒水侮土者益黃散溫補之肝木尅土者六君柴胡平補之若目睛微動潮熱抽搐吐瀉不食宜用秘旨保脾湯凡小兒諸病先當調補脾胃使根本堅固則諸病自退愚治沈氏子吐瀉腹痛手足並冷余謂此脾土虛弱寒水所侮先用益黃散一劑諸症頓愈手足稍冷此寒水退而脾土虛弱也用異功散少加木香一劑却去木香再劑而痊

一小兒傷食發熱吐瀉腹痛欲服益黃散余曰內有丁香良薑非其所宜前症乃脾胃受傷而無寒症不信仍服前藥其痛益甚二便不通口舌糜爛而殁肺主喘實則悶亂氣急喘促飲水虛則哽氣出氣肺熱則手搥眉目鼻面用甘桔湯主之○肺感復感風寒則胸滿氣急喘嗽上氣先用瀉白散以清肺氣後用大青膏以散風寒○肺臟怯則唇白用阿膠散補之悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛甚也

欽定四庫全書

卷五十一

八

薛按前症若膝理不密外邪所感而肺病者用清肺丸若脾胃氣虛不能相生而肺病者用六君子湯若脾胃氣實大腸不利而肺病者用瀉黃散若心火炎燔肺金而肺病者用地黃丸

腎主虛若胎虛怯神氣不足目無睛光面白顫解此皆難育雖育不壽或更加色慾變症百出愈難救療或目畏明下竅者蓋骨重而身縮也咬牙者腎水虛而不能制心火也皆用地黃丸

薛按潔古先生云下竅者腎氣不足而足發熱故不喜衣覆也蓋臍以下皆腎之所主緣心氣下行於腎部也所以宜用地黃丸壯水制火而補腎故凡此必待精血完固而後嫁娶庶可以免前患精血篇云男子精未滿而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾令小兒稟賦不足豈有不本於此哉

詳見精血篇

變蒸

欽定四庫全書

卷五十一

八

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後即長骨脈五臟六腑之神智也變生易也自內而長自下而上又身熱故以生之日後三十二日一變蒸即智意有異於前何也長生臟腑智意故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日百段而三十二日計三百二十段為一遍亦曰一蒸骨之餘氣一自臍分入軀中作三十二齒而齒牙不及