

現代醫學小學叢書

花柳病的預防及治療

車鴻彝編

第一種

上海北新書局發行

敘

近世公共衛生學與醫學最偉大的理想目標之一，就是要撲滅人類的傳染病。傳染病在人類一切疾病之中，佔着首要的數目。伴着近世物質文明的發展，醫學在這一方面的造就，使過去種種最恐怖的急性流行病如鼠疫、天花、虎疫、腦膜炎……等，大為減少，其中如鼠疫，更幾乎在人類中已經絕跡了。

敘

但是，在傳染病的另一方面，如像肺癆與花柳病，却反而隨着物質文明的發展而增加，這大概是文明愈進步，都市生活愈益複雜，同時此種病症的刺戟與傳染的機會也愈益增多的緣故吧。

目前我們對於肺癆病的豫防與治療，還沒有妥當正確的根本辦法，結核菌之不能迅速擴清，當然是不足為怪

的。可是就花柳病而論，不管是梅毒、淋病、下疳，只要即時發見，沒有一樣不能根本治療和根本預防的；而我們却眼睜睜的看着，在夜神的羽翼之下，所謂文明都市之中，花柳病的新製者，每天總大批地生產，絡繹不絕，這實在是
非常可怪的現象！

推究到花柳病蔓延的責任問題：政府衛生機關不能辭其責；醫師之責任次之；而應負責任之最大者，厥為社會公

衆。因為，娼妓的檢查與取締，乃政府之責，治療乃醫師之責，這都是屬於他動消極方面的補救辦法；至於積極的講求攝生與防病常識，從根本上消滅花柳病傳播的機會與猖獗的原因，這就是公衆自身的重大責任。

性慾是人類的本能，因此也是人生幸福的一部份。有節制的、清潔的性慾生活，是康健與愉快達到光明的大道；花柳病就是這大道中的污穢荊棘。最不

幸的是它還會傳染和遺傳，不僅破壞了個人的健康，並且破壞了社會與民族的健康！

這一本小冊子雖只有三萬多字，可是關於花柳病的普通常識，總算是提綱挈領概括地講了一些，足夠普通人對於本病得到一個明確的認識：健康者不致盲人瞎馬的胡亂嘗試；既病者可以知道攝生及治療上正當的方針。

目次

何謂花柳病……………一

第一 淋病……………二

(一) 男子的淋病……………四

A 急性淋病……………四

B 急性淋病的併發症……………六

攝護腺炎……………七

精囊炎……………八

急性膀胱炎……………八

腎盂炎……………九

副睪丸炎……………九

O 慢性淋病……………一一

慢性前部尿道炎……………一二

慢性後部尿道炎……………一二

尿道狹窄……………一二

(二) 女子的淋病……………一四

急性尿道炎……………一四

急性膀胱炎·····	一五
副尿道炎或尿道周圍炎·····	一六
啤爾氏腺炎·····	一六
膺前庭炎·····	一七
淋毒性膺炎·····	一七
少女的膺前庭炎和膺炎·····	一八
子宮淋·····	一八
喇叭管炎·····	一九
(三)其他的淋菌性疾患·····	一九
A 直腸淋疾·····	一九

B 淋毒性結膜炎·····	二〇
C 淋菌性關節炎及心臟疾患·····	二一
(四)淋病與結婚和月經 時的注意 ·····	二二
(五)淋病的豫防法·····	二四
(六)淋病的攝生法·····	二七
(七)淋病的治療·····	三四
慢性淋病難於根治之組織的 關係·····	三六
治療困難的關係·····	三七
什麼是正確的根本治療法·····	三九

第二 梅毒……………四二

(一)梅毒的歷史……………四二

(二)梅毒的症狀及經過……………四四

一、初期硬結……………四九

二、第二期梅毒……………五一

三、第三期梅毒……………五二

四、第四期梅毒……………五四

五、惡性梅毒……………五五

六、遺傳梅毒……………五六

(三)梅毒的豫防法……………五九

(四)梅毒與結婚……………六〇

(五)梅毒的豫後……………六一

(六)梅毒患者的攝生……………六二

(七)梅毒的治療法……………六四

A 六〇六注射時的注意……………六七

B 六〇六注射後的副作用……………六八

C 靜脈內注射後的攝生……………六九

D 遺傳梅毒的治療……………六九

E 梅毒治療的標準……………七〇

(八)梅毒不完全治愈的害處……………七一

(九) 梅毒與生殖作用·····	七四
(十) 梅毒與妊娠·····	七六
(十一) 娼妓與梅毒·····	七八
第三 軟性下疳·····	七九
(一) 原因·····	七九
(二) 症候及經過·····	八一
(三) 療法·····	八五
(四) 娼妓與軟性下疳·····	八七
第四 橫痃·····	八八
(一) 原因·····	八八

(二) 症候及經過·····	八八
(三) 療法·····	九〇
附錄·····	九一
花柳病豫防的法令·····	九一
普通人與學生的花柳病·····	九二
各國軍隊的花柳病·····	九三

花柳病的豫防及治療

何謂花柳病？

花柳病這個名詞，是指淋病、梅毒、軟性下疳三種疾病而言。這三種疾病的原因各有特別的病菌，它們傳染之速，蔓延之廣，超過其他病菌之上，所以人類健康的大敵，第一就要算是花柳病了。傳染這種病毒的重要徑路，大都

由於男女的交媾。因為本病多起於折花攀柳，所以叫做花柳病，就是認牠為一種風流疾病的意思。現在將這三種疾病的原因、病狀、豫防、攝生及治療上之注意，用通俗而簡明的文字分別敘述於下，使讀者知道花柳病是什麼，或者能使健康的人們曉得這種疾病的厲害，不敢輕於嘗試；對於已經染毒的病者，得

到正確的指示，曉得如何調養，如何醫治，才能根本治療，早日恢復健康，不致貽害終身。這就是編者的一點希望。

第一 淋病

淋病俗稱白濁，想來大家對於這個病名的印象是很深的，每天在報章、雜誌、街頭牆壁上，不是觸處都可以看見醫治白濁的廣告嗎？我們由此可知這個


疾病的普遍性，不然，他們為什麼願費許多金錢來大事宣傳呢？

淋病的病原是一種病菌——即淋菌——發生於尿道或子宮等部的疾病。

淋菌是一種雙球菌，形如咖啡實，兩重排列，多存在於膿（白血球之一種）及上皮細胞（蔽尿道粘膜的細胞）之間，或居於細胞之外。淋菌浸入尿道後，不久就會竄入組織內。白血球將一部分淋菌蝕滅，與白血球、上皮細胞、

淋病重菌球

第一 淋病



粘液等混合而成黃色的膿，向外流出。膿內含有多數的淋，而溷濁的尿中即混有膿汁，故於病人的尿中，即可證明有多數的淋菌。淋菌有強烈的病毒，故與病者性交，是難免要受其傳染的。

淋病大都發生於泌尿器——即尿道、攝護腺、膀胱、腎臟、副睪丸、子宮、喇叭管、卵巢等——侵及全身的比較稀少。有時淋菌竄入

血液內，因此侵及關節、心臟，致釀成生命的危險；就是不侵及全身，祇發尿道等疾患時，如其反應過強，也有發熱、倦怠、頭痛、嘔吐、食慾不振、關節痛等全身症狀。

(一) 男子的淋病


A. 急性淋病

在不潔的交媾之後，經過幾天纔發現淋病呢？這須視淋菌的毒力，或侵入

尿道內病菌的數目，和個人的抵抗力等關係而定，頗不一致。急性尿道炎通常在二三日後，排尿時感覺尿道內有刺樣的疼痛，尿道口發赤腫脹，尿道口唇互相粘着，稍微壓迫，就有粘液或膿汁流出，膿內含有多數的淋菌。以後尿道發生炎症——因淋菌而起的病的變化——尿道粘膜發赤腫脹，灼熱，疼痛，膿汁更多，疼痛劇烈，在放尿的時候更甚，恰如熱水由尿道流出，或尿道內有如錐

圖 剖 解 道 尿 子 男

第一
淋病



- | | |
|----------|------------|
| 1. 腹膜 | 10. 攝護腺小囊囊 |
| 2. 恥骨縫合 | 11. 攝護腺 |
| 3. 尿道 | 12. 戈伯爾氏腺 |
| 4. 尿道海綿體 | 13. 尿道海綿體球 |
| 5. 陰莖海綿體 | 14. 側睪丸 |
| 6. 膀胱 | 15. 副睪丸 |
| 7. 精囊 | 16. 睪丸 |
| 8. 輸精管 | 17. 陰莖 |
| 9. 射精管 | |

刺樣的感覺，夜間因陰莖易於勃起，更增加病人的痛苦。有時在膿中混有少許血液。

在這個時期，龜頭或包皮有發現腫脹而成包莖的，有時還要發生橫痃。

這種劇烈的現象經過八天到十天以後，各種症候漸漸減輕，膿量減少，疼痛減輕，發赤腫脹也漸漸消失。如此時怠於治療，就會變成慢性，難有治愈的希望了。

B. 急性淋病的併發症

急性淋病能夠惹起各種併發症，如前所述的龜頭或包皮的炎症，或發生橫痃。尿道內的腺很多，如被淋菌侵入，即在尿道的周圍發生膿瘍，從陰莖外面，便可觸覺有硬固的塊狀。又有在尿道口附近的小孔內流膿的，這是因為病菌侵入副尿道的關係。尿道的前後之間，有戈伯爾氏腺，如被病毒侵害，則

在會陰部——即肛門和陰囊之間——發生疼痛的腫物，有向外部破潰的，有經過相當時期，自然被吸收而消失的。

此外所有的主要併發症，分別述敘如次：

攝護腺炎

攝護腺是圍繞後部尿道的一個腺，位於膀胱之前，大如一栗，腺內有多數排洩管。無論急性或慢性尿道炎，都能

使攝護腺發生炎症。在急性攝護腺炎的時候，腺腫脹可由肛門內觸覺，肛門內常有不快的感覺或疼痛，大小便都沒有節制，時時想解，或者小便不能解出。也有發熱的。上述症狀若更加劇烈，即成攝護腺化膿，結果向尿道或直腸或會陰部破潰，流出膿汁。

慢性的攝護腺炎，有的是急性的後遺症，但大多續發於慢性後部尿道炎，此時少有自覺症狀，不過在肛門或會陰

等部，覺有重感，有時亦現疼痛，尿意頻數（時時要解小便），又在射精時感覺疼痛，尿溷濁，尿內有如絲狀的塵渣。

精囊炎

精囊是從辜丸、輸精管而入尿道間的一個囊，牠的作用是拿來儲留從辜丸內產生的精蟲的。位於膀胱的後方，由精囊發出的射精管，通過攝護腺，而入

後部尿道。所以在後部尿道發炎時，容易引起精囊炎，同時發生副辜丸炎或攝護腺炎。生急性精囊炎的時候，大多發現疼痛、發熱、和尿意頻數；也有完全不現此等症狀的。此時尿中混有精液、膿或血，想得詳細的診斷，非求醫師不可。也有發生膿瘍而向直腸破潰的。

急性膀胱炎

膀胱爲囊形，牠的作用是儲留由腎

臟分泌的尿。位置在恥骨（有陰毛處的骨）的後方。膀胱下面與後部尿道相通，上面由輸尿管而與左右的腎臟連接。

患尿道淋病的時候，祇要淋菌侵入裏面，就會發生膀胱炎，此時尿意時時催促，夜間不得安眠，常現血尿、發熱，壓其下腹部即感疼痛，有時小便不通，這雖有自然治愈的，但大多陷於慢性的症狀。

腎盂炎

若病毒從膀胱上昇，就通過輸尿管而達腎盂，即起腎盂炎。腎盂炎是比較很少的疾患，病時有惡寒、發熱、頭痛、腎臟部疼痛。

副睪丸炎

副睪丸位於睪丸輸出精蟲的中途，就是睪丸與輸精管之間的一部分，蔽於