

本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二 喬木類五十二種

藥木 本經 卽黃藥

檀桓 拾遺

小藥 唐本

黃櫨 嘉祐

厚朴 本經 爛羅勒附浮 杜仲 本經

椿樗 唐本

漆 本經

梓 本經

楸 拾遺

桐 本經

梧桐 綱目

罌子桐 拾遺 附

海桐 開寶 雞桐附

棟 本經

槐 本經

檀 拾遺

莢蒾 唐本

卷下 秦皮 本經

合歡 本經

阜莢 本經 鬼阜莢附

肥阜莢

綱目

無患子

開寶

欒華

本經

無食子

唐本卽沒食子

訶黎勒

唐本

婆羅得

開寶

檉

別錄

柳

本經

檉柳

開寶

水楊

唐本

白楊

唐本

扶移

拾遺

松楊

拾遺

榆

本經

榔榆

拾遺

蕪荑

別錄

蘇枋木

唐本

烏木

綱目

樺木

開寶

緌木

拾遺

櫚木

拾遺

欒櫚

嘉祐

櫚木

拾遺

柯樹

拾遺

烏臼木

唐本

巴豆

本經

大風子

補遺

海紅豆 海藥

相思子 綱目

豬腰子 綱目

石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二 喬木類五十二種

藥木 本經 即黃藥

檀桓 拾遺

小藥 唐本

黃櫨 嘉祐

厚朴 本經 浮 杜仲 本經

椿樗 唐本

漆 本經

梓 本經

楸 拾遺

桐 本經

梧桐 綱目

罌子桐 拾遺 附

海桐 開寶 附

棟 本經

槐 本經

檀 拾遺

莢 唐本

卷下 秦皮 本經

合歡 本經

阜莢 本經 鬼阜莢附

肥皁莢

綱目

無患子

開寶

欒華

本經

無食子

唐本即
沒食子

訶黎勒

唐本

婆羅得

開寶

櫟

別錄

柳

本經

檉柳

開寶

水楊

唐本

白楊

唐本

扶移

拾遺

松楊

拾遺

榆

本經

榔榆

拾遺

蕪荑

別錄

蘇枋木

唐本

烏木

綱目

樺木

開寶

緌木

拾遺

櫚木

拾遺

欒櫚

嘉祐

櫛木

拾遺

柯樹

拾遺

烏臼木

唐本

巴豆

本經

大風子

補遺

海紅豆 海藥

相思子 綱目

豬腰子 綱目

石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

本草綱目木部第三十五卷上

木之二 喬木類五十二種

藥木

本經中品

釋名黃藥

別錄

根名檀桓

時珍曰藥木名義未詳本經言藥木及根不言藥皮

豈古時木與皮通用乎俗作黃柏者省寫之謬也

集解

別錄曰藥木生漢中山谷及永昌宏景曰今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色

淺其根於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡恭曰子藥亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥所在有之今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀本圖經云黃

藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮
外白裏深黃色其根結塊如松下茯苓今所在有
本出房商合等州山谷中皮緊厚二三分鮮黃者
上二月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下用
之邵陵者治表治上用之各適其宜爾頌
曰處處有之以蜀中出者肉厚色深為佳

脩治

數曰凡使藥皮削去粗皮用生蜜水浸半日
漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度每

五兩用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦
不制治下焦也時珍曰黃藥性寒而沉生用則降
實火熟用則不傷胃酒制則治
上鹽制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒

元素曰性寒味苦氣味俱厚沉而
降陰也又云苦厚微辛陰中之陽

入足少陰經為足太陽引經藥好古曰黃芩梔子
入肺黃連入心黃藥入腎燥溼所歸各從其類也
故活人書四味解毒湯乃上下內外
通治之藥
○之才曰惡乾漆伏硫黃
主治五臟腸

胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷

蝕瘡

本經

療驚氣在皮閒肌膚熱赤起目熱赤痛口

瘡久服通神

別錄

熱瘡炮起蟲瘡血痢止消渴殺蛙

蟲

藏器

男子陰痿及傳莖上瘡治下血如雞鴨肝片

甄權

安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺

疳蟲治虵心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛

大明

膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸

痿癱瘕利下竅除熱

素元

瀉伏火救腎水治衝脈氣

逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍

李杲

得知母滋

陰降火得蒼朮除溼清熱為治痿要藥得細辛瀉

膀胱火治口舌生瘡震亨傳小兒頭瘡時珍

發明元素曰黃蘗之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦溼腫三也痢疾先見血

四也臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水

膀胱不足諸痿躄腳膝無力黃芪湯中加用使兩

足膝中氣力涌出痿軟即便去也乃癰瘰必用之

藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡

舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃含之也杲曰黃蘗

蒼朮乃治痿要藥凡去下焦溼熱作腫及痛并膀胱

有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃蘗

知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者

邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源

也法當用氣味俱薄淡滲之藥豬苓澤瀉之類瀉

肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分

不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以

生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉
氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治
之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成
中滿腹堅如石腳腿裂破出水雙睛凸出飲食不
下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍矣
予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致
膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難
經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言
熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水
所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾肉
桂一錢爲引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯
下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如瀑泉涌出床
下成流顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎
惡燥急食辛以潤之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤
燥爲君知母之苦寒瀉腎火爲佐肉桂辛熱爲使
寒因熱用也震亨曰黃蘗走至陰有瀉火補陰之
功非陰中之火不可用也火有二君火者人火也
心火也可以溼伏可以水滅可以直折黃連之屬

可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不
可以水溼制之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可
以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有
金水相生之義黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋
黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋
腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以爲滋陰降火
要藥上古所未言也蓋氣爲陽血爲陰邪火煎熬
則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣
盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者
久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人
用補陰藥往往以此二味爲君日日服餌降令太
過脾胃受傷眞陽暗損精氣不暖致生他病蓋不
知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之
害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷
胃不能生
陰之戒

附方

舊十二新
三十一

陰火爲病

大補丸用黃蘗去皮鹽
酒炒褐爲末水丸梧子

大血虛四物湯下氣虛男女諸虛孫氏集效方坎

四君子湯下丹溪方人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃蘗去皮

切二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九曬蒸過曬研為末酒煮麪糊丸梧上盛下虛水偏盛

子大每服一百丸溫酒送下黃蘗一斤分作四分用醱酒蜜湯鹽水童尿浸洗

曬炒為末以知母一斤去毛切搗熬膏和丸梧子大每服七十丸白四治坎離諸丸方見草部臟毒

湯下活人心統四治坎離諸丸蒼朮下痔漏皮刮淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各

浸七日洗曬焙一分生炒黑色為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十丸久服除根楊誠經驗

方百補丸專治諸虛赤白濁用川藥皮刮淨一斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切研

廩米飯丸如上法服又陸一峰藥皮丸黃蘗一斤分作四分三分用醱酒鹽湯童尿各浸二日焙

研一分用酥炙研末以豬臟一條去膜下血數升

入藥在內紫煮熟搗丸如上法服之

黃蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆小兒

大每服七丸溫水下名金虎丸普濟方

下血或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻

集效妊娠下痢炒白色晝夜三五十行根黃厚者蜜

和丸梧子大每空心米飲下三五小兒熱瀉黃

丸日三服神妙不可述婦人良方

削皮焙為末用米湯和丸粟米大每赤白濁淫及

服一二二十丸米湯下十全博救方

洩精滑真珠粉丸黃蘗炒真蛤粉各一斤為末每

服一百丸空心溫酒下黃蘗苦而降火蛤粉鹹而

補腎也又方加知母炒牡蠣粉煨山藥炒等分為

末糊丸梧子大每服八十丸鹽湯下潔古家珍

積熱夢遺

藥心忪恍惚膈中有熱宜清心丸主之黃

蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每