

脈

經

脉經十卷

四部叢刊初編子部

上海商務印書
館縮印元刊本

脉經序

晉太醫令王叔和撰

朝散大夫光祿卿其閭判別闈檢院護軍臣林億等類次

脉理精微其體難辨絃緊浮芤沉轉相類在心易了指下難明謂沈爲伏則方治永乖以緩爲遲則危殆立至況有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥爲用性命所繫和鵠至妙猶或力思仲景明審亦候形證一毫有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述與而不售遂令末學昧於原本平茲偏見各逞己能致微疴成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集岐伯以來逮于華陀經論要決合爲十卷百病根源各以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴呂葛張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微頤則可以比蹤古賢代無夭橫矣

天地以生物爲心叔子之聖賢第古之倫教人以勞而濟人之生也得其書而自秘者豈天地聖賢之心乎夫治病莫重於明脉之法多出於王氏脉經之爲精深本堂而莊不以秘先以傳當好濟人之道且委負古今著書之志云者天慶庚午仲夏達安集日增誌于廣勤書堂

新刊王氏脉經目錄

卷第一

辨脉形狀指下祕訣

平脉早晏法

分別二關境界脉候所主

辨尺寸陰陽榮衛度數

平脉視人大小長短男女逆順法

持脉輕重法

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順

辨脉臟病脉陰陽大法

平虛實

辨脉陰陽太法

辨父性恐怖雜脉

從橫逆順伏匿脉

平人得病所起脉

遲疾短長雜病法

辨父性恐怖雜脉

診病將差難已脉

卷第二

平二關陰陽二十四氣脉

平二關病候并治宜

平人迎神門氣口前後脉

平奇經八脉病(經故以繫此卷之末)

平二關陰陽二十四氣脉

平二關病候并治宜

卷第三

肝膽部

心小腸部

脾胃部

肺大腸部

腎膀胱部

平雜病脉

卷第四

辨二部九候脉證

平雜病脉

診五藏六腑氣絕證候

診四時相反脉

診損至脉

診脉動止投數疎數死期年月

診百病死生決辨二部九候脈證

卷第五

張仲景論脉

扁鵲陰陽脈法

扁鵲華佗察擊色要訣

診三部虛實決死生

扁鵲諸反逆死脉要訣

平陽毒陰毒百合狐惑脉證

卷第六

肝病證

膽病證

心病證

小腸病證

脾病證

胃病證

肺病證

大腸病證

腎病證

膀胱病證

三腹病證

平血脈虛勞脉證

卷第七

平消渴小便利淋脉證

病不可發汗證

平黃疸寒熱脈證第

病發汗以後證

平胃脾心痛短氣貢脈證

病可吐證

平驚悸衄吐下血冒滿瘀血脈證

病可下證

平肺痿肺癰勞瘵上氣喘飲脉證

病可溫證

平癰腫脹癰瘍侵淫脉證

病可灸證

平帶下絕產無子亡血居經證

病可刺證

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證

病不可水證

平咽喉中如有炎熱惡熱入血室腹滿證

病可火證 热病生死期日證
熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證
重寢重虛陰陽相附生死證 热病十逆死日證
热病五藏氣絕死日證 热病至脉死日證
热病損脉死日證

卷第八

平卒戶厥脉證

平瘡濕腸脉證

平霍亂轉筋脉證

平中風厥筋脉證

平黃疸寒熱脈證第

平腹滿寒疝宿食

平胃脾心痛短氣貢脈證

平五藏精氣脉證

平消渴小便利淋脉證

平水氣黃汗氣分脉證

平驚悸衄吐下血冒滿瘀血脈證

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證

平癰腫脹癰瘍侵淫脉證

平嘔噦下痢脉證

平帶下絕產無子亡血居經證

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證

卷第九

平妊娠分別男女將產諸證

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證

平產後諸病帶晉中風發熱煩嘔下利證

平帶下絕產無子亡血居經證

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證

平婦人病生死證

平小兒雜病證

卷第十

○手檢圖二十一部

目錄單

新刊王氏脉經卷第一

朝散大夫光祿卿秘閣校理翰林院謹草臣林憲等類次

遲脈呼吸三至半衆極遲一日率之不足按之盡半率之無有

結脉往來緩時一止復來按之更來小時指者名結率初來

動止更來小時指者名結率之則

結陰

○脉形狀指下秘決第二十四種

浮脉舉之有餘按之不足浮於手下

芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實一日手下

洪脉極大在指下而大

滑脉往來前却流利展轉替易然與數相似一日手下無觸傍有

數脉去來促急一日發者息上七至八

促脉來去數時一止復來

弦脉舉之無有按之如弓弦狀一日如張弓弦拔之不移又曰浮緊爲弦

緊脉數如切繩狀一日如彈常

沈脉舉之不足按之有餘一日重得

伏脉極重指按之著骨乃得之無有一口閉沈不出名曰伏舉

革脉有似沉伏實大而長微絃革爲半

實脉大而長微強按之隱指愜愜然一日沈

微脉極細而軟或欲絕若有若無一日薄一日按之如臘墨一日

濡脉細而遲往來難且散或一上復來短而止或曰散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細一日濡之無有

弱脉極軟而沈細按之欲絕掉一日散之無有

虛脉遲大而軟按之不足陰指豁豁然空

散脉大而散者氣實血虛有表無裏

緩脉去來亦遙小駛於遲一日浮大而軟

軟脉極軟而浮細一日濡之無有

弱脉極軟而沈細按之欲絕掉一日散之無有

虛脉遲大而軟按之不足陰指豁豁然空

散脉大而散者氣實血虛有表無裏

緩脉去來亦遙小駛於遲一日浮大而軟

軟脉極軟而浮細一日濡之無有

弱脉極軟而沈細按之欲絕掉一日散之無有

虛脉遲大而軟按之不足陰指豁豁然空

散脉大而散者氣實血虛有表無裏

緩脉去來亦遙小駛於遲一日浮大而軟

軟脉極軟而浮細一日濡之無有

弱脉極軟而沈細按之欲絕掉一日散之無有

辨尺十陰陽掌衛度數第四

夫十二經皆有動脈獨取十口以決五藏六腑死生吉凶之候

三寸一吸脉行三十呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十度行陰亦二十五度爲一周時故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五藏六腑之所始終故法取於寸口脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大會要也從關至尺是尺寸內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺寸爲十故陰得尺寸一寸陽得寸內九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

脉有太過有不及有陰陽相乘有壅有溢有鬱有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遠上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脉也關之後者陰之動也脉當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲攢爲內關外格此陽乘之脉故曰攢溢是真藏之脉也人不病自死

平脉視人大小長短男女逆順法第五

久診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者則吉反之者則爲逆也脉二部大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒四五歲脉呼吸八至細數者吉千金裏云人大而脉細細而脉大柔而脉實人苦而脉虛逆則難治反此為順一則易治乃婦人脉常外弱弱為逆兒四五歲者脉自厭疾呼吸八至也男女大爲順女右大爲順肥人脈沉瘦人脉浮瘦人脉浮

持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如二菽之重與皮毛相得者肺部也皮毛之間者肺氣所行故言肺部也如二菽之重與血脉也

相得者心部也心主血脉次於肺如六豆之重如九菽之重與肌肉相得者脾部也脾在中央主肌肉故如十二菽之重與筋平者肝部也肝筋又在脾如九豆之重如十二菽之重與筋平者肝部也肝主筋其下故次之按之至膏舉之來疾者腎部也腎主骨其筋主骨故曰輕重也

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

脉法讚云肝心出左脾肺出右腎與命門俱出尺部魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男右大順女關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三先誰陰病治官陽病治府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入

病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太陽爲表裏以小腸合爲府合於上焦名曰神庭在龜鵠尾下五分肝部在左手關上是也足厥陰經也與足少陽爲表裏以膽合爲府合於中焦名曰胞門少陽在太倉左右三十

膀胱合爲府合於下焦在關元左

肺部在右手關前寸口是也手太陰經也與手陽明爲表裏以大腸合爲府合於上焦名呼吸之府在雲門

脾部在右手關上是也足太陰經也與足陽明爲表裏以胃合

爲府合於中焦脾胃之間名曰章門在季脇前一寸半

腎部在右手關後尺中是也足少陰經也與足太陽爲表裏以

膀胱合爲府合於下焦在關元右左屬腎右爲子穴名曰三焦

辨藏腑病脉陰陽大法第八

脉何以知藏腑之病也然數者腑也運者藏也數即有熱達即

生寒諸陽爲熱諸陰爲寒故別知藏腑之病也

附者陽故其脉數者陰故其脉

脉浮陽行浮病見脈陰行疾病則浮

脉來浮大者此爲肺脉也脉來沈滑如石腎脉也脉來如弓弦者肝脉也脉來疾去逢心脉也脉來當見而不見爲病病有深淺但當知如何受邪

辨脉陰陽大法第九

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間

脾受穀味也其脉在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短濶者肺也

肝俱沈何以別之然牛而長者肝也按之亟舉指來實者腎也

脾者中州故其脉在中千金翼云浮者脾也是陰陽之脉也脉有陽

盛陰虛陰陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽

虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也

見十日手而實大今轉手淨之更損減而小故言陰實

言陽虛重于按之久更實大而沈故言陰實

經脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二

陰一陽二陰如此言之子口有六脉俱動耶然經言如此者非

有六脉俱動也謂浮沈長短滑濶也浮者陽也滑者陽也長者

陽也沈者陰也濶者陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脉

來沈而滑也一陰二陽者謂脉來沈滑而長也一陰二陽者謂

脉來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脉來浮而濶

也一陽二陰者謂脉來長而沈濶也一陽二陰者謂脉來沈濶

而短時一浮也各以其經所在名病之逆順也凡脉大爲陽浮

爲陽數爲陽動爲陽長爲陽滑爲陽沈爲陰濶爲陰弱爲陰絃

爲陰短爲陰微爲陰是爲二陰二陽也陽病見陰脉者反也主

死陰見陽脉者順也主生關前爲陽關後爲陰陽數則吐血微則下利陽絃則頭痛陰絃則腹痛陽微則發汗陰微則自下陽數口生瘡陰數加微必惡寒而煩悶不得眠也陰附陽則強陽附陰則癲得陽屬腑得陰屬藏無陽則厥無陰則嘔陽微則不能呼陰微則不能吸呼吸不足膏中短氣依此陰陽以察病也

寸口脉浮大而熱者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱

寸口脉沈細者名曰陽中之陰病苦傷悲不樂惡聞人聲少氣

時汗出陰氣不通臂不能舉

尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脅酸疼不能久立陰氣衰

小便餘瀝隆下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即

陰中痛大便亦然

尺脉牢而長關上無有此爲陰于陽其人苦腰背痛小腹引腰痛

寸口脉壯大尺中無有此爲陽于陰其人苦腰背痛陰中傷足

寒寒夫風傷陽寒傷陰病順陰病逆陽陽病易治陰病難

治在腸胃之間以藥和之若在經脉之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診之虛實脉之虛實者脉來虛者爲虛牢者爲實病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者爲實緩者爲虛急者爲實診之虛實者癥者爲虛痛者爲實外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也

重實者言人熱病熱脈滿是謂重實

問曰經絡俱實如何何以治之答曰經絡皆實是寸脉急而尺緩也當俱治之故曰滑則順濶則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久

從橫逆順伏匿脉第十一

問曰脉有相乘有從仲景從字作縱字有橫有逆有順何謂也師曰水

行乘火金行乘木名曰從火行乘水木行乘金名曰橫水行乘

金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順

經言脉有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也然謂陰陽更相乘

更相伏也脉居陰部反見陽脉者爲陽乘陰也脉雖時沉澀而

短此陽中伏陰脉居陽部反見陰脉者爲陰乘陽也脉雖時浮

滑而長此爲陰中伏陽也重陰者顛重陽者狂脈陽者見鬼脫

陰者目盲

辨災恠恐怖雜脉第十二

問曰脉有殘賊何謂師曰脉有絃有緊有濶有滑有浮有沈此

六脉爲病能與諸經作病

問曰嘗爲人所難擊脉何所從而來師曰假令亡汗若吐肺中

寒故令堅假令欬者坐飲冷水故令濶假令下利者以胃中虛

冷故令緊也

問曰翕微流名曰渦何謂師曰流爲純陰翕爲二陽陰陽和合

故脉滑也

問曰脉有終在何謂師曰假令人病脉得太陽脉與病形證相應因爲作湯比還送湯之時病者因反大吐若下痢仲景痢字作利病

腹中痛因問言我前來脉時不見此證今反變異故是名爲災

恠因問何緣作此吐痢答曰或有先服藥本發作故爲災性也問曰人病恐怖其脉何類師曰形脉如循繩裹束然其面白脫色問曰人魄者其脉何等類師曰其脉自浮而弱面形乍白乍赤問曰人不飲其脉何類師曰其脉自澀而唇口乾燥也言遲者風也搖頭言者其裏痛也行遲者其表彊也坐而伏者短氣也坐而下一勝者必腰痛裏實護腹如懷卵者必心痛師持脉病人欠者無病也脉之因伸者無病也者病也假令向壁卧聞師到不驚起而目眴視一云反若三言三止脉之咽喉此爲詐病假令脉自和處言此病太虛當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈

逐疾短長雜病法第十二

黃帝問曰全閭胃氣手少陽一焦四時五行脉法夫人言脉有

三陰三陽知病存亡脉外以知內尺寸大小願聞之歧伯曰寸

口之中外別浮沈前後左右虛實死生之要旨見于口之中脉

從前來者爲實邪從後來者爲虛邪從所不勝來者爲賊邪從

所勝來者爲微邪自病一作者爲正邪外結者病癰腫內結者

病疝瘕也間來而急者病正在心癥氣也脉來澀者爲風也脉

也脉逆順之道不與衆謀

師曰夫呼者脉之頭也初持之來疾去遲此爲出疾入遲爲內

虛外實初持脉來遲去疾爲內實外虛也

脈數則在府遲則在藏脉長而弦病在肝病鵲云病出於肝脉小血少

病在心病鵲云病出於心脉大而濡病在腎病鵲云病出於腎脉滑

一作而微浮病在肺病鵲云病出於肺脉大而堅病在脾病鵲云病出於脾脉滑

者多血少氣脉澀者少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來大

而堅者血氣俱實脉小者血氣俱少又云脉來細而微者血氣俱虛沈細滑疾者熱逕緊為寒又云其數滑疾為寒脈盛滑緊者病在外熱脉小實而緊者病在內冷脉小弱而濡者謂之久病

熱陽逢沈細為寒脉盛滑緊者病在外熱脉浮滑其人外熱風走刺有飲難治

脉沈而緊上焦有熱下寒得冷即便下脉沈而細下焦有寒小便數時苦絞痛下利重脉浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便脉洪大緊急病速進在外苦頭發熱癱腫脉細小緊急病速

進在中寒為疝瘕積聚脉中刺痛脉沈重而直前絕者病血在腸間脉沈重而中散者因寒食成癥脉直前而中散絕者病消渴一云病津溢症脉沈重前不至寸口徘徊絕者病在肌肉道尸脉左轉而沈重者氣微陽在管中脉右轉出不至寸口者內有肉癖

脉累累如貢珠不前至有風寒在大腸伏留不去脉累累中止不至寸口軟者結熱在小腸膜中伏留不去脉直前左右彈者病在血脉中脉血也脉後而左右彈者病在筋骨中也脉大後小即頭痛目眩脉前小後大即膏滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少太素細作滑濤則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊革綽綽其去如絃絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而絃急者病在內浮而洪大者病在外脉實者病在內脉虛者病在外在上為表在下為裏浮為在表沈為在裏

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎

脉冬得病無脾脉四季之月得病

假令肝病者西行若食雞肉得之當以秋時發得病以庚辛日也家有腥死女子見之以明要為災不者若感金銀物得之

假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得之不者當以春時發得病以甲乙日也

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸日也

假令肺病南行若食馬肉及蟹鹿肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當以長夏時發得病以戊己日也

假令得王脉當於縣官家得之

假令得相脉當於嫁娶家得之或相廢質家得之

假令得胎脉當於產乳家得之

假令得囚脉當於囚徒家得之

假令得休脉其人素有宿病不治自愈

假令得死脉當於死喪家感傷得之

何以知人露臥得病陽中有陰也

何以知人夏月得病諸陽入陰也

何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但有陰脉來疾去疾此相為水氣之毒也脉遲者食乾物得之

診病將差難已脉第五十五

問曰假令病人欲差脉而知愈何以別之

七

師曰寸關尺大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脉陰陽爲平復當自愈

人病其寸口之脉與人迎之脉大小及浮沈等者病難已

朝散李光德著脉經判別脈論卷之二十一

新刊王氏脉經卷第二

平二關陰陽二十四氣脉第一

平人迎神門氣口前後脉第二

平二關病候并治且第三

平奇經八脉病第四

八脉爲病不在十二經故以繫此卷之末

平二關陰陽二十四氣脉第二

新刊王氏脉經卷第一

車前子口陽實者小腸實也苦心下急憊一作痛小腸有熱小便赤黃刺手太陽經治陽陽者汗太陽在手小指外側本節陷中即後難穴也

左手關前寸口陰實者心實也苦心下毒痛掌中熱時時善嘔口中小便赤黃刺手太陽經治陽陽者汗太陽在手小指外側本節陷中即後難穴也

心主經治陰

左手關上陽絕者無膽脉也若腰疼口中苦眩目善畏如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陰在足大指間即行間穴也或刺三手中車前子口陰實者心實也苦腹中實不安身軀智智也刺足少陽經治陽在足上第二指本節後一寸次指即臨泣穴也

左手關上陰絕者無肝脉也苦癢止渴難言脣下有邪氣善吐吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足厥陰經治陰

左手關後尺中陽絕者無膀胱實也苦逆冷婦人月便不調王

脉即大熱

月則閉男子失精尿有餘澀刺足少陰經治陰在足內踝下動

脉亦也

左手關後尺中陽實者膀胱實也苦逆冷脊下有邪氣相引痛

刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中即東骨穴也

左手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足下熱兩髀裏急精氣竭

少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眴眴耳聾悵

悵善鳴刺足少陰經治陰

左手關前寸口陽絕者無大腸脉也苦少氣心下有水氣立秋

節節欬刺手太陰經治陰在魚際間即太淵穴也

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐刀所刺無

休息時刺手陽明經治陽在手腕中即陽池穴也

右手關前寸口陰絕者無肺脉也苦短氣欬逆喉中塞噫逆刺

手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胃中滿彭彭與有相引

刺手太陰經治陰

右手關上陽絕者無胃脉也苦吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰

經治陰在足大指本節後一寸即公孫穴也

能消刺足陽明經治陽在足上動脈即鷄陽穴也

右手關上陰絕者無脾脉也苦少氣下利腹滿身重四肢不欲

動善嘔刺足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便難刺足太陰經治陰

右手關後尺中陽絕者無子戶脉也苦足逆寒絕產帶下無子

陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛刺足太陽

經治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足逆冷上瘡膏痛夢入水

見鬼惡狀黑色物來擾人上刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰實者腎實也苦脅疼腰脊痛內寒熱刺足少陰經治陰

右寸口人迎以前脉陰實者手厥陰經也病苦悶大便不利

腹滿四肢裏身熱苦冒脹刺二里

右脉二十四氣事

平人迎神門氣口前後脉第二

心實

右寸口人迎以前脉陰實者手厥陰經也病苦悶大便不利

腹滿四肢裏身熱苦冒脹刺二里

右寸口人迎以前脉陰實者手太陽經也病苦悶恐不樂心

腹痛難以言心如寒狀恍惚

小腸實

右寸口人迎以前脉陰實者手太陽經也病苦悶熱來去

汗出作汗而煩心中滿身重口中生瘡

小腸虛

右寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顛僻頭痛

耳癟痛

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與太陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得眠以胃氣不轉水穀實也

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒肢冷

肝實

左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自忿怒如怒狀

肝虛

左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脅下取裏熱腹滿不欲飲食腹脹惕慄不樂婦人月經不利腰腹痛

膽實

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛酒洒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搔蹙坐不能起僵仆目黃失精睂瞓

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚戶厥不知人妄見少氣不能言時時自驚

腎實

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦膀胱張閉少腹與腰脊相引痛

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩喘乾音腸時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背僵急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑耳聾

腎虛

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地

膀胱實

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腰中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛

膀胱虛

左手尺中神門以後脉陽虛者足少陰與太陽經俱實也病苦脊彊反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛皆寒時時少腹滿

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足太陰經也病苦肺脈汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀

肺實

肺虛

右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息喘乾不朝津液

大腸實

右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腹滿善噏飲面赤身熱喉咽一本作中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胃中喘脹鳴虛渴脣口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實虛病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖

脾實

右手寸口氣口以前脉陰實者足太陰經也病苦足寒脰熱腹脹滿煩擾不得卧

不得卧

脾虛

右手關上脉陰虛者足太陰經也病苦腹中堅痛而熱汗不出如溫瘡脣口乾善噏乳癰缺盆腋下腫痛

不得卧

胃實

右手關上脉陽實者足太陽經也病苦腹中堅痛而熱病苦頭項痛

金作汗

胃虛

右手關上脉陽虛者足太陽經也病苦脛寒不得卧惡寒洒酒目急腰中痛虛鳴外臺門時寒時熱脣口乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脉陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅脹脇下痛胃氣不轉大便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不出喉渾精少

脾胃俱虛

右手關上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒油注不已

腎實

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦脾身熱心痛脊脅相引痛足逆熱煩

腎虛

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足寒上重下輕行不可以接地少腹脹滿上捨肩脅痛引肋下

膀胱實

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦轉胞不得小便頭眩痛煩滿脊背彊

膀胱虛

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動腳中筋急耳聾忽忽不聞惡風颶颶作聲

腎膀胱俱實

右手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也
病苦癲疾頭重與目相引痛厥欲起走反眼大風多汗

腎膀胱俱虛

右手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也
病苦心痛在重不自收舉反出時時舌洞泄寒中泄肾心俱
痛○一說云腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右
腎合三焦

平三關病候并治第三

寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府向
火灸身摩治風膏覆令汗出

寸口脉緊苦頭痛骨肉疼是傷寒宜服麻黃湯發汗針眉衝顚
顚摩治傷寒膏

寸口脉微苦寒爲劔宜服五味子湯摩茱萸膏令汗出

寸口脉數即爲吐以有熱在胃管裏胃中宜服藥吐之及針胃
管服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜服
知母湯

知母湯

寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄熨之摩
以風膏并諸治風穴

寸口脉滑陽實者中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕鴻之
寸口脉絃心下幅幅微頭痛心下有水氣宜服甘遂圓針期門
鴻之

寸口脉弱陽氣虛自汗出而短氣宜服伏苓湯內補散適飲食
消息勿極勞針胃管補之

寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針二里
寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針二里

補之作胃管

寸口脉芤孔泄血微芤者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃土
湯灸膻中

寸口脉伏胃中逆氣噎塞不通是胃中冷氣上衝心胃宜服前
胡湯大三建圓針巨闕上管灸膻中

寸口脉沉胃中引脅痛胃中有水氣宜服澤漆湯針巨闕鴻之

寸口脉濡陽氣弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯著預圓內
補散牡蠣散并粉針太衝補之

寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯調
和飲食以緩之

寸口脉實即生熱在肺肺喘逆氣塞虛即生寒在脾胃食不消
化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒宜服茱萸圓生薑湯

寸口脉細發熱吸吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗
湯炙中府

寸口脉洪大胃脣滿宜服生薑湯白薇圓亦可紫苑湯下之針
上管期門章門

右上部寸口十七條

開脈浮腰滿不欲食浮為虛滿宜服平胃圓伏苓湯生薑前胡
湯針胃管先漏後補之

關脉緊心下苦滿急痛脉緊者為實宜服茱萸圓歸湯又大黃
湯兩治之良針巨闕下管鴻之金云服茱萸圓歸湯之湯又加大黃一二兩佳

關脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子圓針巨闕
鴻之

關脉數胃中有客熱宜服知母圓除熱湯針巨闕上管鴻之

關脉緩其人不欲食此胃氣不調脾胃不足宜服平胃圓補脾湯針焉而補之

關脉滑胃中有熱滑為熱實以氣滿故不欲食食即吐逆宜服紫苑湯下之大平胃圓針胃管瀉之

千金云宜服朴消黃湯平胃圓

關脉絃胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故爾宜服茱萸湯溫調飲食針胃管補之

關脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱為虛熱作病其說不有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之

關脈濇血氣逆冷脉濇為血虛以中焦有微熱宜服乾地黃湯內補散針足太衝上補之

關脉芤大便去血數十者以臟輸傷故也宜服生地黃升生芍皮湯矣肺輸若重下去血者針關元其者宜服龍骨圓必愈

關脉伏中焦有水氣唐世宜服水銀圓針關元利小便溏泄便止關脉沈心下有冷氣苔滿吞酸宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之

關脉濡苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎圓針關元補之

關脉浮中寒宜服桂枝圓茱萸湯針胃管補之

關脉實胃中痛宜服施子湯朱萸烏頭圓針胃管補之

關脉牢脾胃氣壅盛熱即腹滿響聲宜服紫苑圓鴻脾圓針灸胃管鴻之

關脉洪胃中熱必煩滿宜服平胃圓針胃管先瀉後補之

右中部關脈十八條

尺脉浮下熱風小便難宜服麥門冬湯滑石散針橫骨關元瀉之尺脉緊脈下痛宜服當歸湯次天樞針關元補之

尺脉微脈逆小腿中拘急者寒氣宜服小建中湯一本更有金氣海

尺脉數惡寒脉下熱痛小便亦黃宜服雞子湯曰魚散針橫骨瀉之

尺脉緩腳弱下腫小便難有餘溼宜服滑石湯瞿麥散針橫骨瀉之

尺脉滑血氣實婦人經脈不利男子尿血宜服朴消煎大黃湯下去經血鐵關元瀉之

尺脉弱陽氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃湯芩丹湯針關元補之

尺脉芤小腹急小腹及腳中拘急宜服建中湯當歸湯針血海瀉之

尺脉濡足脛連冷小便亦宜服附子四逆湯針足太衝補之

尺脉乳下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯芩丹田關元亦針補之

尺脉浮小腹痛微疝水穀不化宜服大平胃圓桔梗圓針關元補之

桔梗圓一云桔梗湯圓

尺脉沈腰背痛宜服腎氣圓針京門補之

尺脉濡苦小便難不收風寒宜服瞿麥湯白魚散針關元瀉之

尺脉遲下焦有寒宜服桂枝圓針氣海關元補之

尺脉實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩以利大便

尺脉牢腹滿陰中急宜服草摩子茱萸圓針丹田關元中極

右下部尺脉十六條

平奇經八脉病第四

脉有奇經八脉者何謂也然有陽維陰維有陽蹻陰蹻有衝有

督有任有帶之脉凡此八脉者皆不拘於經故曰奇經八脉也

經有十二絡有十五九二十七氣相隨上下何獨不拘於經也

然聖人圖設華渠通利水道以備不虞天雨降下溝渠溢滿滂

沛妄行當此之時聖人不能復圖也此絡脉流瀆諸經不能復

拘也

奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繫也然陽維者起於

諸陽之會陰維者起於諸陰之交陽維陰維者維絡于身盪蓄

不能環流溉灌諸經者也陽蹻者起於跟中循外踝而上行入

風池陰蹻者亦起於跟中循內踝而上行至咽喉交會衝脈衝

脈者起於關元循腹裏直上至咽喉中

至胃中督脈者起於下極之輪並於脊裏循督上至風府衝脈

者陰脈之海也督脈者陽脈之海也任脈者起於胞門子戶夾

臍上行至腎中

周身作迴身一周此八者皆不繫於十二經故曰奇經八脉

者也奇經之爲病何如然陽維於陽陰維於陰其陽不能

相維悵然失志容容不能自收持即失志

善忘恍惚也為病心痛也

為病急急如火燒急急當從力躁病

以上急外陽蹻爲病陰緩而陽急人當從外躁病即其病急其

緩衝之爲病逆氣而裏急其爲病也急而裏急其爲病也急而

體而厥脉在指病則其任之爲病其內奇結男子爲七疝女子爲瘕聚其病結名七病瘕聚帶之爲病苦腹痛腰痛客客而寒若坐水中狀帶脉皆婦人之身體病即其脉絡故令腰痛也此奇經八脉之爲

病也

診得陽維脉浮者掣起目眩陽盜實苦肩息滿酒如寒

診得陰維脉沈大而實者苦背中痛脇下支滿心痛

診得陰維如黃珠者男子兩脅實腰中痛女子陰中痛如瘡狀

診得帶脉左方遠脣脛脣脊痛衝陰股也

診得陽維脉浮者掣起目眩陽盜實苦肩息滿酒如寒

朝於口其人皆苦恍惚狂疑不者必當由豫有兩心也兩手

脉也衝督之脉者十二經之道路也衝督用事則十二經不復

陽脉浮而細微綿綿不可知但有陰脉亦復細綿此爲陰蹻

陽蹻之脉也此家曾有病鬼魅風死苦恍惚亡人爲禍也

診得陽蹻病拘急陰蹻病緩

尺寸俱浮直上直下此爲督脈腰脊強病不得俛仰大人癲病

小人風癇疾

脉來中央浮直上下痛者督脈也動苦腰背膝寒大人癲小兒

癇也炎頂上三圓正當頂上

尺十脉俱牢

此直上直下此爲衝脈皆中有寒病也

動苦少腹繞臍下引橫骨陰中切痛取臍下二寸