

本草綱目穀部目錄第二十五卷

穀之四

造釀類二十九種

大豆豉

別錄

豆黃

食療

豆腐

日用

陳廩米

別錄

飯

拾遺

青精乾石餽飯

經圖

米餸

綱目

糉

綱目

寒具

綱目

蒸餅

綱目

女麴

拾遺

黃蒸

拾遺

麴

嘉祐

神麴

藥性

紅麴

丹溪補遺

穀米

別錄

即麥芽

穀芽

飴糖

別錄

醬 別錄

榆仁醬 食療

蕪荑醬 食療

醋 別錄

酒 別錄

燒酒 約目

葡萄酒 約目

糟 約目

米粃 食物

春杵頭細糠

別錄

右附方舊八十一新一百

本草綱目穀部第二十五卷

穀之四 造釀類二十九種

大豆豉

別錄
中品

釋名

時珍曰按劉熙釋名云豉嗜也調和五味可甘嗜也許慎說文謂豉爲配鹽幽菽者乃鹹

豉

也

集解

弘景曰豉出襄陽錢塘者香美而濃入藥取中心者佳藏器曰蒲州豉味鹹作法與諸豉

不同其味烈陝州有豉汁經十年不敗入藥並

如今之豉心爲其無鹽故也

說曰陝府豉汁甚勝

常豉其法以大豆爲黃蒸每一斗加鹽四升椒四

兩春三日夏二日卽成半熟加生薑五兩旣潔淨

且精也時珍曰豉諸大豆皆可爲之以黑豆者入

藥有淡豉鹹豉治病多用淡豉汁及鹹者當隨方

大
豆
豉

大
豆
豉

七

法其豉心乃合豉時取其中心者非剝皮取心也
此說見外臺秘要造淡豉法用黑大豆二三斗六
月內淘淨水浸一宿瀝乾蒸熟取出攤席上候微
溫蒿覆每三日一看候黃衣上遍不可太過取曬
簸淨以水拌乾溼得所以汁出指閒爲準安甕中
築實桑葉蓋厚三寸密封泥於日中曬七日取出
曝一時又以水拌入甕如此七次再蒸過攤去火
氣甕收築封卽成矣造鹹豉法用大豆一斗水浸
三斤入鹽一斤薑絲半斤椒橘蘇茴杏仁拌勻入甕
上面水浸過一寸以箬蓋封口曬一月乃成也造
豉汁法十月至正月用好豉三斗清麻油熬令煙
斷以一升拌豉蒸過攤冷曬乾拌再蒸凡二遍以
白鹽一斗搗和以湯淋汁三四斗入淨釜下椒薑
葱橘絲同煎三分減一貯於不津器中香美絕勝
也有楚豉瓜豉醬豉諸品皆可爲之但充食品不
入藥用也

淡豉氣味苦寒無毒

思邈曰苦甘寒清得醣良果曰陰中之陰也

主治傷寒頭痛寒熱癰氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘

吸兩腳疼冷殺六畜胎子諸毒

別錄

治時疾熱病發

汗熬未能止盜汗除煩生搗爲丸服治寒熱風胸

中生瘡煮服治血痢腹痛研塗陰莖生瘡

藥性

治瘧

疾骨蒸中毒藥蠱氣犬咬

大明

下氣調中治傷寒溫

毒發癰嘔逆

時珍○千金治溫毒黑膏用之

蒲州豉氣味鹹寒無毒主治解煩熱熱毒寒熱虛

勞調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞陝州豉汁

亦除煩熱器藏

發明

弘景曰：豉食中常用春夏之氣不和蒸炒以酒漬服之至佳。依康伯法先以醋酒溲蒸曝。

燥麻油

和再蒸曝之。凡三過末椒薑治和進食大勝。

皆瘥。

頌曰：古今方書用豉治病最多。江南人善作豉。

凡得時氣卽先用葱豉湯服之。

陶說康伯豉法見博物志云原出外國也。

中國謂之康伯。

乃傳此法之姓名耳。其豉調中下。

氣最妙。

黑豆性平作豉則溫既經蒸署故能升能散。

得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則

治痢得蒜則止血炒熟則又能止。

汗亦麻黃根節之義也。

附方

舊三十一傷寒發汗。

頌曰：葛洪肘后方云傷寒有數種庸人卒不能

分別者。

今取一藥兼療之。凡初覺頭痛身熱脈洪一二日便以葱豉湯治之。用葱白一虎口豉一升。

綿裹水三升煮一升頓服不汗更作加葛根三兩

再不汗加麻黃三兩○肘後又法用葱湯煮米粥

入鹽豉食之取汗○又法用豉一升傷寒不解

升小男溺三升煎一升分服取汗傷寒不解不止

四升煮一升半分服取吐此秘法也

辟除溫變豉和白朮浸酒傷寒懊憹

身熱不去心中痛者並用卮子梅師方

十枚水二盞煮一盞入豉半兩同煎至七分去

滓服得吐止後傷寒餘毒

炒以酒一升半同煎五七

沸任性飲之簡要濟眾

肘後傷寒暴痛藥性論曰以豉一升薤白一握水三

升用豉一大蒜等分杵丸梧子大每服三十丸鹽湯下

血痢不止王氏博濟

如刺

藥性論曰以豉一升水漬相淹煎兩沸絞汁頓服不瘥再作

赤白重下氏

赤白重下

葛

用豆豉熬小焦搗服一合日三或炒焦以水浸汁

服亦驗

○外臺用豉心炒爲末

一升分四服酒下

同搗丸梧子大煎香菜湯服

大蒜二枚

下

入日卽斷也

臟毒下血

烏犀散用淡豉十文大研

同搗丸梧子大煎香菜湯服

大蒜九蒸乃佳仍以冷

龜

廬州

彭大祥云此藥甚妙但大蒜九蒸乃佳仍以冷

水送下昔朱元成言其姪及陸子楣提刑皆

服此數十年之疾更不復作也

甯原方

皆

小便

血條

或入酒服

危氏得效方

淡豆豉一撮煎湯空腹飲

瘧疾寒熱

煮豉湯飲數升

葛

得大吐卽愈

肘后方

小兒寒熱

急氣中人以溼豉研丸

雞子大以摩腮上及手足心

六七遍又摩心臍上旋旋呴之了破豉丸看

葛

有細毛棄道中卽便瘥也

食醫心鏡

盜汗

以豉一升微炒香清酒三升漬三日

葛

不瘥更作三兩劑卽止

葛

不止

說曰以豉一升微炒香清酒三升漬三日

葛

不瘥更作三兩劑卽止

葛

不瘥更作三兩劑卽止

葛

喘痰積

凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃肺竅久積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服

卽愈服至七八次卽出惡痰數升藥性亦隨而出

卽斷根矣用江西淡豆豉一兩蒸搗如泥入砒霜末

下七丸甚者九丸小兒五丸

卽高枕仰臥忌食熱水送冷茶冷水送

物等皆效方

風毒膝攣骨節痛用豉三升九蒸九暴

飲心鏡食

以酒一斗浸經宿空心隨性溫

酒中心鏡

又法豉一升微熬囊貯漬三升分三服

不得語煮豉汁加入美喉痹不語煮豉汁

之加入美喉痹不語煮豉汁一升服

之末于舌下嚥

干金方咽生瘻肉鹽豉和搗塗之先刺破出

口舌生瘻含一宿卽瘥

聖惠方舌上血出孔者鍼

豉三升水三升煮沸服

葛氏方

墮胎血下

煩滿用豉一升水三升煮三沸

調鹿角末方寸匕

葛氏方

妊娠動胎

豉汁炒服

華陀

婦人

難產

乃兒枕破

與敗血

裹其子也

以勝金散逐其

敗血卽順矣

用鹽豉一兩

以舊青布裹了燒

赤乳細入麝香

了燒

紅淬酒調服

一大盞

郭稽中方

妊娠動胎

秤錘燒

燒

煎濃汁與三五口

其毒自下

又能助脾氣消乳食

聖惠

小兒喫乳

用鹹豉七

箇去皮膩

小兒丹毒

作瘡出

粉五丸

藿香湯下

全幼心鑑

小兒頭瘡

以黃泥裹煨熟取研以

煙盡爲末油調

傅之姚和眾方

小兒頭瘡

以黃泥裹煨熟取研以

發青癰腫

照腫處大小作餅厚三分

瘡有孔勿覆

勝金

敷成泥

孔上鋪豉餅以艾列於上

灸之但使溫溫勿令破

肉如熱痛卽急易之

患當減快一日二次灸之如

孔上鋪豉餅以艾列於上

灸之但使溫溫勿令破

肉如熱痛卽急易之

患當減快一日二次灸之如

先有孔以汁出一切惡瘡熬豉爲未傳之不遇
爲妙干金方三四次出楊氏產乳

莖生瘡

痛爛者以豉一分蚯蚓溼泥二分水研和
塗上乾卽易之禁熱食酒蒜芥菜藥性和

論

蠼螋尿瘡

杵豉傳之良千金度外臺勿蹉跌破傷筋骨用豉三升
見毛爲度傳書夜勿蹉跌破傷筋骨用豉三升
千金度外臺勿蹉跌破傷筋骨用豉三升

瘥若不見再作度外臺勿蹉跌破傷筋骨用豉三升

飲之止心悶腹中悶滿豉一升水三升漬濃汁

悶

千金度外臺勿蹉跌破傷筋骨用豉三升

飲之止心悶腹中悶滿豉一升水三升漬濃汁

解蜀椒毒

豉汁飲之千金方中牛馬毒之效衛生易簡

小蝦蟆毒

小蝦蟆有毒食之令人小便秘澀臍下
悶痛有至死者以生豉一合投新汲水

半盃浸濃汁頓飲之

中酒成病豉葱白各半升水

卽愈

荳亭客語

中酒成病豉葱白各半升水

金方服藥過劑

悶亂者豉汁飲之千金雜物眯目不出用豉

水洗目視之卽

刺在肉中

嚼

或塗之

干金方

小兒病淋見

方

出

總錄方

刺

在肉中

嚼

或塗之

干金方

小兒病淋見

方

蒸餅發

明下

腫從腳起

或汁飲之

以滓傳之

肘後方

豆黃

食

校正

原附

大豆

下今分出

釋名

時珍曰

造法用黑豆一斗蒸熟鋪席上以蒿

覆之如盦

醬法待上黃取出曬乾

搗末收用

主治溼痹膝痛五臟不足

以治

方

氣味

甘溫無毒

說曰忌

豬肉

主治溼痹膝痛五臟不足

以治

方

脾胃

氣結積壯氣力潤肌膚益顏色填骨髓補虛

損能食肥健人以鍊豬脂和丸每服百丸神驗

祕方也肥人勿服

說○出延年祕錄方

主治溼痹膝痛五臟不足

以治

方

肥人勿服

說

方

說○出延年祕錄方

主治溼痹膝痛五臟不足

以治

方

說○出延年祕錄方

主治溼痹膝痛五臟不足

附方

新脾弱不食

說○出延年祕錄方

主治溼痹膝痛五臟不足

以治

方

說○出延年祕錄方

主治溼痹膝痛五臟不足

以治

日四五服任打擊青腫大豆黃爲末水和
意千金方塗之外臺祕要

豆腐用

集解

時珍曰豆腐之法始於漢淮南王劉安凡黑豆黃及白豆泥豆碗豆綠豆之類皆可爲

之造法水浸礮碎濾去滓煎成以鹽鹵汁或山礬葉或酸漿醋漬就釜收之又有入鉤內以石膏未

收者大抵得鹹苦酸辛之物皆可收斂爾其面上凝結者揭取眼乾名豆腐皮入饌甚佳也

氣味甘鹹寒有小毒

原曰性平頌曰寒而動氣瑞發腎氣瘡疥頭風杏仁可

解時珍曰按延壽書云有人好食豆腐中毒醫不可

能治作腐家言萊菔入湯中則腐不成遂以萊菔湯下藥而愈大抵暑月

恐有人汗尤宜慎之

主治寬中益氣和脾胃消脹滿下大腸濁氣

窟清

熱散血

珍時

附方

新四

休息久痢

白豆腐醋煎食之

赤眼腫痛

有數

種皆

肝熱血凝也

用消風熱藥服之

夜用鹽普濟方

豆腐片貼之

酸漿者勿用

證治要訣

杖瘡

青腫

豆腐切片貼之

頭熱者頻易一法

以燒酒煮紅卽易不紅乃已

拔萃方

燒酒醉

死身

心頭熱者用熟豆腐細切片遍

陳廩米

別錄下品

釋名

陳倉米

古名

老米

俗名

火米

時珍

有屋曰廩無屋

倉皆私積也

老亦陳也

圓曰固皆私積也

治成者有火燒治成者又有畬田

火米與此不同

方曰

火蒸

火蒸

火蒸

火蒸

集解孔景曰陳廩米卽粳米久入倉陳赤者以廩

軍人故曰廩爾方中多用之人以作醋勝於

廩

廩

廩

廩

廩

廩

新粳米也藏器曰廩米吳人以粟爲良漢地以粳爲善亦猶吳紇鄭縞貴近賤遠之意確論其功粟當居前宗奭曰諸家註說不言是粳是粟然二米陳者性皆冷煎煮亦無膏膩粉食令人自利與經說稍戾時珍曰廩米北人多用粟南人多用粳及釉並水浸蒸曬爲之亦有火燒過治成者入倉陳久皆氣過色變故古人謂之紅粟紅腐陳陳相因也

氣味鹹酸溫無毒

藏器曰廩米熱食卽熱冷食卽冷假以火氣也體自溫平同馬

肉食發痼疾時珍曰廩米年久其性多涼但炒食則溫爾豈有熱食卽熱者乎

主治下氣

除煩渴調胃止洟

別錄補五臟澀腸胃日暖脾去憊

氣宜作湯食

士良炊飯食止痢補中益氣堅筋骨通血脈起陽道以飯和酢搗封毒腫惡瘡立瘥北人

本草綱目 卷二十一 陳廩米

以飯置甕中水浸令酸食之暖五臟六腑之氣研

末服去卒心痛

孟詵

寬中消食多食易饑

甯原

調腸胃

利小便止渴除熱

珍時

發明

時珍曰陳倉米煮汁不渾初時氣味俱盡故冲淡可以養胃古人多以煮汁煎藥亦取其

調腸胃利小便

去溼熱之功也千金方治洞注下利炒此米研末飲服者亦取此義日華子謂其潤

腸胃寇氏謂其

冷利皆非中論

附方

新五

霍亂大渴

能殺人

以黃倉米

三升水一斗

煮汁澄清飲良

永類鈐方

反胃膈氣

不下食者

太倉散用倉米或白米日西時以水微拌溼自想日氣如在米中次

日曬乾袋盛掛風處每以一撮水煎和汁飲之卽

時便下○又方陳倉米炊飯焙研每五兩入沉香

末半兩和勻每米飲

普濟方

諸般積聚

太倉丸

治脾胃胃饑

不時生病及諸

般積聚

百物所傷陳倉米四兩以巴豆二十一粒

擇去豆不用入

去皮同炒至米香豆黑勿令米焦

糊丸梧子大每

白橘皮四兩爲末

研爲末

水丸日二服

一百一選方

暑月吐瀉

陳倉

薑湯服五丸日二服

米二升麥芽四兩黃連四兩切同蒸熟焙

梧子大每服百丸白湯送下

飯

遺拾

釋名

集解

時珍曰飯食諸穀皆可爲之各隨米性詳見本條然有入藥諸飯不可類從者應當別出

大抵皆取梗

種粟米者爾

新炊飯主治人尿牀以熱飯一盞傾尿牀處拌與