

驗方彙編

安徽省衛生廳編

一九五八年十一月十日

寫 在 前 面

在鼓足干劲，力争上游，多、快、好、省地建設社会主义总路綫的光輝照耀下，我省各地廣大中医工作者在大躍進中受到了很大的教育与鼓舞，紛紛自动的把自己的單方、秘方、驗方貢獻了出來。

这个册中所印的是最近从安徽省博物館卫生展覽館中医中藥部分中选择摘錄下來的。为了向全國中医中藥會議献礼，特彙集赶印出來。

这些方子大都是从臨床实践中積系下來或为祖傳秘方，有一部分是西医学習中医的成果，我們根据方剂的效能，分类为內、外、婦、兒、五官等科。由于編印時間非常倉促，因而疏漏、訛錯之处在所难免，要求讀者及原献方者惠予指正为感。

安徽省衛生廳

1958年11月8日

眩暈类

方名：龙胆丸。

主治：高血压及其头晕，失眠，四肢麻木，大便秘结等症状。

药物：龙胆草六钱 夏枯草三两 杜仲三两
稀莩草三两（九蒸九晒）

制法：以上药物，研细调匀，蜂蜜制丸。

服法：每人服二次，每次服三钱，开水吞服。

疗效：有二十例，都在四、五天内血压降低，逐渐消失症状，停药后随访一至二月观察，未复发。

献方人：芜湖市第二人民医院

方名：珠母汤。

主治：失眠，头晕，心跳。

药物：生地四钱 归身三钱 寸冬三钱 元参三钱
珠茯神四钱 酸枣仁四钱 柏子仁三钱 珍珠母五钱
龙齿四钱 杭白芍三钱 阿胶三钱 北五味子三钱

制法：用清水浓煎两次。

服法：分两次服，一日服完，可以服五剂至十剂。

禁忌症：消化不良及泄泻者忌服。

疗效：治疗失眠症，疗效达百分之九十以上。

献方人：芜湖市弋矶山医院。

方名：桑葉膏

主治：肝阳上僭，头晕目眩。

药物：鲜桑葉（干桑葉亦可）二斤，水四斤。

制法：熬煎去渣，文火收膏，约二斤。

服法：每次一两，一日服三次（加入白糖冲服亦可）。

一六二
疗效：治疗五例，三例获愈，二例症状改善。

献方人：淮南市矿工医院仇平佛

方名：菟龙丸

主治：高血压症

药物：蒺藜草十两 夏枯草十两 龙胆草一两五钱

制法：上药共研细末蜂蜜制丸

服法：每服三钱，一日二次至三次。

疗效：四十余例高血压者服后有良效，除自觉症状减轻外血压亦逐渐下降。

献方人：安庆市人民医院

水肿类

方名：甘遂利水散

主治：肾脏慢性水肿

药物：黑白二丑 甘遂麩煨 上药等分

制法：共研细末

服法：每日二次，每次开水冲服各三钱

疗效：附表

表(-)

治疗总人数	年龄	平均病程	平均剂量	平均治疗天数	治愈率	平均药费
45人	6-70	6个月以上	3剂	6天	90%以上	1.4元

表(二)

姓名	性别	年龄	病程	剂量	治疗天数	效果	患者住址
杜××	男	16	8个月	3剂	5天	水肿消失	肥东撮镇区南圩农场
王××	"	9	6"	3"	6"	痊愈	肥东县三十埠乡
刘××	"	53	一年	"	7"	" "	店埠安东社刘坎村
刘××	"	6	一年以上	2剂	10"	水肿消失	卅埠乡安东社许九村
王××	女	54	7个月	3"	8"	痊愈	" " " 晨光社松山村
陶××	男	70	4"	2"	12"	" "	肥东县梁元区
谢××	女	37	2"	6"	7"	" "	" " 挑头农业社
葛××	男	55	4"	3"	3"	" "	撮镇区宝光乡小马厂村
张××	"	16	1"	2"	5"	" "	草庙区高塘社甲岗村
王××	"	6	4"	4"	3"	" "	肥东县梁元区
黄××	"	37	7"	4"	5"	" "	" "
奎××	女	8	3"	3"	6"	" "	肥东梁元路口埠奎墩
钟××	男	30	7"	1"	2"	水肿消失	" " 撮镇区钟油坊
刘××	"	39	6"	5"	7"	痊愈	" " 众兴乡大刘村
王××	女	67	5"	4"	7"	水肿消失	" " 草庙乡田漕坊村
周××	男	48	1年以上	3"	5"	痊愈	肥东龙城
王××	女	56	3个月	2"	3"	" "	" " 卅埠乡晨光社

註：最近我院以店埠镇卫生所为重，选择了四十五名肾脏性水肿患者，以中药“丑逐利水散”试治，疗效达90%以上，由于药品制剂简单，价格便宜，不但缩短了疗程，减轻病人痛苦，同时更大的降低了患者经济负担。

肥东县医院 张玉成

中医治疗慢性肾脏炎(水气肿胀)21例的介绍

慢性肾脏炎是内科常见的一种疾病，目前在治疗上还存在一定的困难。我院中医内科先后收治慢性肾脏炎21例，初步取得一

空体会，收到一定疗效。

中医对慢性肾脏关(水气肿胀)认为病因其本在肾，其标在肺，其关键又在脾。治疗之法古书内经“开鬼门，洁净府”，金匱云：“腰以下肿，当利小便，腰以上肿当发汗乃愈”，因此发汗利尿，温运阳气，扶脾益肾，是治疗上的重要法则。我们试用以下几个方剂(见表一)

发汗佐用麻黄，防风，逐水佐用二丑，商陆，利尿加车前，木通，消肿加用冬瓜皮，赤小豆，其他化气消胀止咳平喘降血压等，则随证施治，配合有关药物，灵活运用。

小 结：

1、从以上的病例观察(见表二)我们初步认为：中医治疗慢性肾炎，对利尿，排水，消肿，降低血压及消除胸腔积液均有比较显著的效果，而且收效迅速，一般在服药2—3帖后即有疗效。

2、经中医治疗后，能迅速使病人增进食欲，促进睡眠，改善全身营养状况和恢复运动功能，对整个病理机转来说创造了一定的条件。

表一： 主要方剂

方 剂	药 物	主要作用
实脾飲	白朮、茯苓、川朴、附子、甘草、大腹皮、宣椒、麻香、厚朴、生姜	培土温中利水化气，消胀等
五皮飲	陈皮、大腹皮、茯苓皮、桑白皮、生姜皮	消浮肿利尿
真武湯	白朮、茯苓、白芍、附子、生姜	温中回阳利水
五苓散	白朮、茯苓、猪苓、泽瀉、肉桂	益气健脾祛湿利水道
防己黄芪湯	汉防己、黄芪、白朮、甘草	益气化湿行水

表二： 治疗效果

住院号	性别	年龄	治 疗 前				治 疗 后					
			浮肿	腹水	胸水	血压	合并症	浮肿	腹水	胸水	血压	合并症
5232	男	29	+	+	+	130/130	尿毒	-	-	-	130/90	-
5921	女	22	+	+	+	140/110	"	-	-	-	110/68	-
6668	女	20	+	+		正常		-	-			
6789	女	34	+	+	+	"	妊娠	△	-	-		
6913	男	21	+	+	+	140/100		△	-	-	140/96	
7096	男	28	+	+	+	"		△	-	-	120/70	
7281	女	38	+	+		140/90		-	-		140/80	
7942	男	42	+	+		183/110		△	-		130/96	
7969	"	32	+	+		140/100		-	-		130/90	
8864	"	27	+			135/90		-			138/100	
9232	"	30	+			正常		-				
9666	"	29	+	+		"		-	-			
10475	女	25	+	+		132/96		-	-		120/90	
10516	男	25	+			130/90		-			120/70	
10730	女	62	+	+		"		-	-		115/75	
10865	男	39	+	+		146/124		-	-		130/96	
10094	女	22	+	+		正常		-	-			
11007	"	26	+		+	"		-		-		
11706	"	16	+	+		128/80		-	-		110/68	
6734	男	23	+	-		120/80		-	-		120/75	
7277	男	31	+	+	+	131/90		-	-	-	142/88	

附註： (+) 代表有
 (-) 代表失
 (△) 代表显著进步

表三：肾功能检查

	恢复正常	进 步	无 变 化	附 註
总蛋白	2	2	8	病例总数21人 因有的检查项目不全或仅检查一次不能做两对比。
尿蛋白		3	18	
尿管型		2	19	
酚红试验	1	3	6	
非蛋白氮	2	2	2	
胆固醇	2	3	6	

合肥市第一人民医院中医内科

方名：商陆合剂。

主治：週身浮肿。

药物：商陆 泽泻 杜仲

(成份)每味各三钱。

疗效：临床疗效，慢性肾炎12例中10例好转，服药后浮肿消退，尿量增加，对急性肾炎，疗效更好。

反应：除少数病例对胃有不适外无中毒征象发现。适应于成人与小儿。

安庆专员公署医院

方名：姜丑膏

主治：水鼓胀

药物：生姜一斤 二丑半斤 红糖一斤 青萝卜一斤

制法：将生萝卜、生姜捣烂榨汁二丑研末，红糖一斤加水二斤熬成膏剂。

服法：每日三次，每次一两

疗效：能消鼓胀

献方：淮南矿工医院李六九

方名：治腹水方

主治：腹脹

藥物：腹皮一兩	貝殼一兩	防風六錢	當歸一兩
茵陳一兩	檳榔一兩	木香一兩	甘遂五錢
大戟五錢	神曲二兩	紅花八錢	牽牛子一兩
二丑各一兩			

制法：共研細末，水泛為丸

用法：每日兩次，每次服一錢三五

療效：能消腹水。

獻方人：懷遠縣醫院

痢疾類

方名：安眾痢疾方

主治：痢疾

藥物：安尔菜（即馬齒莧）九錢二分八厘	漂蒼朮五分
白芍一分六厘	赤芍一分六厘
川木香二分六厘	貫眾一錢九分二厘

制法：將安尔菜全量及貫眾之半量洗淨切碎煎盡濃縮成膏。貫眾另半量及其他輔藥則研成細粉末加入膏內壓成十六小片。

服法：此十六小片為一日所服之量，每六小時用溫開水吞服四片。療程為三—五天。

療效：芜湖市第一人民醫院臨床試用治療二十三例療效良好。

獻方人：芜湖市科學研究所。

泄瀉類

方名：久瀉方

主治：虚寒久泻。

药物：太子参一两 焦白朮一两 炮姜炭三钱
 煨诃子五钱 罌粟壳一两 補骨脂七钱
 陈皮三钱 煨赤石脂一两 关甘草三钱
 煨益智仁七钱

制法：上药共研极细末，调匀，制成一分五厘的片剂。

服法：成人量，每服6—8片，三小时服一次，儿童减半化服。病愈后，可续服一星期，以巩固疗效。

禁忌：服药期间，禁食油腻不易消化的食品。

疗效：治疗30余病例的临床观察，疗效显著，患者一般都能在1—2星期内症状消失，恢复正常。

献方人：芜湖市联合诊所。

胃病類

方名：延芍湯。

主治：胃疼溢酸水

药物：延胡索三钱 生白芍二钱 海螵蛸三钱
 甘草一钱

制法：用清水浓煎两次。

服法：早晚飯前服各一次。

禁忌：禁食酸性及不易消化的食品。

疗效：治疗一百余例，疗效为满意。

献方人：安庆市人民医院。

乌贝合剂治疗消化性溃疡实验

方剂：乌贼骨漂净去硬壳八钱五分 大贝母一钱五分
 全当归五钱 杏仁五钱

制法：共研极细末

服法：一日服三次，每夕前服一钱，开水送下。此药无特殊气
味，患者乐于吞服，经济有效。

病例摘要：

患者管××，男，卅六岁，工作单位：中口百货公司，门诊
病历号码42945，主要病状：胃痛已四五年，于前年有呕
吐史，曾经多方治疗无效，尤以下午胃痛为甚，返酸，
暖气，不能进食，肌瘦体弱，大便干秘，有时便血，并
有头昏无力。

治疗效果：

患者于57年一月经胃肠道钡餐透视及摄片，证明为胃小
弯部溃疡。于57年三月用乌贝合剂治疗，旬余后症状减
轻，三月后一切转好，半年后恢复健康。患者因忙于工
作，未能及时作钡餐复视，至58年四月始作胃肠道钡餐复
视检查，结果证明，胃小弯部之溃疡已消失愈合。

献方人：合肥市第一人民医院中医内科

胃痛类

用中药治疗二十四例胃痛疗效卓著，我们在辨证论治的基
础上，分别进行治疗，所选用方药列表于下：

辨证	方剂	药 品
虚	黄芪建中汤	当归、黄芪、桂枝、白芍、甘草、大枣、生姜、饴糖
	加味妙香散	党参、黄芪、茯苓、山药、远志、桔梗、木香、龙骨、牡蛎、甘草
	四君子汤	党参、茯苓、白术、甘草、加生姜、大枣
实	苓桂术甘汤	茯苓、桂枝、白术、甘草
	二陈汤	制半夏、茯苓、陈皮、甘草、生姜

辨証	方 劑	藥 品
寒	桂枝人參湯	桂枝、人參、白朮、干姜、甘草。
	良附丸	良姜、香附。
熱	四逆散	柴胡、白芍、枳實、甘草。
	左金丸	黃連、吳萸
附註	1. 痛甚加乳香沒藥、玄胡索、金鈴子。	
	2. 吐酸加：石脂、瓦楞子、烏賊骨。	
	3. 吐血或便血加：紫丹參、參三七、桃仁。	

用上述方法，对本病二十四例治疗的結果，除一例合併幽門阻塞治疗无效外，其餘二十三例，症狀消失者十五例，症狀減輕者八例，有效率为95.8%。

獻方人：蚌埠市第三人民医院。

方名：胃痛散。

主治：胃脘疼痛，吞酸噯腐。

藥物：五灵脂 煨旱果 制沒藥 玄胡索 烏賊骨等分。

制法：共研成粉末。

用法：每日五钱，用甘草二钱泡水洗服。

疗效：經透視証明，治愈四則，十三例症狀減輕正在治疗中。

獻方人：淮南矿工医院楊星府。

黃疸類

方名：茵陈泻黄湯

主治：湿熱黃疸

藥物：西茵陈四钱 粉葛根三钱 漂白朮二钱
 北連翹二钱 淡黄芩一钱五分 焦山梔二钱
 白朮四钱 炙甘草一钱 广木香一钱五分
 薄荷叶一钱

用量：上药为成人一日量，小儿酌减，服至黄退为度。

偏热者：加麦冬三钱

偏湿者：加大腹皮二钱

疗效：本院鉴于传染性肝炎，是一种损害肝功能的疾病，目前西医尚无对本病的特效药品，我院中医科与传染病室配合，选用古方“茵陈泻黄汤”，治疗23例，获得100%的疗效，细考这一病理机制，在中医论上是湿热内蕴，阳为阴遏，治必清热化湿，而古方专擅其长者，惟以此汤最为合适，患者服药十天后，在消除症状——身热发黄的同时，经化验检查“胆红素”“黄疸指数”都能下降趋于正常，肝肿大及肝功能亦能渐次恢复。

献方人：芜湖市第一人民医院

主治：黄疸病（阳黄）

茵陈四钱	生栀子四钱	生白芍三钱	赤芍三钱
黄芩三钱	白菊花四钱	生玉米一两	知母三钱
秦艽三钱	大白四钱	大茵三钱	丹皮三钱

服法：煎服

疗效：十一例患者皆全愈。

献方人：碭山县贾玉久

方名：黑虎丹

主治：黄痢、黄肿。

黑矾四两	核桃七个去皮	发麩饅一个
蜂蜜二两	元红枣四十个去皮煮	

制法：杵为丸，制成五十五粒

服法：一日三次，每次一至三粒。

疗效：治十五人，有效率达百分之九十五。

献方人：碭山县人民医院

痞塊類

方名：三反破堅膏

藥物：甘草 甘遂 壁肉 葱白 蜂蜜 礞石 乳香 没药
灵脂 木别 三棱 紅莧菜

制法：共搗成糊狀

用法：外敷

献方人：合肥市人民医院金容甫

丹参治疗晚期血吸虫病肝硬化脾肿大的疗效(四十三例)

肝肿：缩小44.4% 变软55.5%

脾肿：缩小48.8% 变软53.6%

紅血球：血色素肝功能均较前有所进步

剂量：中医用量每天9—18克，我院用量每天18—45克。

毒性：最多連用83日，无副作用

献方人：安庆专署医院

血吸虫病

加减补中益气汤治疗晚期血吸虫病长期发热，伴有肺部病

变二例：

晚期血吸虫病頑固发热，伴有贫血腹水，肝功能障碍，及肺部广泛病变，不能注射錳剂，治疗十分棘手。我院最近以中医辨证疗法为基础，試用加减补中益气汤法（升麻、甘草加白薇、青蒿），服药后，热先后退热，初步满意。

病例：姜××，男，十五岁(12522号)，发热十余日，体温达39.6°C，心率快，有腹水，血球184万，血色素30%，伊红13%，粪卵化阳性，肝功能试验强阳性，经多种治疗无效，服加枳补中益气汤后，四天热退，营养增加，一个月后，胸X光拍片原有广泛粟粒样病灶都吸收。

献方人：安庆专署医院

瘧疾類

方名：泽漆汤

主治：间日瘧

药物：泽漆四钱 红荻八钱

制法：上药加水一中碗，煮十五分钟即可。

服法：瘧发三小时前服一半，一小时前服一半。

疗效：治疗四十七例，经化验无尿虫者32例

献方人：淮南矿工医院中医科

方名：瘧疾丸

主治：一切瘧疾並治惡胃跌打損傷，氣閉昏迷。

药物：北柴胡浓汁二两 芭蕉三钱五分 青皮一钱
 槟榔一钱五分 法半夏一钱五分 煨草果五分
 生姜五分。

制法：上七味除柴胡生姜法半夏外，其餘合研司末，柴胡煎汁浓缩成泥浸膏一钱五分，掺入药末内，以生姜水泛丸，外以半夏粉为衣磁瓶收貯。

服法：每日服二次，每次服二钱。

疗效：无不奏效。

献方人：宁国县医院 王英培

腸癰初起肉消單方

主治：腸癰初起

藥品：九節石葛蒲根三錢至五錢（乾的切片）

雄豬膀胱一個（洗淨）

制法：將石葛蒲根裝入豬膀胱內，以線紮緊，放入瓦罐中，加水五飯碗置炭火上煮三至四小時，待豬膀胱已煮爛（以筷子輕搗即穿時）約剩汁一飯碗時，取起豬膀胱剔除石葛蒲渣，再放入罐內略煮片時。

服法：于飯後三小時，連湯帶豬膀胱一次服下，服時宜待湯微溫時服送，因此藥辛味甚重，恐服較難下嚥，故宜于微溫時服之。

療效：服一劑后腹痛即減輕，服二劑即不痛，服三劑即全愈，倘治癒時間稍遲，則宜連服五劑，（每日服一劑）

獻方人：中醫進修學校

方名：加味大黃牡丹皮湯

主治：腸癰

藥物：大黃三錢	批仁三錢	芒硝三錢	冬瓜仁三錢
粉丹皮三錢	銀花五錢	連翹三錢	敗醬草三錢
花粉三錢			

制法：用清水濃煎兩次

服法：每日分二次服完

療效：用此方治愈三尾炎有58例，茲舉二例如下：1.孟老太，女，72歲，住該鄉農業社，三年前曾患過三尾炎，經去諒縣衛生院治療數星期出院，去年冬發生腹痛，噁心嘔吐，不能食，來我院治療，腹膨，右腸骨高腹壁強直，馬氏臭壓痛陽性，右腿彎曲，不能伸開，深觸診可摸到如拳頭大的腫物，體溫39.2，脈博102次，自時送我院

医生会诊，认为已形成兰尾炎脓肿，非用手术治疗不克奏效，但患者家属认为年岁已大，受不了手术，要求我们给予治疗，以尽人事，以青霉素及磺胺剂治疗，经过二日，虽止痛减轻但脓肿不见消退，我们经会诊，决定以大黄牡丹皮汤合败酱草加银花连翘乳香没药。连服二剂，下黑色血便粘液，腹痛大减，脓肿缩小，热下降，胃口已开，又服一剂，下粘液便更多，腹壁柔软，脓消失，压痛没有了，右腿已能伸直，迄今虽未愈仍使壮。

2、例吴 妻 52岁，开始腹痛呕吐，继而腹胀，两腿弯曲不能伸直，茶水不能下，经我们会诊，断为兰尾炎继发腹膜炎，第二日，病人已气力微弱，茶水亦进，满腹膨胀，坚硬拒按，舌苔焦黑起芒刺，无津液，脉细无力，拟加味牡丹皮汤加白芍、生地、玄参、麦冬、郁李仁等，病人喝不下，即用汤匙灌下，服完第一剂后，当液下黑色粘液便，第二天复诊腹壁变软，气力增加，仍用前方，连进三剂，腹膨消失，能进稀粥，以后逐渐恢复，根据我们六年来的经验，除急性兰尾炎外，一般缓和的兰尾炎均用该药方加减治疗，并没有肠穿孔，亦未经过手术治疗，而药价便宜，病人并且不受开刀痛苦，同时又节省金钱及时间，值得推广。

献方人：马鞍山市霍里乡红旗人民公社医院

主治：阑尾炎经验方

药物：乳香 没药 玄胡粉 乌梅 香元炭 制香附
 川连 吴手 川楝子各二钱 广木香各一钱五分
 砂仁各一钱二分 海螵蛸三钱

加减法：如大便闭结，可加大黄元明粉

用量：根据病人身体强弱而用分量

用法：水煎服

疗效：治疗 40 余例其一例为李××，男，38岁，住石子加工厂