

# 上海市药物制剂产品手册

第二分册

片剂

江苏工业学院图书馆  
藏书章

第二分册

片 剂

1962/9. 上海

## 第二分册产品名称目录

### 片 剂

|                  |         |
|------------------|---------|
| 滴维净片             | 202     |
| 乙酰甲萘醌片           | 203—204 |
| 乙酰氧基黄体酮片(口服黄体酮片) | 205     |
| 乙酰普马嗪片           | 206     |
| 抗坏血酸片(维生素C片)     | 207     |
| 叶酸片              | 208     |
| 菸酸片              | 209—210 |
| 乳清酸片             | 211     |
| 安达诺新片            | 212     |
| 仙鹤草色素片           | 213     |
| 氨基比林片            | 214     |
| 复方氨基比林片(凡拉蒙片)    | 215     |
| 氨非咖片             | 216     |
| 氨茶硷片             | 217     |
| 氨基蝶环片            | 218     |

|               |         |
|---------------|---------|
| 氯化铵片          | 219     |
| 复方碘化铵片(含碘喉症片) | 220     |
| 安乃近片(罗瓦而精片)   | 221     |
| 复方安乃近片(解痛片)   | 222     |
| 抗炎松片          | 223     |
| 安痛片           | 224     |
| 安坦片           | 225     |
| 阿司匹林片         | 226—227 |
| 复方阿司匹林片       | 228—229 |
| 硫酸阿托品片        | 230     |
| 宝塔糖片          | 231     |
| 复方颠茄片         | 232     |
| 长效西林片         | 233     |
| 灭虫宁片          | 234—235 |
| 盐酸黄连素硷片       | 236     |
| 白血福恩片         | 237     |
| 乳酸钙片          | 238     |
| 依地酸钙钠片        | 239     |
| 钙尔生丁片         | 240     |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 卡巴肿片.....          | 241     |
| 妥克拉司片.....         | 242     |
| 噻碘方片(安痢生片).....    | 243     |
| 盐酸氯丙嗪片(氮普馬嗪片)..... | 244     |
| 磷酸氯噻片.....         | 245     |
| 辛可芬片.....          | 246     |
| 醋酸可的松片.....        | 247     |
| 抗癆胍片(氯乙酰胍片).....   | 248     |
| 盐酸團氯胍片.....        | 249     |
| 胱氨酸片.....          | 250     |
| 强地黄片.....          | 251     |
| 地塞米松片.....         | 252     |
| 海群生片.....          | 253     |
| 氨苯砜片.....          | 254—255 |
| 多麟片.....           | 256     |
| 地巴唑片.....          | 257     |
| 双香豆素片.....         | 258     |
| 洋地黄片.....          | 259—260 |
| 洋地黄毒甙片.....        | 261     |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 丁維鈣片.....        | 262     |
| 盐酸苯海拉明片.....     | 263     |
| 多种鈣片.....        | 264     |
| 耳霖片.....         | 265     |
| 枸橼酸妊娠酚片.....     | 266     |
| 紅霉素片.....        | 267     |
| 妊娠素片.....        | 268     |
| 复方当归浸膏片.....     | 269     |
| 硫酸亚鉄片.....       | 270     |
| 福美片.....         | 271     |
| 福命喉症片.....       | 272     |
| 呋喃西林片(內服).....   | 273—274 |
| 鈣素母片.....        | 275     |
| 胃舒平片.....        | 276     |
| 肝太乐片.....        | 277     |
| 复方甘草片(不含阿片)..... | 278     |
| 复方甘草片(含阿片).....  | 279     |
| 果导片.....         | 280     |
| 汗定片.....         | 281     |

|            |         |
|------------|---------|
| 盐酸胍苯噻嗪片    | 282     |
| 双氢克尿塞片     | 283     |
| 醋酸氢化可的松片   | 284     |
| 肌醇片        | 285     |
| 异丙萘胍片      | 286     |
| 双醋酸酞片(一轻松) | 287     |
| 异萘胍片       | 288—289 |
| 异萘胍磺钠片     | 290     |
| 百生胍片       | 291     |
| 异萘腺片       | 292     |
| 降压灵片       | 293     |
| 九合维他       | 294     |
| 咳停         | 295     |
| 基林片        | 296     |
| 感尔松片       | 297     |
| 元一宝塔糖片     | 298     |
| 妈妈多片       | 299     |
| 磺胺二甲氧基嘧啶片  | 300     |
| 胃瘍平片       | 301     |

|               |         |
|---------------|---------|
| 美卡明片          | 302     |
| 胍硫酸氢钠甲萘醌片     | 303     |
| 复方薄荷含片        | 304     |
| 薄荷喉症片         | 305     |
| 眠尔通片          | 306     |
| 乐疾宁片          | 307     |
| 溴本辛片          | 308     |
| 甲硫氨基酸片        | 309—310 |
| 美索因片          | 311     |
| 甲基孕丸素片        | 312     |
| 甲基硫氧嘧啶片       | 313     |
| 碳酸氢钠片(小苏打片)   | 314—315 |
| 复方碳酸氢钠片(苏打明片) | 316     |
| 含盐清凉片         | 317     |
| 对氨基水杨酸钠片      | 318     |
| 新霉素片          | 319     |
| 溴化新斯的明片       | 320     |
| 萘酰胺片          | 321—323 |
| 水杨酸钠片         | 324—325 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 克瀉痢寧片           | 326 |
| 胰酶片             | 327 |
| 扑热息痛片           | 328 |
| 青霉素片            | 329 |
| 青霉素含錠           | 330 |
| 青霉素V片(苯氧甲基青霉素片) | 331 |
| 安血定片            | 332 |
| 奋乃靜片            | 333 |
| 非那西汀片           | 334 |
| 抗胺萆片            | 335 |
| 苯巴比妥片           | 336 |
| 酚酞片             | 337 |
| 苯丙甾片            | 338 |
| 保泰松片            | 339 |
| 复方保泰松片          | 340 |
| 苯妥英鈉片           | 341 |
| 羧苯甲酰磺酰醋胺片(息拉米片) | 342 |
| 羧苯甲酰磺胺噻唑片       | 343 |
| 漂粉精片            | 344 |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 枸橼酸噻嗪片                       | 345     |
| 米拉脫灵片                        | 346     |
| 去氫氫化可的松片                     | 347     |
| 去氫可的松片                       | 348     |
| 磷酸伯氨噻啉片(扑瘡噻片)                | 349—350 |
| 普魯本辛片                        | 351     |
| 盐酸吡多辛片(維生素 B <sub>6</sub> 片) | 352     |
| 乙胺嘧啶片(息瘡定片)                  | 353—354 |
| 硫酸奎尼丁片                       | 355     |
| 重硫酸奎寧片                       | 356—357 |
| 大黃碳酸氫鈉片(大黃苏打片)               | 358     |
| 核黄素片(維生素 B <sub>2</sub> 片)   | 359     |
| 潤腸果子糖片                       | 360     |
| 复方路丁片                        | 361     |
| 糖精鈉片                         | 362     |
| 干酵母片                         | 363—365 |
| 水楊酰胺片                        | 366     |
| 散尔痛片                         | 367     |
| 复方五味子片                       | 368     |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 息宁痛片·····                  | 369     |
| 鏈霉素片·····                  | 370     |
| 索灭痛片·····                  | 371     |
| 磺胺嘧啶片·····                 | 372—373 |
| 磺胺二甲基嘧啶片·····              | 374     |
| 磺胺甲氧基吡嗪嗪片·····             | 375     |
| 磺胺脒片·····                  | 376—377 |
| 磺胺噻唑片(消治龙片)·····           | 378—380 |
| 磺胺硫脲片·····                 | 381     |
| 合霉素片·····                  | 382     |
| 无味合霉素片·····                | 383     |
| 盐酸硫胺片·····                 | 384     |
| 新維生素 B <sub>1</sub> 片····· | 385     |
| 甲状腺片·····                  | 386—387 |
| 替比昂片(氮硫脲片)·····            | 388     |
| 妥拉苏林片·····                 | 389     |
| 三醋酸汀片(通舒片)·····            | 390     |
| 三溴片·····                   | 391     |
| 三甲双酮片·····                 | 392     |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 三磺片·····                   | 393 |
| 維生素 B <sub>12</sub> 片····· | 394 |
| 复合維生素 B 片·····             | 395 |
| 維他賜保命片(男用)·····            | 396 |
| 維他賜保命片(女用)·····            | 397 |
| 胃宁片·····                   | 398 |
| 維他鈣片·····                  | 399 |
| 哮喘平片·····                  | 400 |
| 暈动藥片·····                  | 401 |
| 优散痛片·····                  | 402 |
| 月月紅片·····                  | 403 |
| 中苏潤喉片·····                 | 404 |
| 爱儿康元一宝塔糖·····              | 405 |
| 爱儿康宝塔糖·····                | 406 |

|      |       |                                                                                                                        |                      |                                           |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 产品名称 |       | 滴維淨片 Tabella acetarsoni (Tabellae Devogani) (現由信誼藥厂生产)                                                                 |                      |                                           |
| 規 格  |       | 藥 品 規 范 (1959)                                                                                                         |                      |                                           |
| 處    | 每十萬片  | 每片                                                                                                                     | 劑量及<br>療 程           | 使用前先进行腔内洗滌，然后将本品放入腔后穹窿部，一次1—2片，用后次晨行一次坐浴。 |
|      |       |                                                                                                                        |                      |                                           |
| 方    | 乙酰胺肼  | 25.0公斤                                                                                                                 | 0.25公分               | 內在質量<br>存在問題                              |
|      | 硼 酸   | 3.0公斤                                                                                                                  | 30.0 公絲              |                                           |
|      | 乳 糖 粉 | 30.0公斤                                                                                                                 | 0.3 公分               | 品种規格                                      |
|      | 淀 粉   | 47.0公斤                                                                                                                 | 0.47公分               |                                           |
| 硬脂酸鎂 | 0.8公斤 | 8.0 公絲                                                                                                                 | 片重1公分，每片含乙酰胺肼0.25公分。 |                                           |
| 操作要点 |       | 称取乙酰胺肼，用60目篩篩过；称取乳糖粉及淀粉，硼酸均用100目篩篩过；混合均匀，用5%的淀粉漿湿润用12目篩制粒，用70°C温度干燥。干粒加入滑石粉(100目細粉)，混匀压片。生产本品时，应注意劳动保护，如密閉攪拌，戴防护口罩……等。 |                      |                                           |
| 治疗范围 |       | 本品用于治疗鞭毛滴虫，白帶以及一切因腔壁机能衰退而引起的帶下。                                                                                        |                      |                                           |
| 包裝規格 |       | 20片                                                                                                                    | 失效期限                 |                                           |
| 儲运条件 |       | 密閉保存                                                                                                                   | 負責期限                 | 2年                                        |



|                       |                                                                       |            |                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 产品名称                  | 乙酰甲萘醌片 Tabella Acetomenaphthoni (現由九福藥厂生产)                            |            |                            |
| 規 格                   | 藥 品 規 范 (1959)                                                        | 劑量及<br>疗 程 | 每次 1—5片                    |
| 处<br><br>方<br><br>(一) | 乙酰甲萘醌 每十萬片 每片<br>糊 精 0.2公斤 2.0公絲<br>硬脂酸鎂 7.0公斤 70.0公絲<br>适量 适量        | 內在質量       |                            |
|                       |                                                                       | 存在問題       |                            |
|                       |                                                                       | 品种規格       | 糖衣片重0.14公分<br>每片含乙酰甲萘醌2公絲。 |
| 操作要点                  | 称取糊精，篩过，制成16目空白顆粒。70°C溫度干燥后，称取乙酰甲萘醌細粉，<br>均匀混入空白顆粒中，再加入硬脂酸鎂，混匀压片。包糖衣。 |            |                            |
| 治疗范围                  | 适用于阻塞性黄疸与其他缺乏維生素K所致出血症等。                                              |            |                            |
| 包裝規格                  | 100片、1000片                                                            | 失效期限       | 2年                         |
| 儲运条件                  | 置遮光的容器內，密閉，在干燥处<br>保存。                                                | 負責期限       | 2年                         |

|                              |                             |                                                                                                                                          |                                                |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 产品名称                         |                             | 乙酰甲萘醌片 Tabella Acetomenaphthoni (曾由信誼藥厂生产)                                                                                               |                                                |
| 規 格                          |                             | 藥 品 規 范 (1959)                                                                                                                           |                                                |
| 处<br><br>方<br><br>(二)        | 每十萬片      每片                |                                                                                                                                          | 劑量及<br>療 程<br><br>內在質量<br><br>存在問題<br><br>品種規格 |
|                              | 乙酰甲萘醌      0.2公斤      2.0公絲 |                                                                                                                                          |                                                |
| 淀 粉      5.5公斤      55.0公絲   |                             |                                                                                                                                          |                                                |
| 糊 精      1.8公斤      18.0公絲   |                             |                                                                                                                                          |                                                |
| 蔗 糖 粉      1.5公斤      15.0公絲 |                             |                                                                                                                                          |                                                |
| 硬脂酸鎂      90.0公分      9.0公絲  |                             |                                                                                                                                          |                                                |
| 操作要点                         |                             | 称取乙酰甲萘醌、淀粉、糊精、及蔗糖粉分別篩过,混合均匀,用7%的淀粉漿約2公斤湿润,用16目—18目篩制粒,以60—65°C干燥后加入硬脂酸鎂,混勻压片,包墨灰糖衣层。本品有刺激作用,操作时应戴長橡膠沒肘手套及口罩,对少数人有过敏反应。制成的顆粒及片剂易吸湿,应注意防止。 |                                                |
| 治疗范围                         |                             | 适用于阻塞性黄疸,与其它缺乏維生素K所致的出血症等。                                                                                                               |                                                |
| 包裝規格                         |                             | 100片、1000片                                                                                                                               | 失效期限      未定                                   |
| 儲运条件                         |                             | 密閉保存                                                                                                                                     | 負責期限      未定                                   |

|      |                                                                              |        |              |                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|
| 产品名称 | 乙酰氧基黄体酮片(口服黄体酮片) Tabella Acetoxyprogesteroni<br>(現由信誼厂生产)                    |        |              |                                  |
| 規 格  | 卫 生 局 暫 行 标 准                                                                |        | 剂 量 及<br>疗 程 | 一般剂量 1 日量1—2片。用于习惯性流产 1 日量8—16片。 |
| 处    | 每十万片                                                                         | 每 片    | 內在質量<br>存在問題 |                                  |
| 方    | 乙酰氧基黄体酮                                                                      | 2.5公斤  |              | 25.0公絲                           |
|      | 糊 精                                                                          | 2.0公斤  | 20.0公絲       |                                  |
|      | 淀 粉                                                                          | 3.5公斤  | 35.0公絲       |                                  |
|      | 硬脂酸鎂                                                                         | 80.0公分 | 0.80公絲       |                                  |
| 品种規格 |                                                                              |        |              | 片重80公絲，每片含乙酰氧基黄体酮25公絲            |
|      |                                                                              |        |              |                                  |
| 操作要点 | 將乙酰氧基黄体酮研成細粉，与淀粉、糊精混勻，用 10% 淀粉漿湿润，通过 16 目篩制粒以 70°C 温度干燥，干粒加入已篩过的硬脂酸鎂，充分混勻压片。 |        |              |                                  |
| 治疗范围 | 适用于先兆性与习惯性流产、子宮功能性出血痛經、与月經过多等症。                                              |        |              |                                  |
| 包裝規格 | 100片                                                                         |        | 失效期限         |                                  |
| 儲运条件 | 密閉保存                                                                         |        | 負責期限         | 3 年                              |

|      |                                                                          |            |                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 产品名称 | 乙酰普馬嗪片 Tabella Acetylpromiazini Maleatici (現由九福藥厂生产)                     |            |                         |
| 規格   | 衛生局暫行規定                                                                  | 劑量及<br>療 程 | 遵照医嘱                    |
| 处    | 每十萬片<br>乙酰普馬嗪 1.0公斤<br>糊精顆粒 6.0公斤<br>硬脂酸鎂 适量<br>每片<br>10公絲<br>60公絲<br>适量 | 內在質量       |                         |
| 方    |                                                                          | 存在問題       |                         |
|      |                                                                          | 品种規格       | 糖衣片重0.14公分，每片含乙酰普馬嗪10公絲 |
| 操作要点 | 取糊精用20~40%乙醇制成16目空白顆粒，在70°C溫度干燥。干粒过篩后，与乙酰普馬嗪及硬脂酸鎂充分混勻，压片，包糖衣。            |            |                         |
| 治疗范围 | 本品适用于治疗精神分裂症，精神不安，感情紊乱，惡心、嘔吐、打呃等。                                        |            |                         |
| 包裝規格 | 1000片                                                                    | 失效期限       |                         |
| 儲运条件 | 密閉保存                                                                     | 負責期限       | 2 年                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|----|------|--------|---------|----|-------|--------|----|-------|--------|-----|-------|--------|------|--|
| 产品名称           | 抗坏血酸片(維生素C片) Tabella Acidi Ascorbici (現由九福藥厂生产)                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 規 格            | 藥 品 規 范 (1959)                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 劑量及<br>疗 程 | 1次半至1片, 1日1—5片。            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 处<br><br><br>方 | <table><tr><td></td><td>每十萬片</td><td>每片</td></tr><tr><td>抗坏血酸</td><td>10.0公斤</td><td>100.0公絲</td></tr><tr><td>淀粉</td><td>2.0公斤</td><td>20.0公絲</td></tr><tr><td>糊精</td><td>2.8公斤</td><td>28.0公絲</td></tr><tr><td>酒石酸</td><td>3.0公斤</td><td>30.0公絲</td></tr></table> |         |            | 每十萬片                       | 每片 | 抗坏血酸 | 10.0公斤 | 100.0公絲 | 淀粉 | 2.0公斤 | 20.0公絲 | 糊精 | 2.8公斤 | 28.0公絲 | 酒石酸 | 3.0公斤 | 30.0公絲 | 內在質量 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            | 每十萬片                       | 每片 |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 抗坏血酸           | 10.0公斤                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.0公絲 |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 淀粉             | 2.0公斤                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.0公絲  |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 糊精             | 2.8公斤                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.0公絲  |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 酒石酸            | 3.0公斤                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.0公絲  |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
|                | 存在問題                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 品种規格       | 片重0.15公分, 每片含抗坏血酸<br>0.1公分 |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 操作要点           | 取抗坏血酸, 淀粉及糊精, 篩过, 混合均匀。用溶有酒石酸的稀醇湿润, 通过16目尼龙篩制成顆粒, 以60—75°C温度干燥。使用酒石酸可以防止抗坏血酸片貯存后变色。                                                                                                                                                                                |         |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 治疗范围           | 本品适用于坏血病和缺乏抗坏血酸所引起的病症, 以及其他如各种疾病, 孕妇, 乳母, 发育期儿童, 哺乳嬰兒等消耗抗坏血酸特多的情况。                                                                                                                                                                                                 |         |            |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 包裝規格           | 100片、1000片                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 失效期限       |                            |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |
| 儲运条件           | 置遮光的容器內, 密閉, 在涼处保存                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 負責期限       | 1年半                        |    |      |        |         |    |       |        |    |       |        |     |       |        |      |  |

|                |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 产品名称           |                                                                                                                                            | 叶酸片 Tabella Acidi Folici (現由信誼藥厂生产)                                                                          |                     |
| 規 格            |                                                                                                                                            | 藥 品 規 范 (1959)                                                                                               | 劑量及<br>疗 程          |
| 处<br><br><br>方 | 每十萬片      每片<br>叶酸(100%)    0.5公斤      5.0公絲<br>蔗 糖 粉      3.0公斤      30.0公絲<br>淀 粉        7.5公斤      75.0公絲<br>硬脂酸鎂      0.1公斤      1.0公絲 |                                                                                                              | 1日1—4片, 或遵医嘱        |
|                |                                                                                                                                            |                                                                                                              | 內在質量                |
|                |                                                                                                                                            |                                                                                                              | 存在問題                |
|                |                                                                                                                                            | 品种規格                                                                                                         | 片重0.11公分, 每片含叶酸5公絲。 |
| 操作要点           |                                                                                                                                            | 称取主藥与輔料, 糖粉, 淀粉, 先拌勻, 后用5%淀粉漿湿润成軟料, 以旋轉式圓筒軋粒机, 軋制无斑点为止, 再通过搖摆机14目篩一次, 以65—70°C通风干燥, 加入滑料通过14—16目篩, 充分拌和压制成片。 |                     |
| 治疗范围           |                                                                                                                                            | 本品适用于营养缺乏性, 怀孕期癩皮病, 口炎性腹瀉等巨紅血球性贫血。                                                                           |                     |
| 包裝規格           |                                                                                                                                            | 100片                                                                                                         | 失效期限                |
| 儲运条件           |                                                                                                                                            |                                                                                                              | 負責期限      2年        |

|                       |                                                                                                        |            |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 产品名称                  | 菸酸片 Tabella Acidi Nicotinici (現由九福藥厂生产)                                                                |            |                      |
| 規格                    | 中 国 藥 典 (1953)                                                                                         | 劑量及<br>疗 程 | 1日3次, 1次1—2片。        |
| 处<br><br>方<br><br>(一) | 菸 酸      每十萬片      每片<br>淀 粉      5.0公斤      50.0公絲<br>糊 精      5.0公斤      50.0公絲<br>2.0公斤      20.0公絲 | 內在質量       |                      |
|                       |                                                                                                        | 存在問題       |                      |
|                       |                                                                                                        | 品种規格       | 片重0.12公分, 每片含菸酸50公絲。 |
| 操作要点                  | 取菸酸, 淀粉, 及糊精, 分別篩过, 混合均匀, 用8%的淀粉漿湿润用16目篩<br>制粒, 在60—65°C 溫度干燥, 干粒加入适量硬脂酸鎂, 混勻压片。                       |            |                      |
| 治疗范围                  | 本品适用于治疗癩皮病, 又有擴張血管作用, 适用于視神經萎縮, 網膜变性等症。                                                                |            |                      |
| 包裝規格                  | 100 片                                                                                                  | 失效期限       |                      |
| 儲运条件                  | 密閉避光保存                                                                                                 | 負責期限       | 3 年                  |

|                       |                                                                             |        |            |                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|
| 产品名称                  | 菸酸片 Tabella Acidi Nicotinici (曾由信誼藥厂生产)                                     |        |            |                                                            |
| 規 格                   | 中 国 藥 典 (1953)                                                              |        | 劑量及<br>疗 程 | 1日3次, 1次1—2片, 或遵医嘱。                                        |
| 处<br><br>方<br><br>(二) | 每十萬片                                                                        |        | 內在質量       | 50公絲片重0.09公分, 每片含菸酸<br>50公絲。100公絲片重0.125公分,<br>每片含菸酸100公絲。 |
|                       | 100公絲                                                                       | 50公絲   |            |                                                            |
|                       | 菸 酸 10.0 公斤                                                                 | 5.0 公斤 | 存在問題       |                                                            |
|                       | 淀 粉 2.68公斤                                                                  | 4.38公斤 |            |                                                            |
| 硬脂酸鎂 80.0 公分          | 80.0 公分                                                                     |        |            |                                                            |
|                       | 每 片                                                                         |        | 品种規格       |                                                            |
| 菸 酸 100.0 公絲          | 50.0 公絲                                                                     |        |            |                                                            |
| 淀 粉 26.8 公絲           | 43.8 公絲                                                                     |        |            |                                                            |
| 硬脂酸鎂 0.8 公絲           | 0.8 公絲                                                                      |        |            |                                                            |
| 操作要点                  | 取菸酸及淀粉(4.0公斤)分別篩过, 混合均匀, 取淀粉制成8%淀粉漿湿潤用16目篩制粒, 以70—80°C溫度干燥, 干粒加入硬脂酸鎂, 混勻压片。 |        |            |                                                            |
| 治疗范围                  | 本品适用于治疗癩皮病, 又有擴張血管作用, 适用視神經萎縮, 網膜变性等症。                                      |        |            |                                                            |
| 包裝規格                  | 100 片                                                                       |        | 失效期限       |                                                            |
| 儲运条件                  |                                                                             |        | 負責期限       | 3 年                                                        |



|                             |                               |                                                                                                                 |                            |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 产品名称                        |                               | 乳清酸片 Tabella Acidi Orotici (曾由信誼藥厂生产)                                                                           |                            |
| 規 格                         |                               | 衛生局暫行規定                                                                                                         |                            |
| 处<br><br><br>方              | 每十萬片      每片                  |                                                                                                                 | 劑量及<br>疗 程                 |
|                             | 乳 清 酸      10.0 公斤      0.1公分 |                                                                                                                 |                            |
|                             | 淀 粉      2.24公斤      22.4公絲   |                                                                                                                 | 內在質量<br><br>存在問題           |
| 硬脂酸鎂      0.1 公斤      1.0公絲 |                               |                                                                                                                 |                            |
| 方                           |                               | 品种規格                                                                                                            | 片重0.12公分, 每片含乳清酸<br>0.1公分。 |
| 操作要点                        |                               | 取乳清酸及淀粉(2.0公斤)分別篩过,混合均匀。用淀粉(0.24公斤)制成7%淀粉漿,湿润后,通过圓筒式顆粒机相当10~12目制粒,注意不要太松或太坚硬。以70°C溫度干燥,干后,通过16目篩,加硬脂酸鎂,混合均匀,压片。 |                            |
| 治疗范围                        |                               | 本品可用于急性和慢性肝炎脂肪肝、肝硬化黃疸及肝臟机能障碍等症                                                                                  |                            |
| 包裝規格                        |                               | 100片                                                                                                            | 失效期限                       |
| 儲运条件                        |                               | 密封保存                                                                                                            | 負責期限      3年               |