

傷寒廣要

傷寒廣要卷第十一

東都丹波元堅亦柔撰

德陽蘇榮權矩亭

同叅校

湔江白昭煌潤生藏書重印

華陽周鳳楷魯東

別證

感冒

感冒本與傷寒治證一同。但有輕重之分耳。故重者爲傷。輕者爲感。感冒之中有風有寒。又須詳別。夫感寒則必惡寒。面色黯慘。項背拘急。亦或頭痛發熱。其脈沉遲。當以五積散。藿香正氣散。養胃湯表之。感風則必惡風。面色光浮。身體發熱如瘡。鼻塞聲重。時出清涕。或欬唾稠粘。其脈多浮數。當以十神湯敗毒散。

入裏而重則為正傷寒

產人感冒
熱僅一日便見譫語

治或風寒兼之。又當用和解之藥。體虛之人不可過於發散。恐致他疾。

醫方集成

感冒為病。亦有風寒二證。即是傷寒外證。初感之輕者。故以感冒名之。若入裏而重。則是正傷寒。初感用藥。與太陽證一同。今病人往往惡言傷寒。不知輕則為感。重則為傷。又重則為中有其病。而諱其名。甚為無義。特以俗呼為大病。故諱言之耳。有微惡風。微發熱。起居飲食自如。常但不甚清快。又不可過用表劑。若投以和解。養胃清金之類。不效者。宜神朮散。有虛人感冒發熱。僅得一日。熱不為久。又不為重。便見譫語。此乃虛不禁熱。不可遽用十分冷劑。

要訣

輕揚之劑。以劑
者。薄荷。大力。
類。

虛人傷風。當補
中者。以四君子湯。

內經曰卑下之地春氣常在故東南卑濕之區風氣柔弱易傷
風寒俗稱感冒受邪膚淺之名也由鼻而入在於上部客於皮
膚故無六經形症惟發熱頭痛而已

醫方
集解

傷風見證 輕者欬嗽有痰咽乾聲重鼻燥作癢或流清涕腹
脹額悶口燥喉痛重者頭痛項強肢節煩疼憎寒壯熱頭眩嘔
吐心煩潮熱自汗惡風亦有無汗而惡風者

補
芩

傷風大汗宜禁 傷風症腠理疎洩但宜輕揚之劑徹越其邪
不可與傷寒家大汗之藥恐蹈亡陽之弊

上同

傷風久虛宜補 如虛人傷風屢感屢發形氣病氣俱虛者又
當補中而佐以和解倘專泥發散恐脾氣益虛腠理益疎邪乘

加去風藥不宜用
苦寒傷中。

平素氣體寒者
則無汗。熱則有
汗。

元氣。是指胃
氣。

虛入病反增劇也。

同力上感引立齋案此即陶節菴所謂

傷風寒甚者。徧傳經絡。已見傷寒論。此言其輕淺者。邪止犯皮
毛。皮毛爲肺之合。皮毛開則肺氣不得外洩。故上壅而噓。蒸成
涕液。壅塞鼻中。故聲出重濁。肺氣鬱而成熱。故肺癢而欬。其人
平素體氣寒者。則無汗。熱者則有汗。或發熱或不發熱。或頭痛
或不頭痛。蓋雖輕證。其中又分輕重也。醫編
感冒固輕。惟人以其輕忽之。亦足以傷生。其致不醒之故。亦各
有因。我將爲子備言之。以告知命者。當防微而杜漸也。今人感
冒。每率已見。用藥病未除。而元氣先傷。以致困者。一也有未冒
之前。元氣先虛。既冒之後。乘虛陷裏。虛邪併病。醫者未及辨明。

而誤藥者二也。有稟性怯弱。情志多鬱。素有骨蒸虛熱之恙。重
冒風寒。而欬傷肺絡。痰紅癆嗽者三也。有沈湎酒色。濕熱內傷。
當風露臥。復感風邪。而成勞瘵者四也。有行房不謹。汗出當風。
邪入三陰。傳爲虛羸。或成癆風者五也。有童子室女。情性執滯。
素多愁鬱。天癸不通。形神羸弱。偶冒風寒。內熱併病。而成癆者
六也。有體肥氣盛。情性素暴。不耐病苦。偶冒風寒。而煩躁愈甚。
酒色不戒。飲食失調。以致痰嗽。欬血。音啞喉痺。朝涼暮熱。大肉
脫盡而死者七也。有勞形役心。負重疾走。因躁熱而浴寒。飲冷
當風露坐。以致感冒。欬血。而成癆者八也。有師尼寡婦。嫁娶愆
期。憂思積忿。以致心相二火熾然日甚。偶感風邪。內外鬱蒸。而

成癆嗽欬血者九也。有產後氣血正虛，失於謹慎，為風所襲，邪入至陰，而為煩渴內熱之恙。醫者誤為產虛，不知清散補斂。太早則虛熱與邪熱同病，而成產癆者十也。此十種死症，余三十年來所見，指不勝屈。而觸冒之因，多由感冒。豈感冒遂能殺人，實由根本先敗，而然也。

證治百問

香蘇散治四時感冒頭痛發熱

○原云治四時瘟疫傷寒今據醫方集解度傷

陳皮

二兩 不去白

香附子

炒香 去毛

紫蘇葉

各四兩

甘草

炙一兩

右為麁末，每服三錢水一觔煎七分去滓，熱服不拘時候。日三服，若作細末，只服二錢，入鹽點服。
和劑 衛生家寶加減香蘇散於本方加麻黃蒼朮桔梗，管見良方芫芷香蘇散於

本方加川芎白芷 得效加蒼朮云一方加沉香名沉香飲子

十神湯治時令不正瘟疫妄行人多疾病或風寒濕痺可服之

陳橘皮

去白

麻黃

去節根

川芎

甘草

炙

香附子

作毛去

紫蘇

去梗鹿

白芷

升麻

赤芍藥

各四兩

乾葛

十四兩

右爲細末每服三大錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓

熱服不拘時候

和劑

是齋神授太乙散於本方去麻黃加青

皮得效香葛湯於本方去麻黃加蒼朮

參蘇飲治一切發熱頭疼體痛

前胡

人參

紫蘇葉

乾葛

半夏

茯苓

各三分

枳殼 陳皮 甘草 桔梗 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一箇煎至六分

去滓不以時候服尋常感冒風寒頭目昏重鼻流清涕宜用

此藥加川芎半兩煎服 易簡方云本出三因痰飲門无乾葛有木香云嘔者加乾葛腹痛加无

藥芎 和劑加木香 澹寮十味芎蘇散於本方去前胡人參

加川芎柴胡

敗毒散治傷風溫疫風濕頭目昏眩四肢痛憎寒壯熱項強目

睛疼尋常風眩拘倦風痰皆服神效

羌活 洗去土 獨活 去蘆 前胡 去蘆 柴胡 去苗 芎藭

枳殼 麸炒去穢 白茯苓 去皮 桔梗 去頭 人參 已上一兩各

甘草

炙半兩

右件搗羅爲末每服三錢入生薑二片水一盞煎七分或沸湯點亦可老人小兒亦宜日三二服以知爲度瘴煙之地或溫疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也

活人

和劑名人參敗毒散入生薑薄荷煎

○方訣聖濟並同名也活散方訣云此古方也

簡易云勿處世究其方知出道藏

聖濟前胡湯於本方去獨活茯苓桔梗

加芍藥麻黃入葱白煎如要發汗更入薄荷

眞武湯專一發散四時不正之氣及傷寒未分證候疹瘡欲出未出並宜服之

苦桔梗

荊芥穗

薄荷葉

紫蘇葉

乾葛

甘草節 瓜蒌根 牛旁子 各等分

右八味並無製度同爲麤末每服三錢水一盞煎至七分去

滓不拘日候溫溫服日進三五服 氏葉

神朮散治傷風鼻塞聲重欬頭昏

蒼朮 五兩米泔水浸一宿 藁本 去土 香白芷 羌活 去頭蘆

細辛 去葉 甘草 炙 川芎 各一兩

右件爲細末每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸同煎至七分溫服不拘時候如微覺傷風鼻塞只用葱茶調下 楊氏案

潔湯蓋久類方也

神白散治四時傷寒在表渾身壯熱口苦舌乾惡風無汗

蒼朮

米甜 焙乾 浸一宿 去皮

麻黃

根一兩 去節

甘草

炙一兩

防風

去一兩 蘆

石膏

研一兩

乾葛

一兩

川芎

一兩

香白芷

半兩

瓜蒌根

半兩

右爲末每服二錢水一盞入生薑三片葱白三寸煎至七分熱服如傷風身熱面赤脈大以衣覆出汗即愈

家寶

袖珍引

秘方喝起散於本方去白芷瓜蒌根加羌活

小青龍湯若其狀洒淅惡寒但欲厚衣近火陰陽

字疑

頭重時

痛鼻塞塞濁涕如膿痰動輒汗出亦或無汗甚則戰慄此由寒邪之氣從外入中或因飲冷客於肺經內外合邪留於經絡謂之感寒寒從外至則兩手寸口脈俱緊或寒從內起其

脈帶遲惡寒無汗者

○十便引景迷方

三拗湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘攣欬嗽多痰胸滿氣短

麻黃

根不去節

杏仁

皮不去尖

甘草

生用各分

右咬咀爲龜末每服五錢水一觔半薑錢五片同煎至一觔

去滓通口服以衣被蓋覆睡取微汗爲度

和劑

澹寮五拗湯

治感寒而語聲不出或卒咽喉腫痛於本方加桔梗京芥穗五味各等分生薑三片同煎溫溫嚥服咽喉痛甚者熟後加朴消少許

清肺湯

深都正方

陳紫蘇兩六

陳皮兩六

甘草兩三

香附子兩六

桑白皮兩三

杏仁兩三

桔梗兩三

半夏兩四

右件爲麤末每服五錢水一盞半薑五片棗子一箇煎七分

去滓通口服

方氏家藏

三奇湯治感寒語聲不出

桔梗

拌一兩到蜜上蒸

甘草

生半兩半炒半

訶子

四大箇

右爲細末每服十錢匕入沙糖一小塊水五盞煎至三盞細

細呷一日服盡效甚速聲未出再服

十便方引家藏

治傷風後耳聾 仲淳定

甘菊花

錢二

石菖蒲

忌錢藏

柴胡

分六

括萸根

錢二

貝母

去心 二錢

前胡

一錢

甘草

分六

北細辛

分四

蘇梗

一錢

桑白皮

忌鐵 二錢

加竹瀝一杯不拘時服

廣筆記

時毒大頭病

夫時毒者爲四時邪毒之氣而感之於人也其候發於鼻面耳
項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛肢體痛甚
者恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將爲傷寒便服解藥一二日
腫氣增益方悟始召瘡醫原夫此疾古無方論世俗通爲丹瘤
病家惡言時毒切恐傳染考之於經曰人身忽經變赤狀如塗
丹謂之丹毒此風熱惡毒所爲謂之丹瘤與夫時毒特不同耳

蓋時毒者感四時不正之氣初發如傷寒五七日之間乃能殺人治之宜精辨之先詳其脈滑數浮洪沉緊弦濇皆其候也蓋浮數者邪在表也沈濇者邪氣深也認是時毒氣實之人急服化毒丹以攻之熱實以五利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣軟者五香連翹湯主之又於鼻內嚙通氣散取十餘嚏作效若嚙藥不嚏者不可治之如嚏出一血者治之必愈如左右看病之人日用嚙藥嚏之必不傳染切須忌之其病人每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角散連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃

耆散宜針鑱砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若
五七日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知
味者必死之候治之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可
下嘗見一工但云熱毒只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從
不可不審者矣

外科
精義

時疫脰膈腫毒病者古方書論所不見其說古人無此病故方
無此說唯正隆楊公集拯濟方內言自天眷皇統間生於嶺北
次於太原後於燕薊山野村坊頗罹此患至今不絕互相傳染
多致死亡至有不保其家者狀似雷頭腫弘咽喉攻內則喉嚨
堵塞水藥難通攻外則頭面如牛眼耳穴盈視聽俱非杜絕聞