

卷

九 八

金匱要略集註折衷

陳善同識

金匱要略集註折衷卷八

漢張仲景原文

河南信陽胡毓秀補注

嘔吐噦下利病脈證治第十七

夫嘔家有癰膿。不可治。嘔膿盡自愈。

陳修園曰。此以癰膿之嘔。撇開以起下文諸嘔也。夫嘔吐或穀或水或痰飲涎沫。各不相同。今嘔家因內有癰膿。與諸嘔自當另看。不可治嘔。俟其膿盡。則嘔自愈。先嘔却渴者。此爲欲解。先渴却嘔者。爲水停心下。此屬飲家。嘔家本渴。今反不渴者。心下有支飲故也。此屬支飲。

陳修園曰。此以嘔後作渴爲欲解。先渴後嘔爲停飲。嘔而不渴爲支飲也。

胡毓秀曰。此以癰膿之嘔與飲家之嘔作爲撇筆。以引起下文諸嘔吐證也。蓋癰膿之嘔與飲家之嘔皆見肺癰肺痿痰飲咳嗽條。前論已詳。此特舉之作爲撇筆耳。

問曰。病人脈數。當消穀引飲。而反吐者何也。師曰。以發其汗。令陽微。膈氣虛。脈乃數。數爲客熱。不能消穀。胃中虛冷故也。脈弦者。虛也。胃氣無餘。朝食暮吐。變爲胃反。寒在於上。醫反下之。今脈反弦。故名曰虛。

唐容川曰。脈數爲熱。若熱在胃。則當消穀引飲而不吐也。反吐者。非胃有熱。乃客熱也。因過發其汗。令太陽之氣傷而微弱。不能充達于膈。膈與心包相連。太陽之氣從此而出者也。太陽之氣不充達于膈。則膈氣虛。膈虛連及心包。致脈不靖而數。凡人之脈。皆應心包而動。詳余中西醫解。脈氣動而脈數。故曰數爲客熱。以胃爲主。則膈爲客也。客熱在膈中。不在胃中。胃仍虛冷。故脈數而仍不能消穀也。此卽五瀉心湯及連理丸之治。又卽仲景所謂胃中空虛。客氣動膈之謂。膈與胃近。人不辨。是以此證此脈多不能明。此是言客熱爲上段。其下段又是言虛寒。分爲兩段。各不相蒙。連接解之。便不可通。下節云。脈弦者下焦虛寒也。乃反胃之候。而所以致此反胃脈弦者。何故。蓋寒本在上。而醫反下之。以致肝經下焦之陽亦虛。不能化穀。故胃反。今脈亦弦。是肝經下焦之虛寒。不僅胃冷而已也。按此兩段。

雖皆論胃。而一兼膈言。一兼肝言。當分別之。

胡毓秀曰。陽微膈氣虛以下數句。唐注尙有未透。宜參看傷寒太陽篇百二十四節。其言下焦肝寒入胃而爲嘔吐。則不差也。

寸口脈微而數。微則無氣。無氣則榮虛。榮虛則血不足。血不足。則胸中冷。

陳修園曰。寸口脈微而數。微則胃虛而無氣。無氣則榮氣隨衛氣而俱虛。榮氣隨之虛。則血日見不足。血不足。雖見陰火之數脈。而上焦之宗氣大虛。則胸中必冷。唐容川曰。此以脈微爲主。而兼見數脈。故爲真寒假熱。若脫微字。言數脈。則非真。

寒假熱之脈矣。故主仲景書一字不可略過。微則無氣。以下數句注更不透。蓋氣化津液。微則陽氣微而氣乏。氣乏則津液不足。內經云水入于經其血乃成。是言津液上交于心。卽化爲血。西洋醫書及余中西醫解言之甚詳。此云無氣則榮虛者。卽謂津液不能化血也。故曰榮虛則血不足。血者心血之化。血足則火旺。血不足則胸中冷。指心包絡血不溫通而言。致嘔之由亦多有此。若脫去嘔字。又于榮衛生化之理不能透澈。則浮淺矣。

尤在涇曰。合上二條言之。客熱固非真熱。不可以寒治之。胸中冷亦非真冷。不可以熱治之。是皆當以溫養真氣爲主。真氣冲和純粹之氣也。此氣浮則生熱。沉則生冷。溫之則浮焰自收。養之則虛冷自化。若熱以寒治。寒以熱治。則真氣愈虛。寒內賊。而其病愈甚矣。

胡毓秀曰。上節之客熱。是因胸膈氣虛。外邪內侵。故其熱爲客熱。此節胸中冷。是血分之火。與氣分之陽皆不足。胸中陽氣不宣通。故胸中冷。且陽氣不足。心火不能生土。胃虛不能化水。脾虛不能化谷。水谷停滯不化。久亦吐出。凡虛寒嘔吐。屬此類者亦多。寒則宜治以熱。熱則宜治以寒。尤注謂熱非真熱。冷非真冷。皆不可以寒熱之法治之。當以溫養真氣爲主。如何溫養法。不免含混。

跌陽脈浮而濇。浮則爲虛。濇則傷脾。脾傷則不磨。朝食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脈緊而濇。其病難治。

陳修園曰。胃者陽也。脾者陰也。跌陽脈浮而濇。浮則爲胃之陽虛。濇則爲陰虛。而

傷在脾。脾傷則胃中所納之穀。不能消磨。化爲糟粕而出。朝食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。不下行而上出。名曰胃反。若脈和緩。其土氣尙未敗也。倘若邪甚而緊。液竭而濇。其病難治。

唐容川曰。濇爲陰虛。液竭而濇。陰液二字。陳注頗確。惜未發明。且注緊字亦未顯。蓋飲食入胃。胃爲陽土。主燥以化水。脾爲陰土。主潤以化穀。脈濇則陰液虛。不能濡化。谷食西醫謂有甜肉汁入胃。化谷亦卽此理。今之膈食病。糞如羊屎者。皆是陰液虛故也。然往往治愈。則以脾陰虛而胃陽不虛。治陰不虛。損陽是以可愈。若脈緊而濇。緊則爲寒。寒傷胃。陽脾陰虛而胃陽亦虛。補陽則傷陰。滋陰則損陽。故爲難治。

又曰。嘔吐胃反。無不兼別臟之病者。故上三節脈數者是兼膈氣。脈弦者是兼肝。

虛脈微數者是兼心血虛。脈浮濇者是兼脾土虛。讀仲景書須如此分看合看。乃能貫通。

胡毓秀曰。虛濇二字皆指脾言。浮則爲虛。言脾陰虛而胃陽浮也。陳注浮爲胃陽浮有誤。且上文浮濇與下文緊濇正相對。脈見浮濇脾陰雖虛而胃陽不虛。滋陰不虞損陽尙爲可治。若脈緊濇是脾陰胃陽俱虛故爲難治。又按以上三節脈數者是膈熱胃寒。脈弦者是肝寒乘胃。脈微數者是胸中陽衰火不生土。脈浮濇者是脾之陰虛不能濡潤而尤以肝之寒熱乘胃者爲多。蓋肝主胞宮。衝脈起于胞宮上合陽明胃脈。或肝寒則挾寒水循衝脈乘胃而爲嘔吐。或肝熱則挾木火循衝脈乘胃而爲嘔吐。故嘔吐證多属于厥陰經也。凡胃反朝食暮吐暮食朝吐多因肝寒乘胃其脈必虛弦。余見之屢矣。

病人欲吐者。不可下之。噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之愈。

陳修園曰。病人欲吐者。病勢在上。不可強下之。噦雖在上。而腹滿却不在上。是病在下。而氣溢于上也。當視其前後二便。知何部不利。以藥利之而愈。又曰。此二節言病勢之欲上欲下。宜順其勢而利導之也。噦症應歸橘皮竹茹湯節。此特舉之。與上節爲一上一下之對子。非錯簡也。

胡毓秀曰。以上三節皆論嘔吐反胃之症。致嘔吐之由。以下十六節皆論治嘔吐噦之方。此節承上起下。提出嘔噦二證。所以胃起下文諸方也。仲景書皆先

嘔而胸滿者。吳茱萸湯主之。

吳茱萸湯方

吳茱萸

一升

人參

三  
四

生薑

六兩

大棗

十二枚

右四味以水五升。煮取三升。溫服七合。日三服。

# 乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之。

陳修園曰。有聲無物。謂之乾嘔。無物則所吐者盡是涎沫。更兼頭痛者。是寒氣從經脈上攻于頭也。以吳茱萸湯主之。溫補以降濁陰。又以折逆衝之勢也。

李彬曰。少陰太陰經俱不上頭。二經並無頭痛證。厥陰經上出額。與督脈會于巔。故乾嘔吐涎沫者。裏寒也。頭痛者。寒氣從經脈上攻也。不用桂附。用吳茱萸者。以其入厥陰經故耳。

胡毓秀曰。嘔而胸滿。乾嘔吐涎沫。頭痛。皆肝挾下焦寒邪上攻之證。不用桂附。因病已移于肝。卽從肝治之。故不用桂附。而用吳茱萸以降肝經脈之寒。嘔吐後。

金匱要略卷八  
嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之  
中氣已傷。故用人參大棗以補之。重用生姜者。因其能宣達陽氣。且散寒降逆也。

### 嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之。

唐容川曰。此心下痞。仍是指膈言。觀胸痺及結胸陷胸痞滿等證。皆指膈間言。蓋心包絡連肺系。循腔子爲一層白膜。至肋骨盡處。則爲膈。由膈而下。爲油網。以達心火于小腸。此心與小腸相表裏之路徑也。凡人飲水入胃。走膜膈下油網。以至膀胱。絕不從小腸中行也。詳吾中西醫解。今心下膈間火不達于小腸。水不走入膀胱。水火糾結。則爲心下痞。上逆胃肺。則爲嘔。下溢犯小腸。則爲腸鳴。皆水火糾結所致。故用姜半以破水。芩連以制火。參草甘棗。保胃實腸。使水火不犯腸胃。各

循其消導之路。則愈。必如是解。而後仲景所論痞滿陷胸。皆能會通矣。

胡毓秀曰。生薑半夏甘草三瀉心湯。皆從小柴胡湯套出。吾于太陽篇百五十節論之已詳。柴胡證是膜網中水火不調。因外有寒熱往來之表證。正氣尙有外達之象。故用柴胡升達正氣。瀉心證外無寒熱。故不用之。柴胡證膜中水火不調。故用芩清火。用半降水。瀉心證外無寒熱。邪已入裏。水火之糾結已深。恐黃芩力薄。故加黃連助之。以清火。恐半夏力薄。故加乾薑助之。以去水。其用連薑。仍同于柴胡湯之用芩半也。邪已入裏。水火糾結已深。鬱蒸不解。則停痰聚飲。故心下痞閉不通。逆入胃中。則嘔吐下。犯小腸。則腸鳴。故用芩連薑半。以調胸膈油膜中之水火寒熱。嘔後中氣傷。故加參草補中氣。觀此節嘔而兼腸鳴。心下痞者。半夏瀉心湯主之。可知此症之嘔。全係膜膈間水火糾結所致。然此

等要義則知者妙矣。

半夏瀉心湯方

半夏

半升洗

黃芩

乾薑

人參

甘草

各三兩

黃連

一兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服。

乾嘔而下利者黃芩加半夏生薑湯主之。

陳修園曰。乾嘔胃氣逆也。若下利清穀乃腸中寒也。今乾嘔而下利濁粘者是腸中熱也。可知嘔爲熱逆之嘔。利爲協熱之利。以黃芩加半夏生薑湯主之。

黃芩加半夏生薑湯方

黃芩

生薑

各三兩

甘草

二兩

芍藥

一兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

胡毓秀曰。下文嘔而發熱。用小柴胡湯。此節乾嘔下利。用黃芩加生薑半夏湯。其邪皆在少陽三焦。惟同一作嘔。而兼證不同。故其方亦異。兩處若不對勘。尙不知仲景用藥之精也。蓋嘔而發熱。是少陽之氣鬱而不達也。故用柴胡湯調和水火。升達正氣。恐柴胡力薄。加人參補氣以助之。使少陽之氣得外達而嘔與發熱自解矣。此節少陽之邪。雖上攻爲嘔。但邪雖上逆。而又兼下利。猶欲從

大腸外出也。邪已下注，不宜挽之上行。且外無寒熱，故不用參柴。用生薑半夏降逆以止嘔。用黃芩清膜中之火。芍藥平肝導之下行。而邪由大腸解矣。總之嘔而下利，嘔而發熱，其病皆在少陽三焦。三焦爲水火氣三者往來之路。少陽爲病，皆膜網中水火不調，寒熱偏勝之故。故用黃芩半夏調和水火，生薑降逆止嘔，甘棗補中氣以轉樞上下。其用藥絲絲入扣，注家尙未能解。

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之。

陳修園曰：有聲無物爲嘔，有物無聲爲吐。諸嘔吐有寒有熱，食入卽吐熱也。朝食暮吐寒也。而此則非寒非熱，但覺痰凝于中，谷不得下咽者，以小半夏湯主之。祛停飲散氣結降逆安胃自效。