

中药标本

福建中医学院药学系

编写说明

《中药标本》是与《中药学》新世纪全国高等中医药院校五年制规划教材（第一版）、《临床中药学》新世纪全国高等中医药院校七年制规划教材（第一版）相配套的教学用书。范围与教材的教学大纲、教学内容一致。《中药标本》的编写顺序与教材的章、节顺序一致，以方便学生同步拓宽知识，也便于与教材配套学习。读者主要是高等中医药院校五年制本科生、七年长学制教育、成人本科教育学生及其他学习中医药人员。经过本书的学习，将使已学过中药临床应用知识的学生能认识药物，避免懂医懂药而不识药，达到医药结合，合理用药，准确用药，成为合格的高层次新世纪中医药人才。

《中药标本》分二十一章，章内有节，覆盖了中药学的多个知识点，对每味中药分别介绍了来源、别名、产地与采制、性能、功效、性状（形状、颜色、质地、断面、气味、质量标志）、用法用量、附药、伪品等方面，广而不杂，简明有序。

《中药标本》配有多媒体课件，在每一味药物除上述文字说明外，还附有原植物、原药材、饮片及炮制品的图片，做到图文并茂，形象直观。

由于编写的时间仓促，若有不足之处，请读者谅解，并提宝贵的修改意见，以使本教材不断完善，有所提高。

编者

2006年1月第2版

凡例

本教材是与《中药学》、《临床中药学》相配套的教学用书。本书分三部分记载。

第一部分：收载全国各地常用中药 538 味，按主要功效分列为二十一章介绍，每种药材一般按名称、汉语拼音、来源、别名、产地与采制、性能、功效、性状鉴别、用法用量、附药及伪品等项目依次编写。具体包括：

1、名称：每味药均以《中华人民共和国药典·一部》2000 版及有关各省现行《中药材标准》的名称为正名，并注拼音名、别名。

2、来源：植物药记述科名、植物名、学名及药用部分；动物药加注所属纲、目名；矿物药记其原矿物和加工品的名称。同一名称药材有两种或两种以上植（动）物来源的，则依次一并记载。

3、产地与采制：记述药材的主产地及集散地，如有栽培亦加注明。并记述产地采收季节和加工方法。

4、性能与功效：包括性、味、归经以及主要功效，括号内功效为七年制规划教材功效，同时对有毒者亦有注明。

5、性状鉴别：药材性状结合经验鉴别，按形状、大小、颜色、表面特征、质地、断面、气味等作性状描述，并记述中药经验鉴别中认为品质最佳的特点。
对于用现代科学方法研究药材品质的评价，亦有提及。

6、用法用量：指成人一日内服剂量及方法，对炮制后功效有变化者说明区别用法，对有毒药物剂量的标定严格执行法定标准，注意安全有效。

7、附药：包括与正文药物来源相同但药用部分不同的药材；原药物其他药用部位；同属药物的类同品、混淆品等可资参考者。

8、伪品：阐述伪品药材性状经验鉴别，予区别与正品药材。

第二部分：附所载药物的图谱光碟。

第三部分：列举常用的中药炮制方法。

附录：列举所引用的主要书籍及近年来国内外期刊。

普通高等教育“十五”国家规划教材

配套教学用书

新世纪全国高等中医药院校规划教材

《中药标本》目录

各 论

第一章 解表药

第一节 发散风寒药

麻黄（附药：麻黄根）	1
桂枝	1
紫苏（附药：紫苏梗）	2
生姜	3
香薷	3
荆芥	4
防风	4
羌活	5
白芷	6
细辛	6
藁本	7
苍耳子	7
辛夷	8
鹅不食草	8
胡荽	9
桉柳	9

第二节 发散风热药

薄荷	9
牛蒡子	10
蝉蜕	10
桑叶	11
菊花	11
蔓荆子	12
柴胡	13

升麻	14
葛根（附药：野葛）	14
淡豆豉（附药：黑豆豉）	15
浮萍	15
木贼	16

第二章 清热药

第一节 清热泻火药

石膏	16
寒水石	17
知母	17
芦根	18
天花粉	19
淡竹叶（附药：苦竹叶）	19
鸭跖草	20
栀子	20
夏枯草	21
决明子	21
谷精草	21
密蒙花	22
青葙子	22

第二节 清热燥湿药

黄芩	23
黄连	23
黄柏	24
龙胆	24

秦皮	25
苦参	25
白鲜皮	26
苦豆子	26
三棵针	27
马尾连	27

第三节 清热解毒药

金银花(附:忍冬藤)	28
连翘	28
穿心莲	29
大青叶	29
板蓝根	30
青黛	30
贯众	31
蒲公英	32
紫花地丁	32
野菊花	32
重楼	33
拳参	33
漏芦	34
土茯苓	34
鱼腥草	35
金荞麦	35
大血藤	36
败酱草(附:墓头回)	36
射干	37
山豆根(附:北豆根)	37
马勃	38
青果	39
金果榄	40
木蝴蝶	40
白头翁	41
马齿苋	41
鸦胆子	41
地锦草	42
委陵菜	42
翻白草	43
半边莲	43

白花蛇舌草	44
山慈菇	44
熊胆	45
千里光	45
白蔹	46
四季青	46
绿豆	47

第四节 清热凉血药

生地黄	47
玄参	47
牡丹皮	48
赤芍	48
紫草(附药:紫草茸)	49
水牛角	49

第五节 清虚热药

青蒿	50
白薇	51
地骨皮	51
银柴胡	52
胡黄连	52

第三章 泻下药

第一节 攻下药

大黄	53
芒硝	53
番泻叶	54
芦荟	54

第二节 润下药

火麻仁	55
郁李仁	56

第三节 峻下逐水药

甘遂	56
京大戟(附药:红芽大戟)	57
芫花	57
商陆	58
牵牛子	58

巴豆	59
千金子	59
第四章 祛风湿药	
第一节 祛风寒湿药	
独活	60
威灵仙	60
川乌(附药:草乌)	61
蕲蛇(附药:金钱白花蛇)	61
乌梢蛇(附药:蛇蜕)	62
木瓜	63
蚕沙	64
伸筋草	64
寻骨风	64
松节	65
海风藤	65
青风藤	66
丁公藤	66
昆明山海棠	67
雪上一枝蒿	67
路路通	68
第二节 祛风湿热药	
秦艽	69
防己	69
桑枝	71
豨薟草	71
臭梧桐	71
海桐皮	72
络石藤	73
雷公藤	73
老鹤草	74
穿山龙	74
丝瓜络	75
第三节 祛风湿强筋骨药	
五加皮	75
桑寄生	76
狗脊	77

千年健	77
雪莲花(附药:天山雪莲花)	77
鹿衔草	78
石楠叶	79
第五章 化湿药	
藿香	79
佩兰	80
苍术	81
厚朴(附药:厚朴花)	81
砂仁(附药:砂仁壳)	82
豆蔻	83
草豆蔻	84
草果	84
第六章 利水渗湿药	
第一节 利水消肿药	
茯苓	85
薏苡仁	86
猪苓	86
泽泻	87
冬瓜皮(附药:冬瓜子)	87
玉米须	88
香加皮	88
枳椇子	88
泽漆	89
蝼蛄	89
荠菜	90
第二节 利尿通淋药	
车前子	90
滑石	91
关木通(附药:川木通)	91
通草	92
瞿麦	92
萹蓄	93
地肤子	93
海金沙	94
石韦	94
冬葵子	95

灯心草	95
草薢	96

第三节 利湿退黄药

茵陈	96
金钱草	97
虎杖	97
地耳草	98
垂盆草	98
鸡骨草	99
珍珠草	99

第七章 温里药

附子	100
干姜	101
肉桂	102
吴茱萸	102
小茴香(附药:八角茴香)	103
丁香(附药:母丁香)	104
高良姜	105
胡椒	105
花椒	106
草茛	106
草澄茄	107

第八章 理气药

陈皮	107
青皮	108
枳实	109
木香	110
沉香	110
檀香	111
川楝子	111
乌药	112
青木香	112
荔枝核	113
香附	113
佛手	114
香橼	115
玫瑰花	116

绿萼梅	116
娑罗子	116
薤白	117
天仙藤	117
大腹皮	118
甘松	118
九香虫	119
刀豆	119
柿蒂	120

第九章 消食药

山楂	120
神曲	121
麦芽	121
稻芽(附药:谷芽)	122
莱菔子	123
鸡内金	123
鸡矢藤	124
阿魏	124

第十章 驱虫药

使君子	125
苦楝皮	125
槟榔	126
南瓜子	126
雷丸	127
鹤虱	127
榧子	127
芜荑	128

第十一章 止血药

第一节 凉血止血药

小蓟	128
大蓟	129
地榆	129
槐花(附药:槐角)	130
侧柏叶	131
白茅根	131
苎麻根	132
羊蹄	132

第二节 化瘀止血药

三七	133
茜草	133
蒲黄	134
花蕊石	134
降香	135

第三节 收敛止血药

白及	135
仙鹤草	136
紫珠	136
血余炭	137
藕节	137
槲木	138

第四节 温经止血药

艾叶	138
炮姜	139
灶心土	139

第十二章 活血化瘀药

第一节 活血止痛药

川芎	139
延胡索	140
郁金	140
姜黄	142
乳香	142
没药	143
五灵脂	143
夏天无	144
枫香脂	145

第二节 活血调经药

丹参	145
红花	146
桃仁	146
益母草	146
泽兰	147
牛膝	148

鸡血藤	148
王不留行	149
月季花	149
凌霄花	150

第三节 活血疗伤药

土鳖虫	150
马钱子	151
自然铜	151
苏木	152
骨碎补	152
血竭	153
儿茶	154
刘寄奴	154

第四节 破血消癥药

莪术	155
三棱	156
水蛭	156
虻虫	157
斑蝥	158
穿山甲	158

第十三章 化痰止咳平喘药

第一节 温化寒痰药

半夏	159
天南星	159
白附子	160
白芥子	160
皂荚	161
旋覆花	161
白前	162
猫爪草	162

第二节 清化热痰药

川贝母	163
浙贝母	164
瓜蒌	165
竹茹	165
竹沥	165

天竺黄	166
前胡	166
桔梗	167
胖大海	167
海藻	168
昆布	169
黄药子	169
海蛤壳	170
海浮石	170
瓦楞子	171
礞石	171

第三节 止咳平喘药

苦杏仁	172
紫苏子	172
百部	173
紫菀	174
款冬花	174
马兜铃	175
枇杷叶	175
桑白皮	176
葶苈子	176
白果	177
矮地茶	177
洋金花	178
华山参	178
罗汉果	179
满山红	179
胡颓子叶	180

第十四章 安神药

第一节 重镇安神药

朱砂	180
磁石	181
龙骨	181
琥珀	182

第二节 养心安神药

酸枣仁	182
-----	-----

柏子仁	183
灵芝	183
缬草	184
首乌藤	184
合欢皮	185
远志	185

第十五章 平肝息风药

第一节 平抑肝阳药

石决明	186
珍珠母	187
牡蛎	187
紫贝齿	188
代赭石	188
刺蒺藜	189
罗布麻	189
生铁落	190

第二节 息风止痉药

羚羊角	190
牛黄	191
珍珠	191
钩藤	192
天麻	193
地龙	193
全蝎	194
蜈蚣	195
僵蚕	195

第十六章 开窍药

麝香	196
冰片	197
苏合香	198
石菖蒲	198

第十七章 补虚药

第一节 补气药

人参	199
西洋参	200
党参	201

太子参	201
黄芪	202
白术	202
山药	203
白扁豆	204
甘草	205
大枣	205
刺五加	205
红景天	206
沙棘	206
蜂蜜	207

第二节 补阳药

鹿茸	207
紫河车	208
淫羊藿	209
巴戟天	210
仙茅	210
杜仲	211
续断	211
肉苁蓉	212
锁阳	212
补骨脂	213
益智仁	213
菟丝子	214
沙苑子	214
蛤蚧	215
核桃仁	215
冬虫夏草	216
胡芦巴	216
韭菜子	217
阳起石	217
紫石英	218
海狗肾	218
海马	218
哈蟆油	219

第三节 补血药

当归	220
----	-----

熟地黄	220
白芍	221
阿胶	221
何首乌	222
龙眼肉	223
楮实子	223

第四节 补阴药

南沙参	223
北沙参	224
百合	225
麦冬	225
天冬	226
石斛	226
玉竹	227
黄精	228
明党参	229
枸杞子	229
墨旱莲	230
女贞子	230
桑椹	231
黑芝麻	231
龟甲	231
鳖甲	232

第十八章 收涩药

第一节 固表止汗药

麻黄根	233
浮小麦	233
糯稻根须	233

第二节 敛肺涩肠药

五味子	234
乌梅	234
五倍子	235
罂粟壳	236
诃子	236
石榴皮	237
肉豆蔻	237
赤石脂	238

禹余粮·····	238
第三节 固精缩尿止带药	
山茱萸·····	238
覆盆子·····	239
桑螵蛸·····	239
金樱子·····	240
海螵蛸·····	241
莲子·····	241
芡实·····	242
刺猬皮·····	242
椿皮·····	243
鸡冠花·····	243
第十九章 涌吐药	
常山·····	244
瓜蒂·····	244
胆矾·····	244
第二十章 攻毒杀虫止痒药	
常用中药炮制方法·····	253
附录·····	259

雄黄·····	245
硫黄·····	246
白矾·····	246
蛇床子·····	247
蟾酥·····	247
樟脑·····	248
木鳖子·····	248
土荆皮·····	249
蜂房·····	249
大蒜·····	250
第二十一章 拔毒化腐生肌药	
升药·····	250
轻粉·····	250
砒石·····	251
铅丹·····	251
炉甘石·····	252
硼砂·····	252

第一章 解 表 药

第一节 发散风寒药

麻 黄 *Mahuang*

【来源】为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf.、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C.A.Mey. 或木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge. 的草质茎。

【别名】木麻黄。

【产地与采制】主产于河北、山西、内蒙古、甘肃等地。秋季采割绿色的草质茎，晒干，除去木质茎、残根及杂质，切段。生用、蜜炙或捣绒用。

【性能】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功效】发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。（发汗解表，宣肺平喘止咳，利尿消肿。）

【性状】

1、草麻黄

形状：细长圆柱形，有的带木质茎，草质茎少分枝、黄绿色，节间有细纵棱线，节上有细小鳞叶2片，锐三角形，基部联合呈筒状。

颜色：木质茎棕色，草质茎黄绿色，上部灰白色，基部棕红色。

质地：体轻，质脆，易折断。

断面：略呈纤维状，周边绿黄色，内心红黄色（俗称玫瑰心，为麻黄的主要成分）。

气味：气微香，味涩、微苦。

质量标志：以身干茎粗、淡绿色、内心充实、微有香气、味苦涩者为佳。

2、木贼麻黄 茎细长圆柱形，多分枝，较草麻黄稍细，表面草绿色至黄绿色，节上有2片膜质鳞叶，灰白色，上端多不反曲，基部棕红至黑棕色，连合成筒状。其它与草麻黄品种相似。

【用法用量】煎服，2~9g。生麻黄偏发汗解表，但麻黄绒药性缓和；水炙麻黄多止咳平喘，蜜炙麻黄尚润肺。

【附药】麻黄根

为麻黄的干燥根及根茎，呈圆柱形，略弯曲，表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹及支根痕。外皮粗糙，易成片状剥落。根茎具节，表面有横长突起的皮孔。体轻，质硬而脆，断面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，纹呈放射状，中部有髓，气微，味微苦。

桂 枝 *Guizhi*

【来源】为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。

【别名】嫩桂枝。

【产地与采制】主产于广东、广西及云南省。春、夏二季采收，除去叶，晒干或切片晒干。生用、炒用或蜜炙。

【性能】辛、甘，温。归心、肺、膀胱经。

【功效】发汗解肌，温通经脉，助阳化气。（发汗解表，温通经脉，温助阳气。）

【性状】

形状：呈圆柱形，多分枝，有纵棱线及小疙瘩状的叶痕、枝痕及芽痕，皮孔点状椭圆形。

颜色：外皮紫红棕色或红棕色。

断面：质脆易断，断面红黄色，粗枝断面黄白色，髓部略呈方形。

气味：气清香，味甜而辣，外皮味较浓。

质量标志：以枝条细嫩均匀、色红棕无枯枝、香气浓者为佳。

【用法用量】煎服，3~9g。桂枝段发汗温经助阳，炒桂枝温通力强，蜜炙桂枝补中助阳力优。

紫 苏 Zisu

【来源】为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的茎、叶，其叶称紫苏叶，其茎称紫苏梗。

【别名】苏叶、紫苏。

【产地与采制】我国南北均产。夏秋季采收，除去杂质，晒干，生用或炒用。

【性能】辛，温。归肺、脾经。

【功效】解表散寒，行气宽中。（发散风寒，行气宽中。）

【性状】 上下毛

形状：叶片多皱缩卷曲、破碎。完整叶片卵圆形，先端尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿，下表面有多数凹点状腺鳞。叶柄长，常有嫩枝相间。

颜色：叶片两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，疏生灰白色毛，嫩枝叶紫绿色。

断面：中部有髓。

气味：气清香，味微辛。

质量标志：以叶大、完整、色紫、香气浓者为佳。

【用法用量】煎服，5~9g，不宜久煎。紫苏叶偏发表散寒；紫苏梗偏于行气宽中；炒苏叶发汗较微，但少用。

【附药】紫苏梗

为紫苏的茎。性味辛、甘，微温。归肺、脾、胃经。功能宽胸利膈，顺气安胎。

性状

形状：茎呈方柱形，四棱钝圆，四面有纵沟，有细纵纹，节部稍膨大，有对生的枝痕或叶痕。

颜色：表面紫棕色或暗紫色。

质地：体轻，质硬。

断面：裂片状。

气味：气香，味淡。

质量标志：以外皮紫棕、粗壮、分枝少、香气浓者为佳。

生 姜 Shengjiang

【来源】为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的新鲜根茎。

【别名】姜、鲜姜、干姜。

【产地与采制】各地均产。秋冬二季采挖，除去须根及泥沙，切片，生用、煨用。

【性能】辛，温。归肺、脾、胃经。

【功效】解表散寒，温中止呕，温肺止咳。（发散风寒，温中止呕，温肺止咳。）

【性状】

形状：呈扁平的不规则块状，并有指状分枝，各分枝顶端有茎痕或芽，有环节。

颜色：表面黄白色或灰白色，具光泽，环节浅棕色。

质地：质脆，易折断。

断面：浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。

气味：气香特异，味辛辣。

质量标志：以块大、丰满、质嫩者为佳。

【用法用量】煎服，3~9g，或捣汁服。生姜片功效如上述；煨生姜温中降逆、和中止呕。

香 薷 Xiangru

【来源】为唇形科植物石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. 及江香薷 *Mosla chinensis* Maxim. cv. *jiangxiangru*. 的干燥地上部分。前者称青香薷，后者称江香薷。

【别名】香茹、香芋、细香薷。

【产地与采制】青香薷主产于广西、湖南、湖北等地，系野生，多自产自销；石香薷主产于江西宜分县，为栽培品，产量大而质量佳，行销全国。夏秋二季茎叶茂盛、果实成熟时采割，除去杂质，晒干，切段，生用或绞汁。

【性能】辛，微温。归肺、脾、胃经。

【功效】发汗解表，化湿和中，利水消肿。（发散风寒，化湿和中，利水消肿。）

【性状】

1、海州香薷，习称西香薷。

形状：全体密被白色茸毛，茎方柱形，节明显。叶对生，多脱落，叶片展开后呈长卵形或披针形，边缘有疏锯齿。

颜色：基部紫红色，上部黄绿色或淡黄色。

质地：茎质脆易断。

断面：白色，有松泡髓心。

气味：气清香而浓，味微辛凉，略麻舌。

2、石香薷：习称“南香薷”、“细叶香薷”。

形状及颜色：全体灰绿色披白色柔毛，叶片多条状长圆形或条状披针形。
质量标志：两种均以枝嫩、叶多，香气浓者为佳。

【用法用量】煎服，3~9g。用于发表，量不宜过大，且不宜久煎；用于利水消肿，量宜稍大，且须浓煎。生品功效如上述；香薷汁可辟除口臭。

荆 芥 Jingjie

【来源】为唇形科植物荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 的干燥地上部分。

【别名】荆芥穗、假苏、姜芥、麻荆芥。

【产地与采制】主产于江苏、浙江、河南、河北、山东等地。多为栽培。夏秋二季花开到顶、穗绿时采割，除去杂质，晒干，切段。生用或炒炭用。

【性能】辛，微温。归肺、肝经。

【功效】祛风解表，透疹消疮，止血。（发表散风，透疹消疮，炒炭止血。）

【性状】

形状：茎方形，被短柔毛，叶对生，多脱落，叶片分裂，裂片细长。穗状轮伞花序顶生，花冠多脱落，有小坚果。

颜色：表面淡黄绿色或淡紫红色，小坚果黑棕色。

质地：体轻，质脆，易折断。

断面：纤维状，中心有白色疏松的髓。

气味：气芳香，味微涩而辛辣。

质量标志：以色淡黄绿、穗长而密、香气浓者为佳。

【用法用量】煎服，4.5~9g，不宜久煎。发表透疹消疮宜生用；止血宜炒炭用。荆芥穗更长于祛风。生品无理血止血之功，荆芥穗尤擅疏散头面之风，荆芥炭有理血止血之功。

防 风 Fangfeng

【来源】为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turez.) Schischk. 的根。

【别名】防丰、屏防、北风、苏风、风肉。

【产地与采制】主产于东北及内蒙古东部。春、秋二季采挖未抽花茎植株的根，除去须根及泥沙，晒干。切片，生用或炒炭用。

【性能】辛、甘，微温。归膀胱、肝、脾经。

【功效】祛风解表，胜湿止痛，止痉。（发表散风，祛风湿，止痛，止痉。）

【性状】始载《神农本草经》。商品分东防风、西防风、水防风。

1、东防风：主产于黑龙江、辽宁、吉林。

形状：圆柱形，顶端钝尖，有密集细环节如蚯蚓，俗称“蚯蚓头”。细环上带有部分毛须，为叶基部残存的维管束。细环节之下多皱缩并有横长皮孔。

颜色：表面灰黄色或灰褐色，毛须黄色纤维状。

质地：质松脆，易折断。

断面：中间有黄色圆心（木质部），心外有棕色环（形成层），最外层淡棕黄色（皮部），有裂隙。

· 气味：微有香气，味甘后微苦。

2、西防风：主产内蒙古，河北。西防风又名口防风。

形状：形态基本与东防风相同，唯顶端环节较小，残存维管束较多，俗称“扫帚头”。皱纹较多。

颜色：皮色较浅。

断面及气味与东防风相同。

质量标志：以上两种根条肥大、平直、皮细质柔、断面黄白色、中心色黄、显菊花心者为佳。

3、水防风：主产河南郑州、洛阳汜水（又名汜水防风）。

形状：细长条形，弯曲不整，顶端有短芦，下多纵皱。少有小枝根及微凸起的须根痕。

质地：质柔易折断。

颜色：表皮土黄色。

断面：淡棕黄色，有黄色圆心。

气味：气微，味甘。

质量标志：以条长均匀、不带芦头、体柔、断面黄白色、中间有黄色花纹者为佳。

【用法用量】煎服，4.5~9g。防风功效同上述；防风炭温经止血。

【伪品】沙茴香

来源：伞形科（Umbeliferae）植物硬阿魏 *Ferula bungeana* Kitag. 的干燥根。

性状：圆柱形，下部较细，多已折断，长短不一，直径3-8mm。根头有少数灰褐色的纤维状叶基残存，表面黄棕或淡灰褐色。质松脆，易折断，断面皮部色较深，切断面皮部可见放射状纹理及多数眼点，木部为致密的放射状纹理。气特异，味似胡萝卜，微甜。

羌活 Qianghuo

香 烈 浓

【来源】为伞形科植物羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H. Chang 或宽叶羌活 *Notopterygium forbesii* Boiss. 的干燥根茎及根。

【别名】川羌活、西羌活、竹节羌、蚕羌。

【产地与采制】羌活主产于四川、云南、青海、甘肃等省。宽叶羌活主产于四川、青海、陕西、河南等省。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。切片，生用。

【性能】辛、苦，温。归膀胱、肾经。

【功效】解表散寒，祛风胜湿，止痛。（解表散寒，祛风湿，止痛。）

【性状】

形状：呈不规则团块或略弯曲的长柱形，如姜块、如蚕形或竹节状，周身密布突起的瘤结，有须根、支根的残基。并有紧密的环状节纹，亦有少数无环状节纹，也有些横纹及纵纹和少数瘤结，或一段有瘤结及环节，但也有无瘤结及环节的。

颜色：表面棕褐色或棕黑色。

质地：体轻质脆，易碎断，组织较疏松。

断面：可见黄棕色油点。

质量标志：以条粗、表面棕褐，断面朱砂点匀，色香浓者为佳。

【用法用量】煎服，3~9g。

白 芷 Baizhi

【来源】为伞形科植物白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。

【别名】川白芷、杭白芷、香白芷。

【产地与采制】白芷产于河南长葛、禹县者习称“禹白芷”，产于河北安国者习称“祁白芷”。此外陕西和东北亦产。杭白芷产于浙江、福建、四川等省，习称“杭白芷”和“川白芷”。夏、秋间叶黄时采挖，除去须根及泥沙，晒干或低温干燥。切片，生用、炒用或炭用。

【性能】辛，温。归肺、胃、大肠经。

【功效】解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。

【性状】

形状：呈长圆锥形，顶端有凹陷的茎痕，根头部钝四棱形（杭白芷）或圆形（川白芷），具纵皱纹和支根痕，有少数皮孔样的横向突起，习称“疙瘩丁”，有的排列成四纵列。

颜色：表面灰棕色至黄棕色。

质地：质坚硬而重。

断面：白色可灰白色，粉性，可见近方形或近圆形的棕色环（形成层），皮部散有少数油点。

气味：气香，味香，微苦。

质量标志：以根条粗壮、体重、粉性足、香气浓郁者为佳。

【用法用量】煎服，3~9g。外用适量。生白芷功效如上述；炒白芷功偏燥湿止带；白芷炭有止血之功，但现少用。

细 辛 Xixin

【来源】为马兜铃科植物北细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq. Var. *seoulense* Nakai 或华细辛 *Asarum sieboldii* Miq. 的干燥全草。

【别名】辽细辛、北细辛、华细辛、小辛、细草、金盆草。

【产地与采制】前两种习称“辽细辛”，主产于东北地区；华细辛主产于陕西、河南、山东、浙江等省。夏季果熟期或初秋采挖，除去泥沙，阴干。切段，生用或炙用。

【性能】辛，温。有小毒。归肺、肾、心经。

【功效】解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮。（解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，温肺止咳。）

【性状】