

千金方

廿三

備急千金要方卷第二十三 痔漏

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

九漏第一 瘰癧 附

腸癰第二 妬乳 附 乳

五痔第三

疥癬第四 瘰癧 赤 白 附 疣 目

惡疾第五

九漏第一 論一首 灸法十六首 方八十三首

論曰夫九漏之為病皆寒熱瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也堤留於脉而不去者也鼠瘻之本皆根在於藏其末上出於頸腋之下其浮於脉中而未著於肌肉而外為膿血者易去去之柰何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往來以去之其小如

麥者一刺知三刺已決其死生奈何曰反其目視其中有赤  
脉從上下貫童子見一脉一歲死見一脉半一歲半死見二  
脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉三歲死赤脉不下貫  
瞳子可治

凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸熱  
食凡漏有似石癰累累然作癰子有核在兩頸及腋下不痛  
不熱治者皆練石散傳其外內服五香連翹湯下之已潰者  
治如癰法諸漏結核未破者火針針使著核結中無不差者  
何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四曰蜂漏五曰  
蚰蟬漏六曰蟻螯漏七曰浮沮漏八曰瘰癧漏九曰轉脉漏  
治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之上連延耳根腫  
大此得之憂恚氣上不得下其根在肝一作肺空青主之商陸  
爲之佐散方

空青

蝟腦各二分

蝟肝一具之干

芎藭半分

獨活

乳婦蓐草

黃芩

鼈甲

斑猫

乾薑

商陸

地膽

當歸

茴香

礬石各一分

蜀椒三十粒

右十六味治下篩以酒服方寸匕日三十五日服之

治鼠漏始發於頸無頭尾如鼯鼠使人寒熱脫肉此得之食於鼠毒不去其根在胃狸骨主之知母為之佐散方

狸骨

鮫鯉甲

知母

山龜殼

甘草

桂心

雄黃

乾薑各等分

右八味治下篩以飲服方寸匕日三仍以蜜和內瘡中無不差先灸作瘡後以藥傅之已作瘡不用灸

治螻蛄漏始發於頸項狀如腫此得之食瓜果實毒不去其根在大腸荏子主之桔梗為之佐丸方

荏子 龍骨各半 附子兩 蜀椒百粒 桂心

乾薑 桔梗 礬石 獨活 芎藭各分

右十味末之以棗二十枚合搗醋漿和丸如大豆温漿下

五丸至十九

治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以潰此得之飲流水  
水有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為之佐散方

雄黃 黃芩各一 蜂房具 鼈甲 茴香

吳茱萸 乾薑各半 蜀椒二百粒

右八味治下篩傳瘡口上日一十日止

治蚘蟬漏始發於頸初得如傷寒此得之因食中有蚘蟬毒  
不去其根在腎礬石主之防風為之佐散方

礬石 防風 桃白皮 知母 雌黃

乾地黃 獨活 青黛 斑猫 白芷

松脂一作拍脂

芍藥

海藻

當歸各一分

白朮

蝟皮各四分

蜀椒百粒

右十七味治下篩飲服一錢匕日三服

治瘰癧漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮為之佐散方

礬石

白朮

空青

當歸各二分

細辛兩

蝟皮

斑猫

枸杞

地膽各一分

乾烏腦大豆許

右十味治下篩服方寸匕日三以酢漿服之病在上側輪卧在下高枕卧使藥流下

治浮沮漏始發於頸如兩指使人寒熱欲卧此得之因思慮憂滿其根在膽地膽主之甘草為之佐散方

地膽

雄黃

乾薑

石決明

續斷

菴藺根

龍膽

細辛

大黃

甘草

右十味治下篩傳瘡日四五度

古今錄驗無雄黃有硫黃

治瘰癧漏始發於頸有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於頸所致其根在腎雌黃主之芍藥為之佐丸方

雌黃

茯苓

芍藥

續斷

乾地黃

空青

礬石

乾薑

桔梗

蜀椒

恒山

虎腎

狸肉

烏腦

斑猫

礬石

分一

附子

兩一

右十七味末之蜜丸以酒服十九如大豆日二

治轉脉漏始發於頸濯濯脉轉苦驚惕身振寒熱此得之因驚卧失枕其根在小腸

集驗作心

斑猫主之白芷為之佐丸方

斑猫

白芷

綠青

大黃

各二分

人參

當歸

桂心 各三兩

麥門冬

白木 各一兩

升麻

鍾乳

甘草

防風

地膽

續斷

麝香

礞石 各一

右十七味末之蜜丸酒服十九如大豆日三服勿食菜慎

房室百日 外臺無大黃桂心  
麥門冬白木鍾乳

治九漏方

空青

商陸

知母

狸骨

桔梗

防風

荏子

礞石

黃芩

白芷

芍藥

甘草

雌黃

白朮

礞石

地膽

斑猫

雄黃 各等分

右十八味末之蜜丸以酢服如大豆三九三十日知四十

日愈六十日平復一百日慎房室 一方為散醋服二刀  
圭日三老小半之

又方

蝟皮枚半

蜀椒

附子

當歸

蜂房

地榆

桂心

通草

乾漆

薏苡人

牡丹

蒺藜子

漏蘆一作藎蘆

龍膽一作龍骨

土瓜各二

斑猫分四

苦參

蛇牀子

大黃

雄黃

藺茹

細辛

蛇蛻皮各二

鶴骨分六

鮫鯉甲

擣雞各四

蜥蜴

蜈蚣各一

右二十八味治下篩酒服五分匕以知為度日二服

又方

斑猫枚十

蝟皮

真朱

雄黃各一

右四味治下篩酒服半錢匕日三

又方

末成鍊松脂填瘡孔令滿日三四度七日差大有神驗

又方

斑猫二十七枚

雄黃

桂心

犀角各一兩

右四味治下篩酒服一錢匕病從小便出日再

又方

馬齒莧乾陰

臘月燭燼各等分

右二味為末臘月猪脂和先以暖泔清洗瘡拭乾傅之日三

又方

乾牛屎

乾人屎

右二味擣先幕綿瘡上綿上著屎蟲聞屎香出若癢即舉綿去之更別取屎綿著如前候蟲出盡乃止

又方

苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大置湯中煮十數沸取一竹筒長一尺內一頭瓠孔中一頭注瘡孔

上冷則易之徧止

治一切漏方

斑猫四十枚

豉四十枚

元青二十枚

地膽十枚

蜈蚣一寸

犀角棗核

牛黃棗核

生大豆黃十枚

右八味末之蜜丸飲服如梧子二丸須臾多作酸漿粥冷飲之病從小便出尿盆中看之如有蟲形狀又似膠汁此病出也隔一日一服飲粥如常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸差特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作食崔氏云治九漏初服藥少夜食明旦服二九至七日甚虛悶可煮食蔓菁菜羹自餘脂膩醋口味果子之類並不得食人強隔日一服人弱將息不能將息便不須服十日

又方

煮鹽花以麪擁病上內鹽花麪匡中厚二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無益熱則破

肉一日一度候瘰癧根株勢消則止若已作瘡者搗  
糝穀為末粉之

又方

槲北陰白皮三十斤剉之以水一石煮取一斗去滓  
煎如糖又取都厠上雌雄鼠屎各十四枚燒令汁盡  
末內煎中溫酒一升投煎中合攪之羸人五合服  
之當有蟲出

治漏作瘡孔方

末露蜂房臘月猪脂和傅孔上

治漏發心骨以下者方

武都雄黃

松脂各三兩

右二味和為塊刀子刮為散飲服一方寸匕日二不差更合

治漏方

金部三十三  
六  
餘  
鍛落鐵屑

狗頰車連齒骨炙

虎糞

鹿皮燒合毛

右四味等分治下篩以猪膏和內瘡中須更易之日五六度  
治諸漏方

霜下瓠花暴乾末傅之

又方 擣土瓜根薄之燥則易不限時節

又方 死蛇去皮肉取骨末之合和封瘡上大痛以杏人膏  
摩之止

又方 死蛇和臘月猪脂合燒作灰末之內孔中

又方 燒死蜚蝗末醋和塗又死蛇灰醋和傅

又方 故布裏鹽如彈丸燒令赤末酒服

又方 服白馬屎汁一升

又方 正月雄狐屎陰乾杵末水和服

又方 鹽麩和燒灰傳之

又方 水研杏仁服之

又方 猪脂一升酒五合煎沸頓服之

治一切冷瘰方

燒人吐出蛔蟲為灰先以甘草湯洗瘡後著灰無不差者慎口味

治鼠漏瘡差復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂咬咀生地黃內脂中令脂與地黃足相淹和煎六七沸桑灰汁洗瘡去惡汁以地黃膏傳瘡上日一易

治鼠漏方

得蛇虺所吞鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗自難遇耳并傳瘡中

又方

死鼠一枚中  
形者

亂髮如雞子大一枚

右二味以臘月猪脂取令淹鼠髮煎之令鼠髮消盡膏成  
分作二分一分稍稍塗瘡壹分稍稍以酒服之則差矣鼠  
子當從瘡中出良秘方

治鼠瘦腫核痛未成膿方

以柏葉傳著腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方

赤小豆 白斂 黃耆 牡蠣 各等分

右四味治下篩酒服方寸匕日三

治螻蛄瘦方

榆葉灰先以泔清煮榆葉取汁洗拭乾內灰瘡中

治蜂瘦初生時狀如桃而癢搔之則引大如雞子如覆手者方

熬鹽熨之三宿四日不差至百日成瘻其狀大如四五寸石廣三寸中生蜂作孔乃有數百以石硫黃隨多少燃燭燒令汁出著瘡孔中須臾間見蜂數十惟蜂盡差

治蜂瘻方

鷓頭灰傅之

又方 人屎蚰灰臘月猪膏和傅之

又方 蜂窠灰臘月猪膏和傅孔中

治蟻漏孔容針亦有三四孔者

蝟皮肝心灰末酒服一錢匕

又方

死蛇腹中鼠臘月猪脂煎使焦去滓傅之

又方

取大鯊鮓燒耕埭土令赤以苦酒浸埭土時合埭土故熱以鯊鮓着埭土上展轉令熱以傅瘡上

又方 鮫鯉甲二七枚燒末猪膏和傅瘡上

又方 半夏一枚搗末以鴨脂和傅瘡上

瘰癧瘻橫闊作頭狀若杏人形亦作瘰癧方

用雄雞屎灰臘月猪脂和封之

治蜚蠊瘻方

牛屎灰和臘月猪脂傅之

又方 蜚蠊丸末傅即蜚蠊所食屎也

又方 乾牛屎末傅瘻即撥却更厚封差乃止

又方 熱牛屎塗之數數易應有蜚蠊出

治蚯蚓瘻方

蚯蚓屎 雞屎