

醫西學崇正

卷七

醫學崇正卷七

蜀北射洪許宗正星東著

女科第三十七

婦病異男子二七月信始

經云婦人者衆陰所集言婦人以陰爲體也其所以

異於男子者以年至二七月信時下爲異之始

虧盈象太陰失信病蜂起

象月爲太陰一月一虧盈女

然經水之來必有信期故稱月信苟失其期則藏氣不調而諸疾蜂起

漸早護營湯漸遲薑桂與

經水不滿一月而來爲漸

或寒熱相激來時一早宜平沸湯若有熱宜護營湯

五十日經水乃至者爲漸遲宜薑桂溫營散若血枯漸遲者宜復脈湯

錯雜寒熱分寒桂熱柴胡

經水之來乍早乍遲無有定期者為錯雜至其症多

由寒熱相參寒盛者宜桂枝湯倍桂加薑附吳黃熱多者宜小柴胡湯加白芍丹地槐花之類

六淫外感加治法傷寒擬

經水適來忽為六淫邪氣相加水適來忽為六淫邪氣

七情鬱結多腹痛經停止

七情鬱結不通則腹滿痛經水停止不至

寒滯消痰功熱閉桃承取

鬱結經閉屬寒者宜消痰散屬熱者宜桃承氣湯

餘詳腹痛篇攻補法惟備

其餘詳參腹痛篇則攻補之法無不周備

經調信有期福壽多男子

人能經調月信有期其月經素不愆期不因病而

月信忽不行惡食嘔吐頻

月經素不愆期不因病而忽止不行惟惡食而嘔吐

少陰脉動甚其證為妊娠

六脉無邪惟手足少陰脉動甚者為妊娠

初起桂枝湯香砂小柴良

妊娠之初少陰腎氣結而不降則阻衝氣上逆不食

嘔吐宜桂枝湯以和營衛香砂六君子湯降逆安中小柴胡湯清熱止嘔

吳萸蘇竹輩溫膽力方剛吳茱萸湯溫胃蘇茯苓飲散邪竹葉石膏湯清熱溫膽

湯順氣安嘔

舉重跌踣傷敗毒杜仲湯舉重用或跌仆偶然犯胎挾表邪者宜人參敗毒

散能食者加當歸白芍無表邪者宜杜仲湯

餘證參嘔吐金匱備且詳胎前之症多嘔吐宜參嘔吐篇餘惟金匱之法詳備

氣弱恐墮胎陰虛復脉來胎在腹中如地在全憑夫氣舉吸大氣力弱其

胎必殤如陰虛而氣弱者宜復脉湯輩

陽虛參茸妙鱸鯉附子譜陽虛者宜參茸化育丸或鱸鯉湯附子湯

重病須大毒邪輕必犯胎內經云有病之時用毒藥其

胎不能隕也病勢既衰則以無毒善其后邪輕犯毒其胎必傷

十月畏難產丹參無憂散

者須預服丹參膏或保生

無憂散

催生歸芎湯鳳仙續斷選

者宜加味歸芎湯或用鳳

仙子一錢為末水酒聽下或用續斷湯

血傷醇酒膏當歸補血檢

水涸而舟不行也宜醇酒

膏或當歸補血湯

牛膝下胞衣死胎蟬爪轉

外以熱灰熨腹含髮探吐

開水蒸下身俱效若死胎不下者宜蟬爪湯

產後血痛昏生化消瘀行

宜產後血停腹痛昏迷者

痙冒大便秘艱三者亡血因

金匱云產后有三大症一日痙二日鬱冒三日大

便難其實皆由亡血傷津所致

痙痙竹承氣鬱冒陽旦尋

痙者急搐搦甚則角弓反張此由血虛生風所致

宜竹葉湯或大承氣湯鬱冒者頭眩如被衣物覆冒此血虛而陰邪乘陽所致宜陽旦湯

便難麻仁丸餘許金匱經

大便難者此血虛而津枯也宜麻仁丸餘許金匱

雜病干端證六淫七情成

婦人雜病干端萬狀皆始於六淫七情

初起偶失治後漸不可名

六淫七情初傷悠悠失治久則變症蜂起不可名狀

帶下三十六世傳赤白沃

雜病古八分三六疾其症有十二癥九痛七害五

傷三病然皆統名之曰帶下以帶脉受傷不能約束諸經所致世俗相傳下赤沃者為赤帶屬

熱下白沃者為白帶屬寒然赤亦

治法淋濁叅白馬大黃服

下赤白沃者宜叅淋濁證治或白馬蹄丸大黃丸

血下忽如泉馬通馬蹄丸

或月水忽來如泉名曰血崩或止或來名曰漏下俱宜

馬通湯或馬蹄丸韭根飲下

中寒加桂附熱盛進芩連

中氣虛寒者宜馬通馬蹄丸方加肉桂熟附子熱多

者加黃芩黃連

急痛消瘀散疔痛建中填

血崩腹痛急者有瘀血也宜消瘀散疔痛緩痛也屬

虛宜小建中湯

藏燥桑參膏虛寒益精兼

藏燥者常欲傷悲太息宜桑參膏虛寒少氣者宜桂

附益精丸

離光西藥酒還春并舒肝

如離光丸西洋藥酒還春丸舒肝飲等皆可擇用

理中調脾胃食增萬病痊

或用理中湯調理脾胃令食量加增而萬病自痊

護營湯

擬用治血虛而熱月經早至

白芍

烏賊骨

各一兩

當歸

生地

香附子

阿膠

各五錢

茜草

三錢

右七味水煎服熱盛加梔子丹皮子宮痛加槐實

歌

日護營湯內芍膠香烏賊當歸生地黃熱盛梔丹槐

實繼月經先至速宜嘗

平沸湯

見虛勞

薑桂溫營散

擬用治氣少血寒腹痛脹滿經水後至或停閉者

乾薑

熟附子

各一兩

肉桂

六錢

炙甘草

四錢

右四味為末開水服每三錢腹痛者加吳萸莪朮

各六錢

歌曰薑桂溫營附子薑炙甘肉桂枰之嘗吳萸莢朮腹

疼進氣少血寒經閉當

復脉湯

見虛勞

桂枝湯

小柴胡湯

并見傷寒

消瘀散

桃仁承氣湯

并見心腹痛

香砂六君子湯

見喘促

吳茱萸湯

見傷寒

蘇茯苓飲

擬用治妊娠惡阻嘔吐倦臥不食

全紫蘇

茯苓

生薑

柴胡

各五錢

半夏

桂枝

佛手柑

砂仁

澤瀉

各三錢

右九味水煎服頭痛加葱白腹痛加白芍艾葉熱盛者去桂枝半夏加葛根黃芩竹茹跌踣舉重胎

動腹痛者去柴胡半夏加當歸白芍艾葉阿膠

歌曰蘇荻飲方夏桂柴紫砂薑佛澤苓偕水煎和胃能

安嘔餘藥隨宜出入該

竹葉石膏湯

治妊娠渴嘔

溫膽湯

見癰

人參敗毒散

見傷寒

杜仲湯

擬用治妊娠舉重跌仆胎動腰痛或下血不止

杜仲

阿膠

各五錢

當歸

白芍

生地

各四錢

川芎

羌活

莪朮

艾葉

各三錢

甘草

二錢

右十味水酒和煎服宜溫者加桂枝吳茱萸炮薑各

三錢

歌

曰杜仲湯方歸芍膠羌莪杜仲艾芎調地黃甘草水

煎用跌踣傷胎藉此療

參茸化育丸

擬用治婦人氣血虛少半產漏下或羸瘦不娠并治男子虛損

人參

鹿茸

天麻

白朮

甘枸杞

杭巴戟

黃耆

薯蕷

各一兩

山萸肉

五味子

菟絲子

當歸

茯苓

棗仁

各八錢

遠志

杜仲

熟附子

砂仁

各六錢

肉桂

炙甘草

各五錢

右二十味為末蜜丸如梧子空心服五錢日二無

鹿茸以鹿膠代之陰虛者倍枸杞加熟地二兩阿

膠一兩

歌

參茸化育杜巴萸桂附參苓歸遠耆棗蕷麻甘絲

鹿味砂仁杞朮蜜丸施

鱸鯉湯

見虛勞

附子湯

見傷寒

丹參膏

千金臨月常服滑胎易產

丹參

半觔

川芎

當歸

各二兩

蜀椒

五合

右四味酒浸一宿以煎成猪膏一觔熬藥令黑去

渣每服如棗大酒化下有熱者以麻仁易蜀椒按

不能酒服者以蜜一觔對服

歌
日丹參膏用芎歸參椒酒猪膏微火烹熟取麻仁椒

可去蜜加溫服效神靈

保生無憂散

妊婦臨月先服數劑可免產難橫生之患并治胎前小便不通

當歸

白芍

川芎

兔絲

黃耆

各三錢

川貝母

卷七
无活

枳椇

荆芥

厚樸

艾葉

甘草

各二錢

石十二味加生薑三錢水煎服

歌保生無憂羌芍薑樸黃耆荆只椇艾葉當歸甘
貝絲妊娠將產預爲服

千金云妊娠一月始怀二月始膏三月始胞四月形
體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月藏府
具九月穀氣入胃十月諸神備日滿則產矣產難者
母面赤舌青子死母活母唇口青兩口角沫出者母
子俱死母面青舌赤口中沫出者母死子活

加味歸芎湯

治漿水既行而胎不下者

當歸

一兩

川芎

血龜板

炮

亂頭髮

煨各六錢

右四味水煎服約人行五里許卽生設死胎亦下

陳修園曰此方治陰虛交骨不開若陽虛交骨不

開者宜用當歸補血湯加肉桂三錢熟附子六錢

當歸補血湯

治血虛身熱

黃耆

二兩

當歸

七錢

右二味水煎服

催生方用鳳仙子一錢爲末水酒任下立產連克服

足下胎衣

歌曰加味歸芎龜板當川芎亂髮陰虛良當歸補血耆

歸聚仙子催生妙義長

續斷湯

擬用治數日難產并下死胎及胞衣

續斷

一兩紅牛膝根五錢

右二味水酒和煎頓服立下

又方海馬二錢爲末黃酒服良

醇酒膏

千金治產難或胎衣不下或子死腹中或瘀血搶心面如死色氣將絕者

醇酒

二升

蜂蜜

煎成猪膏

各一升

右三味合煎至二升分再服不能者隨服煩熱者

以地黃汁代醇酒

歌日續斷紅牛水酒煎一方海馬酒和餐千金醇酒蜂

脂共煩執地黄代酒

牛膝湯

千金治胞衣不下令胞爛方

牛膝根

瞿麥

各五錢

蹄

通草

各七錢

葵子

兩

滑石

一作桂枝

右六味水煎服并治橫產

死胎凡橫生手足先出

者以鍼刺兒手足入一分

死痛驚轉自順也

蟬爪湯

千金治胎動及產難

以子死腹中或雙胎

蟬爪

一死一生服之令死

甘草

二尺

阿膠

一兩

右三味作東向竈取東流水用葦薪煮二味去渣

內膠銷盡再服一方有桂枝

歌牛膝湯方歸滑通瞿葵牛膝水煎供一方蠃爪阿

甘共東甌東流葦煮充

下胎衣方取芡實葉一張破作三塊水煎頓服

又方用蓮房一個破作數塊水煎服

生化湯

見心腹

竹葉湯

治產後中風發熱面赤頭痛而喘

竹葉

葛根

各六錢

附子

防風

桂枝

桔梗

人參

甘草

各三錢

生薑

五錢

大棗

五枚

石十味水煎服令微汗嘔加半夏按熱盛者去附

子加石膏一兩

歌見金匱

陽旦湯