

本經序疏要

衣舫題籤

本經序疏要卷之三目錄

消渴二十二

黃疸二十三

上氣欬嗽二十四

嘔吐二十五

痰飲二十六

宿食二十七

腹脹滿二十八

心腹冷痛二十九

腸鳴三十

本經序疏要卷之三

武進鄒澍學

消渴

白石英微温○主消渴陰痿不足

石膏微寒大寒○止消渴煩逆口乾舌焦不能息

茯神平○風眩風虛五勞口乾

麥蘗冬平大寒○虛勞客熱口乾燥渴

黃連寒微寒○止消渴

知母寒主消渴熱中除邪氣

栝樓根寒主消渴身熱脣乾口燥短氣

茅根寒○止渴

枸杞根〔大寒〕○熱中消渴

小麥微寒○止躁渴咽乾利小便

箘竹葉大寒○根作湯益氣止渴補虛下氣

土瓜根寒○主消渴內痹

葛根〔平〕○主消渴身大熱起陰氣

李根大寒○主消渴止心煩逆奔氣

蘆根寒○主消渴客熱止小便利

菰根大寒○主腸胃痼熱消渴止小便利

冬瓜微寒○止渴

馬乳冷○止渴

牛乳微寒○補虛羸止渴

羊乳温○潤心肺止消渴

藥性論

桑根白皮寒○熱渴水腫

對藥茯苓平主口乾君

理石寒主口乾消熱毒君○解煩毒止消渴

兔絲子平主口乾消渴○口苦燥渴

牛膽大寒主渴利中焦熱君○口焦燥

苾汁寒止渴使○漬苧汁療渴

古屋瓦苔寒主消渴

兔骨平治熱中消渴臣

豬苓平主渴利使

或謂石藥肥甘酒鹽四者皆致消渴隋唐已來巢氏

孫氏王氏言之極詳然咸謂其性熱助火已耳其能治致水所難制之火則未及也况釋名云消渴係腎氣不周於胸中腎氣不周於胸中豈特火之所爲耶予謂四十九難曰腎主五液以布五藏在肝爲泣在心爲汗在脾爲涎在肺爲涕自在爲唾則胸中津潤所以漑喉舌而滋呼吸者獨非腎之所布乎寶命全形論曰鹽之味鹹者以其氣令器津洩夫鹽得水可化得火復成此其令消渴在乎合水則行而不留遇火則結而不散矣營衛生會篇曰酒者熟穀之液其氣悍以清故能後穀而入先穀而液出此其令消渴在乎氣係於上而不去質傾於下而不停矣何況石

藥者入水不濡入火則赤肥甘者遇水便浮著火能
燃此其蟠踞於人身但應火而不應水且使藏府不
泥不沾又何論夫周是其涸竭之患豈但胸中蓋將
徧有焚如之害固非特火之所爲也諸家之論雖詳
大率巢氏之消渴渴利內消三者最爲明爽曰消渴
者渴而小便不多也渴利者隨飲卽溲也內消者不
渴而小便多也今以是篇覈之渴飲而小便不多非
有所洩卽有所停寒而燥者以治洩於下寒而達者
以治洩於外散而清者以治停於上寬而利者以治
停於下者也隨飲卽溲者非四旁不沾卽直道無節
故凡通內痹行脈絡皆使其沾厚土氣助薰蒸皆

本經月要 卷三
三
以使其節至不渴而小便過利自有小便利篇可按
然篇中往往列止小便利之物不在小便利篇者豈
不可彼此參伍求所以分所以合耶若夫不渴不利
善食易消古人謂之食亦與消渴無涉也

素問氣厥論心移熱於肺肺消心移熱於肺鬲消熱
能爲消是固然矣寒亦可爲消乎此可證之金匱要
畧者也假使寒不能消何得治之以八味腎氣丸耶
曰寸口脈浮而遲浮卽爲虛遲卽爲勞虛則衛氣不
足勞則營氣竭由是觀之非寒則脈何以遲夫心本
不任受寒心所謂寒蓋在所主之血脈中其移肺亦
由榮泛及衛耳且非外中之寒亦非卒受之寒乃陽

氣之不營於外而直升直降於內者也營衛既失其
樞資稟遂不合度故內而陽氣熾盛常藉水以自救
外而營衛無所汲引則其水直溜而下且曳一身津
液并而泄焉故曰肺消者飲一溲二死不治此卽前
所謂不沾者其於病源實兼渴利內消者也曰跌陽
脈浮而數浮卽爲氣數則消穀而大堅氣盛則溲數
溲數則堅由是觀之數熱徵也夫鬲以隔蔽清濁而
非匿寒藏熱之所心肺以熱相移清道陽氣熾盛遂
不變化取汁爲赤以分布灑陳而一歸於三焦膀胱
焉故曰堅數相搏卽爲消渴此卽前所謂不留其於
病源則所謂渴利者也統而計之陽宗於心陰根於

腎心所以移寒移熱皆由腎陰不上交於陽而肺遂

失其節宣衰益以底於平是則責之所攸歸耳八味

腎氣丸攝土中水氣以濬陰之源地黃拔土氣最力
薯蕷入土中最深

而喜攀磚附石山茱萸於季春結實
至初冬乃成亦吸土氣以濟水者動水中火氣以

振陽之本附子桂枝而使天一之水由下以及上澤由上

以歸下茯苓浮游之火鬱結之血藉此遂周流而不滯

焉牡丹得非能降火升水使兩相濟而稱物平施者耶

有是以通本篇之不逮即由本篇以通仲景之所及

如治消渴之用五苓散豬苓湯白虎加人參湯白頭

翁湯其中石膏知母黃連豬苓茯苓固皆列於是矣

肺消鬲消獨不可由彼而更求於此篇哉

然則食亦亦可以是篇之義通之乎此則不可郊特
牲曰食養陰飲養陽藏陰也府陽也氣厥篇論消渴
之源在五藏食亦之源在六府五藏之不咸則無以
制通而病反在陽故本篇之藥多主氣而輕清六府
之不調則無以制藏而病反在陰故聖濟總錄食亦
諸方多主味而沉著惟其流異是以不可通非特此
也凡因消渴而致之水氣治法遂絕不同惟其源同
是以可通凡不與消渴類之強中治法乃殊不異卽
此可明其指矣

黃疸

茵陳蒿平微寒○風溼寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃

小便不利

梔子寒大寒○通小便解五種黃病

藥性論

紫草寒○主心腹邪氣五疸

白鮮皮寒○主黃疸

生鼠微溫

大黃寒大寒

豬屎寒○主寒熱黃疸溼痹

瓜蒂寒○療黃疸

栝樓寒○除腸胃中痼熱八疸身面黃

秦艽平○差五種黃病

唐本黃芩大寒○主諸熱黃疸

類證

牡鼠微寒

小茈胡湯小半夏湯小建中湯瓜蒂散五苓散桂枝
加黃芪湯豬膏髮煎皆治他證爲本黃疸爲標他證
愈黃自不能不愈也大黃消石湯梔子大黃湯消石
礬石散梔子檉皮湯麻黃連軹赤小豆湯則黃疸爲
本矣而標病猶盛不能竟捨標從本故宜有輔佐以
擊動其標其本乃能釋也惟茵陳蒿湯乃爲黃疸正
劑知茵陳蒿湯爲黃疸正劑則身黃如橘子色小便
不利腹微滿爲黃疸主候發熱不惡寒但頭汗出餘
無汗齊頸而還渴飲水漿小便不利爲黃疸正因矣
發熱不惡寒反惡熱是爲陽明病而承氣證爲陽明

六經辨別要

卷三

六

病之正出茵陳蒿證則陽明病之對出以一有汗一
無汗一小便過利一小便不利汗出多小便利所以
成乎燥汗不出小便不利則本燥末溼所以祇對化
耳不然凡衄遲食難用飽飽則微煩頭眩小便難縱
下之腹滿如故必其中先硬後溇非特不能全成燥
證且駸駸乎將全成溼證者何以亦用茵陳蒿湯耶
此全從傷寒外邪立論者若更參以金匱雜證則不
必有外邪但係本燥末溼者均得成黃故夫酒者氣
燥而質溼受其傷則心中懊懣而熱不能食時欲吐
遂爲酒疸房勞甚者陰已泄陽不得越遂與已化未
成之陰精糾結怫鬱於中欲出不得雖微汗出小便

自利而不免薄暮手足中熱膀胱急而爲女勞疸更益之黃汗所謂五疸具矣篇中義旨亦明明推茵陳蒿湯爲督率覈以傷寒金匱所隸治黃諸方無非由此而因候加味合成方如因懊懣則合入梔子豉小承氣而爲梔子大黃湯因小便不利則合入五苓而爲茵陳五苓散因表利裏實則合入調胃承氣而爲大黃消石湯是也獨調胃承氣湯用水消此用火消更覈消石礬石散亦用火消似其中必有故者蓋火消是曳陰向陽乃攜溼以就燥而散水消是化陰濟陽乃剖燥以凝溼而行於此卽可以悟陽明病之正出對出矣

至於篇中白蘚秦苧栝樓根黃芩仲景雖未嘗用治黃而葛氏肘後孫氏千金王氏外臺諸方多用之揣其意旨亦非貿貿然徒用之而已也蓋於此有以窺黃證之微焉夫黃根於溼熱客於脾胃固不待言矣然非必上罩下承面面周而密圍也定有一端滲泄處焉惟滲泄不敵其搏聚是以蒸鬱而成耳不然則所謂陽明中風岷苳浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後臃刺之小差外不解之候何以見不尿腹滿加噦者遂爲不治耶一端滲泄者何如栝樓根之主小便利是其黃必仍小便