

全国医药卫生经验交流展览会

北京市中医药展品说明汇集

北京市中医药技术革新委员会编

-63

S

全國醫藥衛生經驗交流展覽會

北京市中醫藥展品說明彙輯

北京市中醫藥技術革新委員會編

目 錄

1. 紫草根治疗绒毛膜上皮癌初步观察结果
2. 辨証论治分析器
3. 骨度测量尺
4. 中医治疗急性阑尾炎
5. 中药治疗蚊虫疟初步观察
6. 中药治疗美尼尔氏病
7. 前列腺肥大症
8. 越婢汤加減攻破慢性肾炎水肿的治疗
9. 白斑(慢性口腔炎)中医特效疗法
10. 中医治疗阵发性血色素尿一例
11. 中医治疗377例过敏性疾病收到显著效果
12. 中医治疗消渴病(糖尿病)
13. 用中药改良剂型初步突破神经衰弱
14. 中药治疗再生障碍性贫血经验介绍
15. 中药治疗特发性再生障碍性贫血一例报告
16. 中医治疗紫斑病之初步报告
17. 中医治疗流行性乙型脑炎的疗效观察
18. 彩色幻灯片
19. 中医治疗不育症用生药200例临床观察
20. 中医治疗宫颈糜烂638例临床观察
21. 中药泰山磐石饮治疗习惯性流产11例
22. 千金保孕丸泰山磐石饮治疗习惯性流产16例
23. 中医治疗崩漏症76例临床观察
24. 针灸治疗神经衰弱疗效观察
25. 带状蛇疹的针灸疗法
26. 中药治疗疣(神经性皮炎)的发明创造
27. 制成油溶麻醉药痔瘡病人无痛苦
28. 油剂痔瘡注射液治疗内痔創造成功

29. 創造明礞注射法治療重度真腸脫垂三例成功
30. 中醫柳枝接骨研究
31. 中藥(接骨散)對實驗性骨折癒合的研究
32. 中醫治療髌骨骨折的總結
33. 中醫捏積法
34. 用中醫治療脫疽(血栓閉塞性脈管炎)保存了患者的手腳
35. 減輕病人痛苦消除關節障礙中醫不用石膏治療四肢骨折
36. 針灸治療陽萎病三例
37. 針刺腎俞心俞二穴位治療陽萎患者一例
38. 梅花針淺刺治療單純性青盲眼
39. 針刺治療頑盲三例癱瘓
40. 用針灸方法治療肛門瘻患術后排尿困難的臨床觀察
41. 針灸治療風濕性關節炎(痹症)療效觀察
42. 發揚祖國遺產治療放射反應
43. 應用針灸療法治療“汗斑疹”
44. 中進一型經絡測定器
45. 孔穴部位與肌肉關係模型
46. 針灸卡片
47. 針灸學幻燈片
48. 針灸療法減輕了肺結核症狀
49. 電灸療法簡單介紹
50. 針灸治療小兒幽門痙攣
51. 針灸治療小兒麻痺症及其後遺症
52. 針灸治療小兒單純性消化不良
53. 中醫用針灸解決了高血壓病
54. 中醫治療八十例肝硬化
55. 氣功療法
56. 針灸治療腰椎麻醉後頭痛
57. 學習祖國醫學 針灸下奶
58. 中醫治療呃逆(橫膈肌痙攣)四例臨床療效報告
59. 七例橫膈膜痙攣的療效統計
60. 中醫治療711例痛經療效觀察
61. 急性蘭尾炎針刺療法50例初步總結

紫草根治疗绒毛膜上皮癌

初步观察结果

一、绒毛膜上皮癌是一种恶性度很强的，恶性肿瘤之一，死亡率极高，一直被认为是不治之症，今用紫草根先液治疗了七例，有四例见到明显效果（两例为绒毛膜上皮癌，两例为恶性葡萄胎），在临床症状上头痛，恶心，食欲不振等均消失，雌激素测定度的下降，及肺部转移瘤阴影的缩小和消失，都说明了紫草根所起的作用，并作动物试验，发现把紫草根注射于雄蟾蜍之后，10-15分钟，再注射入病人之小便，阳性率会变的很低，说明紫草根含有一种破坏绒毛性腺激素的成分，这里说明临床上所取得之效果不是偶然的，是值得进一步研究。

二、动物实验结果（对雄蟾蜍排精反应的观察）

将不同浓度的紫草根叶液（5.000）注射于雄蟾蜍皮下，15-30分钟后，再注入病人的尿，二小时后观察排精反应，为六小时以后不见排精者为阴性。

1. 冰浸劑的作用 (每瓶士陽性稀釋度為 0.3125 cc)

尿量	稀和冰度	蟻蜂平	冰 浸 劑				陽性率	
			1+1時	12+1時	24+1時	48+1時		
0.3125	100%	A	+	+	+	-	5/20	11/40
		B	+	-	+	-		
		C	-	-	-	-		
		D	-	-	-	-		
0.3125	200%	A	+	+	+	+	6/20	27.5/80
		B	+	+	-	-		
		C	-	-	-	-		
		D	-	-	-	-		
0.625	100%	A	+	+	+	-	13/20	21/40
		B	+	+	+	+		
		C	+	+	+	+		
		D	+	+	-	-		
0.625	200%	A	+	+	+	+	8/20	15.25/80
		B	-	+	+	-		
		C	-	-	+	-		
		D	-	-	+	-		

對照	試驗前		試驗后		陽性率
0.3125	+	+	+	+	100%
0.625	+	+	+	±	75%

2 益利的作用 (尿量 + 陽性稱樣度 0.3/2500)

尿量	尿量增加	尿量減少	益 利				陽 性 率		
			10'	30'	1°	2°			
0.3125	10%	A	-	-	-	-	4/16	6/32	17/60
		B	-	-	-	+			
		C	-	-	+	+			
		D	-	-	+	+			
0.625	20%	A	-	+	-	-	2/16	18/72	265/90
		B	-	+	-	-			
		C	-	+	-	-			
		D	-	+	-	-			
0.625	10%	A	-	+	+	+	5/16	11/32	265/90
		B	-	+	+	+			
		C	-	+	+	+			
		D	-	+	+	+			
0.625	20%	A	+	+	+	+	6/16	34/40	265/90
		B	+	+	+	+			
		C	+	+	+	+			
		D	+	+	+	+			

對 照	0.3125 00	++++	100%	87.7%
	0.625 00	+++ -	75%	

討論：由上兩實驗說明：(一) 實驗組陽性率比對照組顯著減少，(二) 尿量增加一倍，陽性率也增加一倍，(三) 尿量增加陰性率也有增加趨勢。因此也說明藥草根含有一種破壞或抑制腎上腺性腺激素作用的成份在內也進一步說明臨床上的效果不是偶然的。


結論：由於例子不多觀察時間也不夠，尚不能下最後的結論，但值得作更多的研究。

三. 病例示范


第一例, 顾XX 23岁, 1958年3月17日因子宫绒毛膜上皮癌行全部子宫切除, 并行盆腔深部放射治疗, 继后2+月肺拍片发现有转移瘤阴影, 尿癌细胞试验转石阳性。乃行 Nitromin 静脉注射和口服紫草根治疗, 肺即转石阴性, 肺转移阴影上明显缩小。体重增加。

紫 草 根

Nitromin



第四例 張×× 52岁 葡萄胎后两年因咳血而
发现肺有转移病入院经服紫草根四天于1968
年7月26日行子宫全部切除术，术后三天肺相有明显
吸收好转。咳嗽咯血停止，尿绒毛膜性腺激素浓
度曾一度阴性，一般情况显著好转。食欲与体
重均有增加。



辨証論治分析器 北京市中區進修學校

價值效用：中醫在治療方面是與有“整體觀念”的在方法上是掌握着“辨証論治”。疾病所表現的症狀往往是復雜和變化多端的，要從不同的症狀，得出不同的治療方法。因此在診斷時要從病人所表現出來的一系列現象而加以分析、鑑別和歸納，也就是說分清虛實的陰、陽、虛、實、寒、熱、表、里，這是中醫診斷的關鍵。為了使學員能更好的掌握辨証，在教學方面試制了此分析器。通過症狀，由分析歸納而明晰的指出治療方法。這樣在診斷內科、病案等課程的教學上是起了很大的輔助作用，同時也更有力地証實中醫的治療是在理論指導下進行的。

發明創造過程：我校全體教研組為了提高教學效果，除去提高教學質量外；在方法上要加強直觀教材，使理論更好地密切結合實踐。古堯提出了建設社會主義總路線，而且要樹立敢想、敢干、敢說的共產主義風格；我們也看到了和听到了全國到處 的技術革新事蹟，因而鼓舞着我們大膽提出辨証論治分析器的制作。我校教研組在學校黨的大力支持和領導下，發揮每個人的智慧，反復討論、共同鑽研，經過同志們利用業余時間苦干了十晚

初步的制做出來。但究屬初創 倉促完成，其中缺
失很多，將望在使用中逐步改進。並广征意見修改
與充實而得以提高。

骨度測量尺

北京市中醫進修學校教研組

價值效用：骨度測量尺主要用在教學針灸腧穴示教
另外對初學針灸的人了解某穴位的部位範圍起着很
大方便作用。例如臑臂經孔最穴，它是位於肘下五寸
五分腕上七寸由腕至肘的骨度無論成人小孩都算1.25
尺所以過去示教過程中，我們是用皮尺，在測量時就必
須依據不同的人；不同的長度用1.25尺換算，這樣做太
麻煩，又費時間，現在我們有了這種測量尺，在使用時予
先表好尺上的刻度，一拈就行了。這對教學腧穴示教及
初學針灸的人就大為方便了。

創建發明過程：在這次技術革新運動中，我組同志深
受到黨的支持鼓勵，我們想起過去腧穴示教用皮尺
的困難，因此就想起用能伸縮的物質做尺就可能
方便了，開始用自行車內胎，實驗結果每寸的長度不
勻，又改用圓盤氣門心實驗成功了。

中医治疗急性阑尾炎

北医第一附属医院

北京医学院附属医院外科在全国大跃进的形式鼓舞下，克服保守思想，发扬中西医结合，研究及应用中药治疗急性阑尾炎，终于成功了。北医外科自八月九日起半个月来共应用中药治疗急性阑尾炎二十例，并作了严密观察及详细病情记录，一般服药后二、三小时腹痛症状减轻，体温及白血球下降，二、三天便可完全痊愈，治疗率达100%，效果非常良好。住院病室欢迎。

中医治疗急性阑尾炎的优点：

- (一) 不便病者免于手术的痛苦。
- (二) 疗效良好，治疗率100%。
- (三) 经济方便，可于广大群众中应用。
- (四) 经济，一般药费仅五元至十元，为阑尾切除术用药费的45%至30%左右。
- (五) 缩短住院日期，一般住院日数为二至五天，仅阑尾切除术住院日数的一半。
- (六) 药剂味甘易服，无毒性不良反应。
- (七) 能手术治疗的术后合併症。

中医治疗急性阑尾炎的处方
疏滞通瘀汤

海杭菊	五钱	金盏白	二钱
粉枳皮	三钱	桃仁泥	二钱
冬瓜子	五钱	广木香	钱半
白芷仁	五钱	败酱草	二钱
花梅柳	三钱	赤茯苓	三钱

便秘者加通川军风化硝各钱半

用法、将此药剂加水 450 c.c. 煎成 150 c.c. 一次服下

再将其渣加水 300 c.c. 煎成 150 c.c. 隔四小时

再服。一般每日服药二剂。若服第一剂后，症状

减轻不显者，可日服两剂。

中医治疗急性阑尾炎 报告(肠痈) 痊愈

北门巷中医门诊部

患者于連生，男，58岁，住前门门框胡同11号。

症象：右下腹剧烈作痛，拒按微呕，当日曾经北京市第一医院检查，诊断急性阑尾炎（白血球计数15000）嘱需作手术，但患者坚决不愿开刀手术，要求服中药治疗。

一次：杭白芍³⁰ 青皮炭¹⁰ 延胡¹⁰ 枳壳¹⁰ 丹皮¹⁰ 败酱草³⁰ 川楝子¹⁰ 金银花³⁰ 乌药¹⁰ 香附¹⁰ 连翘¹⁰ 生甘草¹⁰ 柴胡¹⁰

二次：^{3.3} 服药一剂甚见功效，夜眠甚稳，疼痛已较昨日好一半，精神转佳，情况良好，並於今晨又到市立第一医院复诊，仍嘱患者作手术（白血球计数10200）。

青皮炭¹⁰ 忍冬藤³⁰ 连翘¹⁰ 焦苡仁¹⁰ 枳壳¹⁰ 败酱草³⁰ 丹皮¹⁰ 生甘草¹⁰ 乌药¹⁰ 云苓¹⁰ 神¹⁰ 元胡¹⁰ 杭白芍³⁰ 香附¹⁰ 柴胡¹⁰

三次：^{3.4} 服药亦甚平安，睡眠甚稳，精神亦佳，触诊右下腹疼痛已较此好一半，惟尚有肿块，再拟消肿宁痛之剂。

制乳没¹⁰ 败酱草³⁰ 公英¹⁰ 香附¹⁰ 连翘¹⁰ 甘草梢¹⁰ 柴胡¹⁰ 杭白芍³⁰ 忍冬藤³⁰ 川楝子¹⁰ 青皮炭¹⁰ 当归¹⁰ 川军炭¹⁰ 醋胡¹⁰ 枳壳¹⁰ 乌药¹⁰

四次：^{3.5} 服药甚佳，夜眠稳，胃腹均舒适，大便一次，触诊阑尾已局限范围，再拟前法。

野菊花¹⁰ 当归¹⁰ 川楝子¹⁰ 杭白芍³⁰ 柴胡¹⁰ 山慈姑¹⁰

金銀花藤 元胡 桃仁泥 香附 枳殼 敗醬草
川軍炭 青連翹 公英 冬瓜子 枳殼 青皮炭 生甘草
五次。服甚好，腫已消多，痛不明显了，再擬繼續
消腫法。

大薊 牛夕 桃仁泥 茜草 杭白芍 柴胡
敗醬草 地榆 連翹 丹皮 忍冬藤 荊芥
冬瓜仁 川軍炭 當歸 生甘草
共服藥七劑痊愈。

中药治疗蛲虫病初步观察

北京市中医医院儿科

蛲虫病为常见的一种小儿肠寄生虫病，（多见于十岁以内的小儿），乃经口传染而得，患病率以集体儿童为高，並易反复感染，其主要症状，係（除）患儿在晚上临睡时，由于蛲虫（雌）至肛门周围，引起刺激，感觉奇痒，睡眠不安，神经兴奋，日久能致遗尿，肛门搔痒等不良反应，此以虫病对儿童的正常生长发育，影响很大，祖国医学，很早即有详细记载，如巢氏病源，小儿杂病三虫候，蛲虫至细微，形如菜虫，居肠胃间，多则为痔，剧则为癰，又云蛲虫形甚细小，如今之病虫状，唐孙思邈千金方也有同上的记载，外台秘要云，蛲虫多係小儿患之，大人也有其病令人心痛，清晨口吐汁烦燥则显也，至于此症有腹大肢肤粗黄发痒，或由谷道中溢出等症均有所说明，充分说明了古代医家对虫病已有深刻的认识，关于治疗方面，一般都用驱虫剂，但是驱虫药物很多，经过实验证明，这些药物中疗效比较突出的，根据文献用百布草，苦楝皮，制成驱虫液二种为佳，在古代本草中记载，百布草，治疳杀蛲虫，寸白虫，蛲虫，苦楝皮，杀三虫疳痛（註：三虫即蛲虫，寸白虫，蛲虫）经车林临床试验多次，将此两种药品，配制一种驱虫液，保助消化，效果非常良好，其优点，无服药打针痛苦，易被儿童接受，经济便宜，操作方便，我院治疗 52 例治疗疗效初步观察为 98%。

1. 驱虫液制法：

百布草五两 苦楝皮二两五钱，乌梅三钱，加水煎成 400 毫。

2. 用法：