

保護鳥圖譜

保護鳥圖譜目次

保護鳥所屬部類備查表

鶴

一丹頂鶴 二眞那鶴 三鍋鶴 四黑鶴 五黑袖鶴 六姊羽鶴

燕

七常燕 八琉球燕 九腰赤燕 十潛沙燕 附岩燕

雀類

十一小雀 十二日雀 十三四十雀 十四五十雀 十五長柄

十六島長柄 十七鷓鴣 附山雀 鄂斯通雀 菊戴 不走

杜鵑類

十八杜鵑 十九郭公 附筒鳥

三光鳥

二十三光鳥

雉

二十一尋常雉子 二十二高麗雉子 二十三尋常鸛雉 二十四赤鸛

雉

鵲鴿

二十五白鵲鴿 二十六黑脊鵲鴿 二十七黃鵲鴿 二十八白頰鵲鴿

二十九長爪鵲鴿 三十岩見鵲鴿 附田鵲

棕鳥

三十一尋常棕鳥 三十二小棕鳥 三十三唐棕鳥

鷄

三十四上鷄 三十五瑠璃鷄 三十六黃鷄 三十七野鷄 三十八鰲

鷄 三十九小鰲鷄 附大瑠璃 小燕

雲雀

四十尋常雲雀 四十一大雲雀 四十二濱雲雀

鷓鴣

四十三常鷓 四十四小笠原鷓 四十五琉球鷓

鷓鴣

四十六常鷓 四十七赤鷓 四十八免鷓 四十九琉球鷓 五十大鷓

附大唐鵒

啄木鳥

五十一小啄木 附其餘啄木鳥諸種

松鷄類

五十二松鷄 五十三雷鳥

鳩鵒

五十四河原鳩 五十五雉鳩 五十六斑鳩 五十七紅鳩 五十八金
鳩 五十九絲鳩 六十琉球絲鳩 六十一鴉鳩 六十二小笠原鴉鳩
六十三赤頭鴉鳩 六十四琉球鴉鳩

附錄關涉保護鳥獸各章程

保護鳥所屬部類備查表

釋例 參觀甲之一與乙之一則知二趾向前二趾向後足黃色而鼻孔露出者杜鵑類也參觀甲之二與丙之一則知三趾向前一趾向後嘴及足長而鳥體大者鸛類也餘以類推更按之各本文自了然已

甲 一二趾向前二趾向後

續觀乙下

二三趾向前一趾向後

續觀丙下

一足黃色而鼻孔露出

○杜鵑類

乙 二足非黃色鼻孔爲羽毛所蔽

○啄木鳥

一嘴及足長鳥體大

○鸛

丙 二嘴及足不長鳥體形小或中等

續觀丁下

一翼長四寸或四寸以上

續觀戊下

丁 二翼長四寸以下

續觀癸下

一後趾爪比普通者長

○雲雀

戊 二後趾短

續觀己下

己 二尾羽之末端細且尖鳥體大

○雉

二與前者異體形中等

續觀庚下

庚

一嘴被以軟皮鼻孔上垂軟瓣

○鳩

二嘴堅硬無軟瓣

續觀辛下

辛

一脰生羽毛不露出

○松鷄類

二脰無羽毛與尋常一律

續觀壬下

壬

一嘴及足黃色

尋常棕鳥

○棕鳥

二嘴及足非黃色

○鷓

癸

一翼長三寸以上

續觀子下

二翼長三寸以下

續觀午下

子

一嘴甚短口裂濶

○燕

二嘴不短口裂不濶

續觀丑下

丑

一後趾之爪比普通者長

○雲雀

二後趾之爪長與普通者等

續觀寅下

寅

一嘴壯大而豎幅濶尖端鈎曲

○鵒

二與前異

續觀卯下

卯

一額部白有白色之眉

白鵲鵲
黑鵲鵲

○鵲鵲

二與前異

續觀辰下

辰

一頭上一律作灰白色或茶褐色尾較短

○棕鳥

二與前異

續觀己下

巳

一尾羽之中央二羽比其他尾羽極長

○三光鳥

二與前異頰部焦茶色

○鶉

午

一嘴壯大而堅幅闊末端鉤曲

○鵲

二與前異

續觀未下

未

一嘴之根端橫幅闊自上方視之則作三角形

續觀申下

二嘴細作圓錐狀

續觀酉下

申

一尾羽之中央二羽比其他尾羽極長

○三光鳥

二小鳥也與前異

○鵲

酉

一在上面之尾根帶青色腹側現茶色

琉璃
鸚鵡

○鵲

二與前異

續觀戌下

戌

一鼻孔向前爲羽毛所隱蔽

○雀類

二、鼻孔露出。

續觀亥下

一、形極小、翼長二寸以下

鵲

○雀類

亥

二、形稍大、翼長二寸八分以上

○鵲鵲

保護鳥圖譜表

保護鳥圖譜

日本農務局纂

第一、四季俱宜保護者

鷓鴣

鷓鴣神姿瀟灑，羽毛美麗。古來以爲靈禽之一，珍賞備至。或形諸詩歌，或見諸繪畫，或織其形，或刻其狀，或更畜養於苑囿。維新以前，設嚴刑以保護之，故所至常見此鳥。維新以來，舊制既弛，而其數漸減。今日則殆至絕跡矣。然每歲晚秋，尚獲時聞清唳，及今而保護之，或不難再謀滋殖也。鷓鴣以穀類或水中之小動物等爲其食餌。秋季自大陸而來，其一部分踰日本而南渡，一部則冬季棲息日本。初春爲營巢故，再返大陸，但其少數則至夏不歸，卽留日本營巢養雛。北海道較多見之。日本所見之鷓鴣，凡六種，曰丹頂鷓鴣、真那鷓鴣、鍋鷓鴣、黑鷓鴣、黑袖鷓鴣、姉羽鷓鴣是也。又日本某某地方以鷓鴣屬之鳥，外形似鷓鴣，亦名以鷓鴣，然是絕非鷓鴣屬也。又俗稱鷓鴣爲鷓鴣，按之動物學上，亦不能入鷓鴣類。今寫其形如第一、二圖之一至六，皆視原形縮小。又爲觀覽實物者，謀區種別名之便，揭表如左。

甲 一、軀幹多白色部

續觀乙下

二軀幹以灰白灰黑或灰褐色爲主

續觀戊下

一頸有黑色部

○丹頂之老鳥

乙 二頸作純白或茶褐色無黑色

續觀丙下

丙 一頸上有羽毛如常頸作茶褐色

○丹頂之鵲鳥

二頸上無羽毛皮膚露出

續觀丁下

丁 一頸之全部純白色

○黑袖之老鳥

二頸之上部茶色

○黑袖之鵲鳥

戊 一頸之全部與軀幹同色

續觀己下

二頸有白色部

續觀庚下

己 一額黑而頸上有紅毛

○黑鶴之雛鳥

二全頸灰色而眼後有總總羽色白

○姊羽

庚 一頸之上部全作白色

○鍋鶴

二頸之上部有黑色部

續觀辛下

辛 一自頸上豆後頸色純白

○眞那之老鳥

二自頸上豆後頸非純白色

續觀壬下

士

一自頭上亘後頸作茶色

○真那之雛鳥

二自頭上亘後頸作黑色

○黑鶴之老鳥

一丹頂鶴

又名白鶴第一圖之一

Grus japonicus (Miller). Sacred Crane or Japanese Crane

體之主部純白而頭上赤色自額眼稍頤頰及咽喉部以迄下頸背部處及尾端所垂之羽皆黑色尾端之黑羽乃翼而非尾羽其尾羽則白色也嘴帶綠色脚作黑色本邦所見鶴類中其有純白色之軀幹與黑色之咽喉者惟此一種故易別之但雛鳥有稍異者頭無赤色羽頸無黑色部而頭頸俱現茶褐色餘部雖與老鳥同而軀幹之白羽中稍雜以茶褐色之羽云此種向惟日本東北部見之其數亦不甚衆而在北海道則有入夏仍營巢養雛者丹頂者古來富家庭園多飼養之但概從海外運致者近則來自朝鮮者爲多蓋在彼國此種之多亦如他種也其本來蕃殖之地在西比利亞東部諸地秋期南渡初春再歸產地

二真那鶴

第一圖

Grus leucucheta J. White Necked Crane

全身殆灰蒼色甚則灰黑色惟自頭上沿頸背以至肩其間皆白色咽喉之前部亦

然眼之周圍亦嘴帶綠色脚則暗赤雖鳥則眼之周圍無赤色部頭上稍有茶色之羽餘畧與老鳥同鶴類中軀幹灰色頸背之肩以上皆白色者惟此一種

日本古來此種最多所至皆見秋分前後自大陸而至經冬不去其蕃殖地與丹頂鶴同

三鍋鶴

又名黑鶴第一圖之三

Grus monachus J. White headed Crane

此前二種形稍小全身灰黑而自頸之中段以迄頭部皆白色其額及眼稍處則黑色頭上無赤羽而嘴帶綠色脚黑本邦所見鶴類中其上頸部周圍全作白色者祇此一種

以秋期飛來往時惟西南地方較多近則九州某地亦見之其蕃殖之地與前二者同

四黑鶴

又名元鶴第二圖之四

Grus sinensis Bechst. Common Crane

全身灰黑自眼後迄頸側稍帶白色自咽喉部及頭上迄上頸背部現黑色頭上雜以赤羽嘴黃綠脚黑雖鳥額黑頭上赤頰部淡白餘部悉灰褐色日本所見鶴類中

其體軀色殆全暗而頭上色赤者祇此一種

五黑袖鶴

一名袖鶴第二圖之五

Grus leucogeranus Pall. Siberian White Crane

全身純白惟翼末端之大羽現黑色此所以有黑袖之稱也頭上及眼之周圍不生羽毛皮膚露出作濃赤色嘴及脚現淡紅色雌鳥之頭及上頸部作茶色又軀幹之白羽間稍雜以茶色之羽餘畧與老鳥同

此種往時罕見其蕃殖地亦在西比利亞冬則西入歐洲南入日本支那及印度北部

六姊羽鶴

又名姊和鶴第二圖之六

Grus virgo L. Semiradskaya Crane or Murmidian Crane

形比他種最小全身灰黑色唯眼後有長羽總狀其色純白形貌頗麗

往時日本似罕見此種其產地乃中央亞細亞入冬則至歐洲大陸北亞非利加東亞細亞等處

燕

燕小鳥也其嘴扁平且小而口大尾羽畧分叉其往來日本者有五種常燕琉球燕

腰赤燕潛砂燕及岩燕是也諸種皆性好食蟲夏季能驅蚊蠅等害蟲故爲益鳥保護之不獨有益衛生亦足以匡農林之利岩燕與他種習性相同但其棲息地在深山幽谷且有等地方人民捕而售之以營生計若一朝遽立捕獲之禁情勢殊難故姑不置諸保護鳥之列以上五種外有雨燕針尾雨燕小燕海燕等然其名雖燕實則皆非燕屬唯以尾羽之分又或體貌之近肖以得名耳就日本所見眞燕五種表其形貌如左

甲

一羽色中有赤茶色部

續觀乙下

二羽色中無赤茶色部

續觀丁下

乙

一腰部赤茶色

○腰赤燕

二腰部非赤茶色

續觀丙下

丙

一腹白色

○通常燕

二腹灰色

○琉球燕

丁

一腰部白色

○岩燕

二腰部與脊俱暗褐色

○潛沙燕

七常燕

第三圖之七種全形二分之一

Hirundo rustica gutturalis (Scop). *Eastern Clayney swallow*.

額及咽喉部作栗茶色。咽喉與胸之間有暗色帶。而胸以下之腹部則純白色。體之上部白。頭上至尾根皆黑色。老鳥青紫色。雛鳥則閃綠色之光澤。尾羽深分二股。黑色無澤。有白點。

此種以春季南來日本。夏季營巢戶外。秋則南去。蓋飛往暖國以求食避寒也。支那及滿洲亦時見此燕來去。在歐洲所常見者。與東洋產其色稍異。然大畧亦非別種也。

八琉球燕 第三圖之八視
全形二分之一

Hirundo javanica everetti (Steg). *Morrise's langshan swallow*.
棲息沖繩諸島。故有此名。其形狀羽色俱酷肖常燕。但較之稍小。又其相異者。尾羽之分叉較常燕頗淺。以羽色言。則其上部之黑色帶綠色之光澤。咽喉栗茶色。咽喉與胸之間無暗色帶。而胸以下之腹部作灰白色。

習性與常燕不異。去來亦兩者相俱。而沖繩以北不見其影。印度地方亦有此種。但比琉球所見者體形更小云。

九腰赤燕 第三圖之九視
全形二分之一

Hirundo apertiro nipalensis (Hodgs) *Japanese Moorish swallow*
體軀酷肖常燕而自額互背部色黑且現青色之光澤腰部與頭側部俱赤茶色下面自頤至腹部帶淡茶色且有無數黑色細縱條翼及尾羽黑色無澤但其尾羽不似常燕之有白點也

此種在日本不甚多春來秋去與常燕同

十潛砂燕 第三圖之十視
全形二分之一

Ceryle riparia J. Sand-Martin.

燕族中之形至小者也尾羽畧分叉自頭部至尾俱暗褐色而其背部之羽緣爲淡色又胸部亦暗褐色而咽喉部及腹部則白色

此種不似常燕之多見而某地則結隊飛翔穿穴於海濱河岸等砂土中而產卵焉亦以蕃殖之期來日本與他燕類同

附岩燕 第三圖之十一視
全形二分之一

Chelidon dasypus Bp. *Black-chinned Martin.*

據現行法律則岩燕不在保護之列然特記於此以示其與他種有區別形大小畧如常燕尾羽短且分叉極淺殆竟似不分叉然自頭至背部黑色而有澤腰部白尾

羽及翼羽俱黑色下面則除頤部有黑色小點外餘俱白色又有與他種相異者脚之諸趾自爪根以上生小羽

至冬季則日本深山中有此種無數爲羣營土巢於絕壁而產卵焉秋季南去至婆羅島經冬云通常此種所居處亦有兩燕及針尾兩燕棲息其間而後兩種非燕屬其外形雖酷肖真燕而體軀較大故易識別

雀類

狩獵法施行細則第十四條所謂小雀日雀四十雀五十雀柄長及鷓鴣等在動物學上可總括爲同一部類故稱之以雀類右舉諸種外可屬雀類尙多舉其主者山雀鄂斯通雀花鷄木走等是也皆小鳥嘴作小形圓錐狀鼻孔自嘴根向前有羽毛故鼻孔隱而不見隸此類者皆啄食害蟲而毫不爲草木之害故於農林業上極有益也現行法律僅保護其一部分以謀施行之宜耳今不問是否在保護之列舉日本所產各雀類之主要者表其狀如左

甲

一喉黑或灰黑

續觀乙下

二喉不黑

續觀己下

乙

一腹側栗茶色

續觀丙下