

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行
七

編註醫學入門外集卷之六

婦人門

經候

經病百端血滯枯

婦人以血為主天真氣降壬癸水合腎氣全盛血脈流行常以三旬一見以數月盈則

或內傷生冷七情鬱結為痰為瘕凝積於中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服食燥熱以致又
動邪氣感而津血衰曰血枯良方云經後被驚則血氣錯亂妄行逆於上則從口鼻而出逆於身則水血
相搏變為水腫恙怒則氣血逆於腰腿心腹背脇手足之間重痛經行則發過期則止怒極傷肝則有眩
暈嘔血癰歷血風瘡瘍等病加之經血滲漏於其間遂成竅穴生瘡淋瀝不斷濕熱相搏遂為崩帶血結
於內變為癥瘕凡此變症百出不過血滯與枯而已但血滯亦有虛熱血枯
亦有虛熱故重則經閉不通以滯枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已滯宜破血枯補虛
因飲食熱毒或暴怒凝於積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起於
勞役憂思却宜溫和滋補或兼有痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但不可純服
峻藥以虧陰道至於耗氣益血之說雖女科要法但血為氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降
氣行則行氣滯則滯如果鬱火氣盛於血者方可單香附丸散仰氣散當加木香枳榔枳殼以開鬱行氣
若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽生則陰自長氣衰則血亦凋豈可謂耗其氣耶論者多泥
叔和血旺氣衰不知叔和論肝肺二脉則宜肝旺於肺其氣血平和有孕故經曰兩臟通和但婦人見
偏仙鄙婢妾志不得伸鬱怒無時不起故香附為女
人仙約經曰邪氣盛則寔正氣奪則虛可不悟諸
閉不通或寒或暑俱謂之熱入血室小柴胡湯加生地或黃芩芍藥湯加生地經行過食生冷或外被冷
濕以致瘀血凝結者五積散去麻黃加牡丹皮紅花○七情心氣鬱結不行者分心氣飲去羌活半夏桑
皮青皮加川芎當歸香附義術玄胡索有
火者更加黃芩或小調經散單香附丸
歸煎
湯下枯傷勞食或作池內傷飲食勞倦損傷脾胃氣弱體倦發熱腹痛腸鳴飲食減少而不生血者補中
益氣湯加川芎生地天花粉有腸鳴月水不來者病在胃胃虛不生血氣宜單厚
朴五錢空心水煎或單蒼朮膏水泄少食者升陽益胃湯無泄少食者二陳湯加白
術黃芪便製香附富歸芍藥壯丹皮麥門冬山查麥芽因飲食積者更加義術枳殼
粘住血海地位經閉者導痰湯加川芎黃連不可服地黃泥膈故也如用須薑汁炒過○胃熱消渴善食
漸瘦津液為乾燥渴者宜瀉胃熱四物湯合調胃承氣湯名玉燭散再合涼膈散各三和散輕者小柴胡

湯合四物湯去人參半夏加天花粉○素虛形瘦口燥善食厚味鬱為痰火有潮者通達散加脫血及房
黃芩無薄荷四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸大舉肥人多氣弱有濕痰瘦人多血怯有火脫血及房

胞氣竭○少年大脫血或醉後入房氣或產育過勞胎及多產育傷血或誤服汗下劑之不通大
概只如此○紅花當歸散紫葳散通經丸導經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血益陰使津

液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻逼是求千金於不調前後色何如○以期言之對期者性和血足
乞巧必死而後已○以上言經水不通以下言經水不調

為害以色言之心主血陰從陽故以色紅為正雖不對期而色正者易調後期來少血不足○後期三五日者為血虛四物湯加參芪白朮陳皮
色紅為正雖不對期而色正者易調後期來少血不足○後期三五日者為血虛四物湯加參芪白朮陳皮

花肥人多痰二陳湯加南星蒼朮滑石芎歸香附○來少色和者四物湯加熟地白朮陳皮
去芍地加澤蘭葉三倍甘草少許十味香附丸內寒血虛來少或曰少五六日以上者四物湯加桃仁紅

花壯丹先期來多血有餘○先期三五日者為血熱四物湯加芩連肥人參瘦先十數日者血氣俱熱也
以上者內熱血散也四物湯加芩連瘦人參瘦先十數日者血氣俱熱也

有火者固經丸肥人多痰者清海養血丸或前或後氣血亂○或前或後或當歸散調經散單丹參散淋瀝
不○斷邪未○時行時止淋瀝不斷腹中作疼乃寒熱邪氣客於胞中留滯血海外疼也如有積下利不定

腹痛查牛膝散或行或止心痛者失笑散經水適來適斷往來寒熱者先服小柴胡湯加地黃後以四物
湯和之有月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芪有經行不止者四物湯加地榆阿膠荊芥熱者倍黃芩或

吞固風熱色紫甚則黑淡因疫滯濕糲糊○色紫者風也黑者熱甚也淡白者虛也或按痰停水以混之也
經片色不變者氣滯也或風冷乘之也色變紫黑者血熱也○大舉紫者四物湯加防風白芷荊芥黑者

四物湯加芩連香附淡白者古芎歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳湯加芎歸如煙塵者二陳湯加秦
芩防風蒼朮如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附玄胡外症潮熱內腹痛○月水循環病不

索枳殼陳皮隨症選用○通用琥珀調經丸百子附歸丸黑附丸外症潮熱內腹痛○月水循環病不
疼重則加之咳血汗嘔或瀉有潮汗則血愈消耗有咳嗽則氣往上行瀉則津偏於後疼則積結於中是

以必先去病而後可以滋血調經就中潮熱寒痛尤為婦女常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸血滯積於
於中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋養百致則骨熱於外血枯胞絡火感或按痰氣食積寒冷

外邪則為疼痛○潮熱有時為內傷為虛無時為外感為寔虛者大溫經湯熱者四物湯加柴芩經閉者
滋經前湯骨蒸者大胡連丸大烏雞丸五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者茯苓補心湯有汗者逍遙

散經前潮者血虛有滯通達散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱通達散去柴胡換地骨皮加
散經前潮者血虛有滯通達散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱通達散去柴胡換地骨皮加

散經前潮者血虛有滯通達散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱通達散去柴胡換地骨皮加
散經前潮者血虛有滯通達散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱通達散去柴胡換地骨皮加

散經前潮者血虛有滯通達散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱通達散去柴胡換地骨皮加
散經前潮者血虛有滯通達散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱通達散去柴胡換地骨皮加

生地使炒黃芩此乃能加減退熱聖藥有咳加桑白皮貝母結梗知母麥門冬咳血加生地山梔牡丹皮

嘔血如陳皮半夏旋覆花噎膈加薑炒黃連或麥連二陳湯尋常潮熱者腎氣丸大造丸或四物湯料加

便炒黃芩各一兩四痛滯經前虛後呼此言腹痛也經事欲行臍腹絞痛者為血滯四物湯行時痛者為

製香附一斤蜜丸服痛滯經前虛後呼此言腹痛也經事欲行臍腹絞痛者為血滯四物湯行時痛者為

氣滯烏藥丸氣滯血瘀者大玄胡索散或四物湯加桃仁紅花莪朮元胡索香附丸經水將行被風冷相

搏繞臍痛者乃寒氣客於血室大溫經湯桂枝桃仁湯經水日來時痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹

皮甘草○經後痛者為血虛八物湯小烏雞丸歷年血寒結胞門嘔吐涎唾膈痛陰冷微引腰脊

而痛者酒煮當歸丸大溫經湯○通用水腫經前血腫後經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞

交加地黃丸滋陰百補丸之製香附丸水腫經前血腫後經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞

經散等歸丸先浮腫而後經水不通名曰水分乃脾不能制水與水并浮肌肉為之虛腫紅腫丸

通用腎氣丸水分若澤瀉加防已草薢木通血分君牡丹皮如牛膝紅花有經閉脚腫者桑皮散血風身

痛痺皮膚血風乃氣血虛而襲風冷身體歷節痛者大芎藭散麒麟竭丸起痛散血風丸經閉身痛溺滯

蒼莎丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者通遠散皮膚瘙癢者四物湯加荊芥或古烏荊丸肌肉頑

麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項脊痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症人

參荊芥散素虛者女金丹史養胃通心真要法經曰二陽之病發心脾益衝為血海任主胞胎二脉起於

國公浸酒方胎前產後皆同養胃通心真要法經曰二陽之病發心脾益衝為血海任主胞胎二脉起於

為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出

納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺金失養為氣血之運飲食勞倦損其中氣以血少不

氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

女扶陰抑寡居女子十四衝任成而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒

男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩桑胡或通遠散如山梔

連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰拍子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚

者抱胆丸經絕不通者五松散○寡婦鬱悶百端或暴夫不能頓志或門戶不能支持或望子孫昌盛心

火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗肝脉弦長當抑肝

之陰氣惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕稍涉勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜

明處惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕稍涉勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜

清神春榮四物湯加人參茯神陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉

遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜扶神羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉

遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜扶神羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉

遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜扶神羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉

遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜扶神羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉

遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜扶神羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉

苓甘草
水煎服

崩漏

崩漏有虛亦有熱。熱則流通虛溜池。血熱則流。虛則溜。凡非時血行。淋瀝不已。謂之漏下。虛多房勞挾火。

邪。經行犯房及勞役過度損傷衝任氣血俱虛不能制約經血。忽然暴下。宜大補氣血。大溫經湯。氣虛者

肝散一切虛症。內火散虛火。涼血地黃湯。生地。黃芩湯。補陰丸。久者當歸。部骨丸。大小烏雞丸。熱則飲食不調。節。有因膏粱厚味以致脾濕下流於腎。與

火乘脾胃下陷。顏容似無病者。外見脾困倦煩熱不臥等症。經水不時暴至。或適來適斷。只宜舉養脾胃。

加以鎮墜。心火之藥。補陰。陽。或因四氣苦相侵。子宮為四氣相搏。則血亦難停。大舉風冷。搏動者。五精

自止。升陽調經湯。升陽舉經湯。或四氣苦相侵。散去麻黃。入醋煎服。或不換金正氣散。加川芎。官桂。或

四物湯。加荊芥。○寒冷所乘。及年老久崩者。伏龍肝散。加附子。鹿茸。阿膠。蒲黃。糯米糊丸服。○暑月。單芩心丸。或益元散。加百草霜。○濕者。升陽除濕湯。或為悲憂心痛切。悲哀甚則

絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數泄血也。宜備金散。四製香附丸。為藥湯。或橘歸丸。○憂鬱因先富後貧。

先順後逆。心氣不足。鬱火旺於血脈之中。宜四物湯。加香附。白朮。各一錢。地榆。黃芪。人參。各五分。升麻。二

分。甚者。加棗。櫨。反酒調服。○心痛甚者。名殺血心痛。小產。勢急須宜止且行。經曰。陰搏陽謂之崩。言屬熱

後血過多。心痛者。亦同用烏賊魚。墨炒。為末。醋湯調服。○勢急須宜止且行。經曰。陰搏陽謂之崩。言屬熱

故道。淳溫。妄行。遽止。便有積瘀。凝成。單血不止。又恐昏暈。必先服五靈脂。末一錢。其性能行。能止。然後分

虛熱。用調和氣血之藥。一二貼。後再服單五靈脂。散去。故生新。如更不止。為紗帽散。十反散。古黑神散。單

更枯草膏。有火者。固。養胃安心還舊血。血崩已後。宜四物湯。加炒乾薑。調之。氣弱加參。芪。有鬱加香。附。扶

帶下

帶下赤白皆濕熱。臍腹痛甚濕熱結。經曰。小腹寬熱。泄出白液。寬者。濕熱。屈曲。凝滯。結於小腹。自脫上而

頭昏目眩。口苦舌乾。咽嗝。大便或開或澀。小便澀。皆熱症也。如赤白痢。濁。一般。但不痛耳。間有病者。濕熱

佛鬱甚。則肚腹引痛。婦人服食燥熱。性行乖戾。以致肝旺脾經。而生濕熱。熱則流通。古人有用導水丸。下

之繼以浸射之或苦練丸大玄胡索散調之如臍腹痛者
暫以辛溫開導如天溫經湯補經固真湯鹿角丸是也
大帶不止者用地骨皮一兩生地五兩酒十盞煎至三盞分三次服或白芷散單益母丸○白帶
兼痛風者二陳湯加蒼術南星牛膝川芎兼風濕者蒼術辛芎散兼七情者側柏槲皮丸
黃痰作孽 肥人多濕身黃脾緩陰戶如水或痛白帶并陽燥濕湯四炒固真丹○濕痰流平滲入腸肚宜
液下數丸候鬱積開服○本末皆然○或蒼術槲皮丸○結痰白帶單槲白皮炒為末酒調丸血間有虛寒
虛加四物湯氣虛加參朮陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹痛加乾薑

帶臭腥陰中冷痛何曾歇 虛因月水淋瀝不已或崩中暴下或經後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升
建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大
烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽七氣虛極
帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者回物湯加桂

外感風邪傳各經 風邪入於胞門或中經脈流傳
附常用酒者當歸丸小烏雞丸益母丸琥珀調經丸
赤如紅津肺經白形如涕脾經黃如爛瓜腎經黑如血
血宜胃風湯或五積散去麻黃主之通用單地榆散

一種白淫思慮切 思想無窮所願不得意淫於外
謂白物淫如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥又有日夜流津如清米泔或如精膠者謂之白崩與白
淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補銷心丹因思傷脾胃者四七湯下白丸子或歸脾湯痞悶少
食者沉香降氣湯因勞傷腎氣心腎不交者

室女胎產法相同 室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或
金鎖正元丹小兒緣子丸或喜丸疏苓丸
室女胎產法相同 當風取涼故經水止而即患帶下宜琥珀
硃砂丸○孕婦帶下全長濕熱宜茶葉及丸○平時陰陽過多產後亡血及下虛風補衛調脾循故轍

邪乘虛入於胞絡宜煖宮丸加薑附吳茱萸或黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸補衛調脾循故轍
凡崩中帶下或用升提如升陽調經湯或用收澀如伏龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衛司開闔
而為榮血之主脾胃為血海水液之會衛氣與胃氣俱虛則血液無所約制是以古方有用程枝湯加附
子以固衛氣者四君子湯加草果丁香木香以燥水健脾者或用理中湯加陳皮半夏或單半夏丸
用芎歸煎湯下或補中益氣湯平胃散皆補衛厚脾使氣血日循故轍而不專於收澀以劫奪之也

癥瘕與男子種
取條參看

癥瘕冷熱都是癥或因食積或鬱 癥者堅而不走瘕者堅而能移七癥八瘕經亦不詳雖有蛇咬蟹肉
以異於男子者皆因疾發及經水行時或飲食生冷以致脾虛與臟氣相結或七情氣鬱生痰皆必挾痰
血而後成形要知癥瘕症癖有痕腸單食癥血癥食癥血癥瘕種不一盡皆痞塊之異名耳○經云大腸

移熱於小腸小腸移熱於大腸兩熱相搏則血溢而為伏瘕月事不和以此推之瘕瘕皆有熱者蓋瘕血亦有熱燥逼成况陽氣怒火蓋聚飲食濕熱鬱結成末可專以寒冷論也大柴虛冷者內受散琥珀丸
溫白丸熱者消塊丸連羅丸外貼三聖膏神仙阿魏散久不愈者猪肝丸長砂一粒丹神聖代針散
血四物湯加桃仁並汁甚者如蜀血根入玄胡粉下之故桂枝桃仁湯外以並菜搗餅熨痛處或驚痛丸
甘草散或單黃連丸小調中湯加貝母薑汁糊丸服○鮮氣白葱散瘕散天承氣湯加黃連芍藥川芎乾薑
飲潤下丸或二陳湯加香附枳壳
指梗瘕瘕食積者白芥丸海石丸
腹痛經閉如懷胎面黃寒熱夢無數瘕瘕得冷則發腹痛支滿胸膈悶
胎之狀邪氣甚盛令人恍惚夜多異夢寒熱往來四肢不舉陰中生瘡甚者小便淋瀝或兼帶下小腹重
痛面色黃黑入於子臟則絕產入於胞絡則經閉宜入參荊芥散小溫經湯通散散通經丸舌斑玄丸選
用○血與氣併心腹痛連腰脇背脊甚則搖搖經候不調謂之血瘀玄
胡索散手拈散失笑散單乾膝丸數症因痰瘀氣積者與上諸方通用瘕癖病治頗相同瘕瘕在腹內近
條筋脉急痛如臂如指如莖之狀名曰瘕癖者偏斜在兩肋之間有
時而痛名曰癖皆陰陽不和飲食停滯冷氣相搏而成亦得冷則發腹脹不食亦可懼紅丸子猪肝丸小
腸覃可按血自通腸覃乃寒氣客於大腸與胃相搏犬腸為肺傳送肺主氣氣得熱則行得冷則凝凝則
移月事時下或多或少或氣病而血未病石症塞胞經無路女子瘕瘕氣發則腹痛逆氣上衝乃胞中傷
也宜二陳湯加香附以開之或香粉丸
胎月事不下乃先感寒氣而後血壅不流所致血瘕石瘕如氣血瘕散
聚湯疝瘕瘕香丹古硝黃膏石瘕見現丹主之或通經丸如紅花尤妙氣蠱血蠱堅如石水蠱腫滿俱難
治蠱者三虫聚而食血之象即瘕瘕之甚者肚腹急硬如石腫滿如水乃瘕結胞門或產後為水與血搏
通用四香散千金桃仁煎內消散蠱者肚腹抱壅八黃米丸單腹蠱服者大腹皮散救之詳男科腫
脹調氣破血漸消除虛者還宜補脾胃善治瘕瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰其大半而止
之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻擊之藥病
重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

胎前

胎前清熱與養血婦人無病月事時下乃能受孕氣血充寔則可保十月保純子母無虞若銜任不充偶
後受孕或孕後挾熱及七情勞役動火輕則胎動不安重則遇三五七陽月必墮火能消物故也月分依
宜安胎丸常服以清其熱熱清則血循經而不妄行所以養胎也諺云胎前不宜熱良有以哉

經善調變。各經氣血多少虛實不調則胎孕不安。一足厥陰二少陽。夫人之有生也。母之血室方開。父之

精血乘冲氣自然旋轉。不忌如凝。婦之懷胎。吞啖合受。成一團圓。璇玑九日一息不停。然後陰陽大定。玄

黃相包。外似繆絲。瑤瑤其中。自然虛成。一囊空洞。虛圖與雞子黃中。一火相似。而圖圖之外。氣自凝結。為

胞衣。初薄漸厚。如彼米飲。豆漿。面上自結。一皮中。數日生。從無入有。精血日化。從有入無。九日之後。次九

又九。凡二十七。日即成。一月之數。數自然凝成。一粒如露珠。然乃太極動而生陽。天一生水。謂之胚足。厥

陰脉所主也。此月經閉。無潮無痛。飲食稍異。平日不可觸犯。及輕率服藥。○又三九。二十一。日即二月。數

此露珠變成赤色。如桃花。瓣子乃太極靜而生陰。地二生火。謂之胎足。少陽脉所主也。此月腹中或動或

不動。猶可狐疑。若逆吐思酸。名曰惡阻。有孕明矣。或偏嗜一物。乃一臟之虛。如愛酸物。乃肝臟。三四胞絡

止能養胎。而虛也。二三個月。間忽心腹痛。不安者。用當歸三錢。阿膠甘草各二錢。葱四莖。煎服。三四胞絡

三焦訣。又三九。二十七。日即三月。數百日。間變或男或女。形影如清。算漆中有白絨。相似以成人形。鼻與雌

所主。胎最易動。古云。木湯或為丸。煩服最妙。如無惡阻等症。胎有可疑者。用驗胎法。以川芎為末。一錢。五

更艾湯調服。服後腹中不覺動者。則為經病。如覺微動者。則為有孕。或因驚恐墮胎。氣不和。轉動不能

膈腹疼痛者。溫酒調下二錢。加當歸尤妙。如胎不安。及腰背痛。不可忍。者。古桂續丸。○四月。男女已分。始

受水精。以成血脉。形像具六。胎順成。手少陽脉所主。多心腹脹。服飲食難消。甚者。用平胃散。換白朮。如香

附烏。為大腹皮。如因驚恐動胎。下墜。小腹痛。引腰脇。小便疼痛。下血者。當歸湯。四五。五脾六胃七肺金。五

個月。忽心腹脹痛者。用大棗十四枚。炒黑。鹽一錢。燒赤。為末。取一撮。酒調服。之立愈。五脾六胃七肺金。五

始受火精。以成陰陽之氣。筋骨四肢已成。毛髮始生。足太陰脉所主。○六月。始受金精。以成筋口。目皆成

足陽明脉所主。五六月。胎不安者。要胎飲。固胎飲。選用。○七月。始受木精。以成骨。皮毛已成。遊其氣。能動

左手手太陰脉所主。如胎氣不安。八手陽明成數穴。八月。始受土精。以成皮膚。形骸漸長。九數皆成。游其

九腎十膀神氣完

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

身足少陰脉所主。○十月。受氣足。五臟六腑

湯或干味香茹散。○感濕腰脹身重者。早胃散泄者。三白湯加砂仁厚朴蒼朮內熱加黃芩。○內傷七情氣滯不行者。紫蘇散。○內傷勞役以致小腹痛墜甚則子宮墜出者。氣陷也。補中益氣湯。○因房勞者。八物湯加酒炒黃芪為君。防風升麻為使。○內傷飲食胸膈滿痛者。平胃散。○換白朮加山查麥芽黃連。○內傷薑椒熱酒腥羶炙燥以致胎熱令母兩目失明頭痛腮腫項強者。消風散。○或四物湯加苓連煎防。○內傷生冷水血或外又感寒以致胎冷不轉。臍腹絞痛。腸鳴泄瀉。○八物湯加吳茱萸以理中湯之劑治之。泄甚如木香訶子陳皮白芍藥米中病即止。○因感傷以致胎虛寒者。八物湯加吳茱萸以理中湯之劑治之。泄甚如木而墮者。此類問亦有之。非常治法也。○雖病與男子一同。但孕婦服藥禁忌。不犯則不動胎。如子產熱多清脾飲去半夏寒多人參養胃湯去半夏久不愈者。勝金丹截之。胎病熱者。舌苔未行。屬少陽天癸已行。香連丸傷冷瘧痢交作者。腫脾飲子胎驚心中怔忡。調治須知三禁法。婦人天癸未行。屬少陽天癸已行。睡臥不寧。熱者。蘇砂安神丸。虛者。定志丸。餘可類推。調治須知三禁法。屬厥陰天癸已絕。屬太陰胎產之病。治厥陰經者是。祖化之源也。治無犯胃氣及上二焦為三禁。不可汗下利小便是也。汗則痞滿下則傷脾。利小便則亡津液。舊以四物湯為主。如傷寒各經加減法。例莫若外感時氣。從四物湯合小柴胡湯。陰症四物湯。合理中湯。古考木湯傷寒最妙。雜病四物湯。四君子湯。二陳湯。加減間有服毒藥而不致胎動者。乃病邪重。胎元寔也。豈可視為常法。且陰陽調和者。不可妄服藥餌。三五個月前一毫辛散。滑利禁用。七八月間。倘秘結者。乃散滑利。又當審其素慣墮胎及難產。斟酌用之。胎動心腹腰作疼。

甚則下血如經行。或因七情氣不順。或因外感風寒。經原挾風寒而受胎。或因驚恐。或因喜怒。不常或因銜任二致胎動。而母心腹作痛。甚則腰痛。下血當安胎。而母自定。○胎動因七情氣逆。心腹脹滿。疼痛者。紫蘇飲。因外感發熱。頭痛嘔逆。胸脅脹滿者。安胎飲。加柴胡大腹皮。氣血虛者。安胎飲。倍參朮。服熱者。因胎飲。○腹脹服安胎藥不止者。須辨寒熱虛實。寒者。理中湯。加砂仁。香附。熱者。黃芩湯。血虛胎痛者。四物湯。或平胃散。加蘇鹽煎湯。吞二宜丸。氣虛痛者。四君子湯。加芍藥。當歸。氣寔心腹作痛者。用香附枳殼等分為末。空心白湯下。○心痛寒者。艾葉小茴川練等分。空心水煎。或單豆蔻丸。熱者。一陳湯。去半夏。如山梔黃芩。○心腹脹痛。素有冷氣。腹痛。衝心。如刀刺者。四物湯。去地黃。加茯苓厚朴。人參。吳茱萸。桔梗。枳殼。甘草。山梔黃芩。酒少許。煮汁飲之。不飲酒者。用鯉魚。如茯苓厚朴等分。水煎。服單方。用鯉魚。如食治。入大棗十四枚。炒鹽一錢。者。必欲產也。因七情者。紫蘇飲。如杜仲續斷。因閃到者。用破故紙。二錢。為末。胡桃肉一個。研勻。空心酒調服。素虛痛者。青娥丸。腰痛。如折。不能轉側者。用鹿角五錢。火煨。酒淬。再煨。再淬。以碎為度。研末。酒調服。○胎痛。下血者。膠艾芍歸湯。或加砂仁。秦光。羌活。桑寄生。寄生。杜仲。下血腹痛。難忍。或下黃汁。如漆。或因如豆汁者。用野苧根。金銀花。根。各五錢。水酒各半。盞煎。服下。血產門痛者。用單黃連末一錢。酒調服。○

母病或壓。有因母病以致胎動者。但治母病而胎自安矣。如母有宿疾。而胎不旺者。長胎白朮丸。有藏瘦弱痰氣血枯。竭胎終不可保者。用牛膝四分。木香桂心。蟹爪各二分。為末。空心溫酒調服。

下之免害其分挽又用紅酒燮五兩清酒十盞煎二沸去渣分五服隔指再服次早再服其子於胎令母
肥感無疾或麥芽神變煎服尋常古考歸湯最妙○孕婦或從高墜下重物所壓致動胎元心腹痛甚下
胎即用砂仁畧炒勿焦為末熱酒鹽湯艾湯皆可調服覺腹中熱其健脾胃養血總安益通用古本湯加
豆豉艾葉地榆膠痛加杜仲驚悸加黃連煩渴加麥冬熱加蘇合香丸白濁熱腹痛如白芍腹脹加厚朴下
血加艾葉地榆膠痛加杜仲驚悸加黃連煩渴加麥冬熱加蘇合香丸白濁熱腹痛如白芍腹脹加厚朴下
役加黃芪氣喘去白朮加香附便燥加麻子仁養血難產加枳殼蘇葉素懷墮胎加杜仲素血虛加芎歸
此安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五日十日一服常服安胎易產所生男女又凡胎
毒益壯婦脾土運化遲滯則生濕濕則生熱故用黃芩清熱以養血白
木健脾以燥濕安胎九金匱當歸散加味養榮丸皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛
胎動不痛者為胎漏血多為熱少為虛
連益母草或金匱當歸散加味養榮丸血黑成
片者三補丸加香附白芍○血虛來少者古膠艾湯或合四物湯長胎白朮丸○氣虛者四君子湯加黃
芩阿膠因勞役感寒以致氣虛下血欲墜者芎歸補子湯或下血如月信以致胞乾子母俱損者用熟地
炒乾薑各二錢
惟有一犯房難救亡
胎漏亦有犯房盛婦人月水當來者或因登廁風吹陰戶者雖不服藥亦
為末米飲調服

偶然尿血莫糊糝
尿血自尿門下血胎漏自人門下血
髮反單苦黃菜飲亦妙因暑者益元散加升麻煎湯下稍虛者膠艾四物湯
物湯加膠
久者用龍骨一錢痛
黃五錢為末酒調服

惡心阻食名惡阻
或大吐或時吐渴水惡聞食其由子宮經絡絡於胃口故逢食氣引動精氣
衝上必食吐盡而後精氣乃安亦有誤交合而子宮穢感者過百日則愈
瘦人多熱
肥人痰
二陳湯加竹茹生薑熱加芩連
因怒者單黃連丸茯苓煎湯下
亦有無陰并氣弱
無陰則嘔者陰脈必弱頭痛全不入食者八物
湯合二陳湯加枳梗氣弱者四君子湯加陳皮

肥人痰
二陳湯加竹茹生薑熱加芩連
因怒者單黃連丸茯苓煎湯下
亦有無陰并氣弱
無陰則嘔者陰脈必弱頭痛全不入食者八物
湯合二陳湯加枳梗氣弱者四君子湯加陳皮

麥門冬厚朴竹茹日久水漿不入口吐清水者
或加丁香惡聞食氣多臥少起者覆花散
或因胎動別症兼
三四個月病惡阻者多因胎動不安或
兼腰腹疼痛者保胎飲兼產痢口中無

味及會傷風冷者醒脾飲子兼傷食者
二陳湯加砂仁香附
或單白朮為丸或單砂仁為末米飲下甚者紅丸子極效

子煩燥悶亂心神火盛剋肺好生噴
妊孕心煩燥悶謂之子煩多受胎四五個月間相火用事或應天令
五六月間若火大行俱能乘肺以致煩燥胎動不安大抵相火盛者

單知母為末蜜丸
或寔大每三丸酒下日月未足欲產及難產者亦效君火盛者
單黃連丸心神不安者硃砂安神丸煩甚恐傷胎者單胎散切不可以虛煩約治
或有停痰胸膈滯亦令

胎前
上海錦堂圖書局印行

煩燥不宜人。或有精痰精飲滯於胸膈之間亦令煩燥胎動不安者用茯苓防風麥門冬黃芩等分竹葉減半水煎入竹瀝調服

子懸心腹脹滿胎氣湊心相火關。謂之子懸宜紫蘇飲有鬱心腹脹滿甚者加莢木及丁香少許不食者古苓木湯倍甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣悶絕誤學子死不能動此症兩尺脈絕者則增寒手指

白木加芍藥。甚則悶絕欲傷人而火盛極一時心氣悶絕誤學子死不能動此症兩尺脈絕者則增寒手指

昏瓜俱青全以古為胎水遍身虛腫浮。胎孕經血閉以養胎胎中挾水濕與血相搏濕氣流溢挾冷面目

引飲太過或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水血化為水所制宜五皮散散倍加白木。腹大異常亦堪憂

為君氣喘小便不利者防已散濕熱感者單山。施炒為末米飲調服或單山施炒

個月腹大異常高過心胸氣逆不安胎中蓄水所致若不早治必然其子手足軟短形。又有脚腫或出水

胞漿大盛故下流。妊婦七八個月以來兩脚浮腫頭面不腫乃胞漿水濕下流微腫者易產名曰微脚腫

水出者謂之子氣宜天仙藤散如脚腰腫者。腎著湯手

脚腫者用赤小豆桑白皮等分水煎服重者加商陸。

姙孕中風名子癰口因體薄受風寒發則口噤痰涎壅有時昏暈胎難安。體虛受風而傷太陽之經絡後

痰涎壅塞昏暈不識人時醒時作謂之鬼暈又曰子癰。又曰症甚則角弓反張小續命湯如重者異羊角

湯輕者四物湯加葛根牡丹皮秦艽細辛防風竹瀝痰加貝母陳皮茯苓甘草或古芍活散如中風寒犯

觸身體盡寒乍寒乍熱胎不安常苦頭痛寒痛連臍下寒時時小便白如米泔或青黃寒燥腸苦冷

痛目視瞤瞤者四君子湯去茯苓加當歸厚朴韭白薑煎入酒調服。不省人事者單荆芥散

子淋溺澀膀胱熱。姙孕飲食積熱膀胱以致小便閉澀又謂之子淋宜古芍歸湯加木通天門冬人參甘

六君子湯。甚則大小便閉結

或腎氣丸。甚則大小便閉結

茯苓等分。甚則大小便閉結

末米飲調服。甚則大小便閉結

六君子湯。甚則大小便閉結

腎氣丸。甚則大小便閉結

法將姙婦倒豎起其胎不墜其溺自出。產後有胎轉或遺尿赤白宜分別

將出者搗葱白於臍上灸之立效如欲服藥與胎前不同。

遺尿赤白宜分別。

等分為末每三錢酒調服。

此方為要

後即自能言。○腹中作鐘

死詳諸症濕痰風熱虛去邪保胎真口訣
孕婦脾土不運而生濕濕生痰痰生熱熱生風風生腫腫生熱熱生風風生腫腫生熱熱生風

去邪保胎二法並行子母俱安
 飲食禁忌亦須知
 雞肉合糯米食令子生疳
 鯉同雞子食令子生疳
 獐食兔肉令子唇缺
 羊

肝令子多厄食獸肉令子短醢兩照子同桑椹食令子倒生心與醢魚同田雞食令子瘡瘻雀肉同
醬食令子雀子血食蠅蟹橫生食蔓牙令子多指食水漿令絕產食雀肉同酒令子多淫無耻食茨菰
野食令子生雀子血食蠅蟹橫生食蔓牙令子多指食水漿令絕產食雀肉同酒令子多淫無耻食茨菰

子驚風而食雀腦令子愚雀目勿安服湯藥勿妄用針灸勿過飲酒漿勿舉重登高陟險心有大驚子

[illegible]

造化玄妙。法祗胎成兩月之內以斧置孕婦床下。懸矢於屋梁上云。矢斨戶罅子轉也。勿令人知此意。不信者。令侍難抱卵之時。以斧置案上。盡是雄雞故胎教常令見王公大人亦此意也更佩服黃一

時游胎殺雖不可泥然門戶床竈寢不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

十月氣足胎元壯健者忽然腹痛或只腰痛須臾產下何俟於催此易生天竺之妙喜服單益母膏免產後之患中間有體弱性急者腹痛或作或止各弄霜漿水淋滌來少

名試水雖臍腹俱痛發動露頂而腰不痛者切莫惶惶切禁洗母動手於臍上揣摩直待日子已到臍痛
神密破水已後并腰痛眼中如火方可坐草須待兜頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早

用力太過產母困倦及至滯滯乃用催生之藥凡難產皆孕後縱慾及臨盆全不運動又食生冷硬物
或疑石女子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產聞雜之人驚恐產婦恐則精法精法則上焦開

下氣還下焦胎而不行紫解散最妙
氣虛者瘦胎枳殼散氣弱者達生散
血安胎未破漿
如腹痛漿水已破而少痛雖痛而不密宜安胎飲或達生

產後血暈
產後血暈者古名歸陽下各等歸

黑神散氣弱者四君子湯下名四君黑神散橫逆側產每加麝一厘此時如舟在砂上須湯水而後滑利可通服此藥後外用葱二斤搗爛鋪於小腹上用急水灘頭砂一斗炒熱將布紙於葱上輕輕暑探

迅速要相當 催生有靈頂順正而生猶遲滯者惡外感風冷寒暑所阻夏月熱產則氣散血沸宜五苓散能下及服黑神散藥又及多者用清油白等分諸肝者汁調服或六分一散七錢加葵子五錢散為末每二錢熱服有產難日久水乾及觸犯惡氣心煩燥悶者兎腦丸腰痛心煩者用人參乳香各二錢長砂五分為末雞子清調薑汁化開冷服已上橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘橫者兎先露手原因腹痛兎身末雞子清調薑汁化開冷服已上橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘橫者兎先露手原因腹痛兎身

當今產母安眠仰臥洗母輕手徐徐推兎橫上漸漸以中指摩其肩推上又攀其耳而正之服歸黑神散固血生血須待兎身正且順臨門服阿膠滑石葵子為末溫酒入蜜攪勻服之然後方可用手送下

○逆者先露其足因母氣之關鍵不牢用力太早致見逆來當令產母安眠仰臥洗母徐徐推足入去分毫不得驚起服歸黑神散固血活血候兎自順若經久不生却令洗母輕緩用手推足令就一邊直上

令兎頭一邊漸漸順下多服歸黑神散等藥直待兎身坐產露臀高攀手坐者先露其臀當高處攀手巾一條令產母以手攀之服固血藥輕輕

轉門路正當然後用三退散調服方可用力送

屈足良久

聖膏貼住母頭頂中心 勝上即拭去內兼服歸參散大補之藥加升麻防風以提之未有不收者又有

久而為風吹乾不能收者用磨刀水少許火土溫過以潤其腸後用好磁石煎湯一盞服之其腸自收

碍產兎肩膊帶絆 碍者因兎身翻轉膊帶絆住其肩難露正頂而不能生當令產母仰臥洗母輕輕推兎

露額側來望腿尻 側者因兎方轉身被產母用力一逼以致兎頭偏墜左腿忽偏墜右腿或露左額角

手正其頭直向人門然後用力送下若是兎頭偏墜一畔多服歸黑神散令產母仰臥洗母徐徐推兎近上以

煖用手於穀道外畔輕按推兎頭上而正之服催生藥後即令產母用力送下此非洗母輕手巧妙不能

傷產驚然口翻 當產驚用催生峻約傷母氣血急用安胎過日而產有種一年二年至四年五年而產

包了燒存性入麝香一錢為末用秤銼燒紅淬酒調服一盞倉卒只以新汲水磨京墨服之墨水裹兎身

出或考歸益母草葵心皆能遂瘀以開產路○有坐草之時驚時口翻口噤吐沫者霹靂丹○有腰石女子交骨不開難產者龜壳或古考胎死母古黑非常外症指甲青黑服調不食口中極臭用平胃散加歸湯○通用無憂散不更散兎腦丸胎死母古黑非常外症指甲青黑服調不食口中極臭用平胃散加寔者大黃備急丸或單鹿角為末煮散煎湯調服昏沈脈微者養正丹濃煎乳香湯下一百廿丸血乾或有寒者四物湯下古桂香丸氣弱者催生五積散如麝一厘○雙胎一死一活者用蟹爪一盞甘草二兩

東流水十盞煎至三盞去渣入阿膠三兩分三次頓服能令生者安死者出
○通用霹靂丹奪命丸外用如聖膏貼足心仍服催生藥及通關散吹鼻即下
胞衣不下因血脹消瘀和
氣信古方皆因用力太早產下不能更用力送出胞衣停久被外冷所束則血滯脹胞而不出腹滿衝胸
輕信洗母用手宜內服半膝湯催生五積散或用真血竭為末酒調
服甚者奪命丹外用如聖膏貼脚心昏暈微甚八味黑神散黑龍丹

產後

產後必先須逐瘀正產體寒無病不葯可也但難產氣衰瘀血停留非葯不行古法一產後古芎歸湯加
後上床仰臥不得側臥宜立膝不可伸足高枕厚褥四壁無風時以人為從心括至臍下如此三日又不
可太睡熱宜頻喚醒時置醋炭或燒漆乾與舊漆器以防血迷血暈夏月房中不可太熱亦不可人多氣
感以致熱過則氣耗散而不能送血又不可太飽時與白粥飲之日漸加與一月之內針線勞役當時不
覺大害月後必成羸勞手腳及腰腿酸痛亦不可脫水洗浴強起離床太早以致外感身強角弓反張名
曰羸風如交合陰陽令下部終身傷飲食外感風寒然亦必先逐瘀補虛為主
瘀消然後堪補助後方
虛火感瘀血妄行而巳矣間有內傷飲食不進氣血不運亦必先逐瘀補虛為主
可入補如左脈弱加補血藥右脈弱加補氣藥如不逐瘀亦必先逐瘀補虛為主
服參芪甘炙停滯之劑有瘀血攻心即死者食肉太早亦然
瘀衝眩暈腹心疼去血過多眼花頭眩昏悶
湯入童便甚者加炒乾薑人參汗多加黃芪或八味黑神散單五靈脂散返魂丹
散白薇湯○臨產用力勞心氣虛而暈者用人參一兩蘇木五錢水煎入童便調服○氣弱血虛發厥倉公
上作暈者八物湯合二陳湯去白芍○火載血上昏暈或扶風邪者清魂散○被驚者抱胆丸○疎砂安神
丸○腹心疼痛全是瘀血八味黑神散四味散失笑散有寒熱者常歸散○虛寒心痛者桂心湯感寒
者理中湯○七情心痛者木香湯○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加義木○小腹痛者名兜枕痛單
五靈脂散或加桃仁醋糊為丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下○產門臍下虛痛者天溫經湯羊肉湯
○通用安金丹

血虛火動寒熱產後血虛發熱氣虛惡寒氣血俱虛發熱惡寒切不可發表○陰虛血
加味益母丸
煩短氣悶亂者人參當歸散蒸乳發熱者四物湯加參芪白朮天花粉發熱晝靜
夜劇者四物湯去芍藥量加柴胡氣血俱虛寒熱者補虛湯產後真不宜涼也
過度名曰羸勞其症虛羸乍起乍臥飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘧臂膊拘急宜十
全大補湯去芍加續斷牛膝鱉甲桑寄生桃仁為末猪腎一對去脂膜薑一片棗三枚水二盞煎至一盞
入前末二錢葱三十烏枚半個煎芥五穗同水
食滯脾家瀉且吐凡寒熱有腹痛者為瘀血如腹痛胸滿
煎空心服○身痛寒熱者當歸羊肉湯腰子湯
食滯脾家瀉且吐凡寒熱有腹痛者為瘀血如腹痛胸滿
嘔瀉必兼傷冷○食肉太早瘀滯者熱

內傷勞後漸虛產後
勞後

內傷勞後漸虛產後
勞後

內傷勞後漸虛產後
勞後

上海錦章圖書局印行

料五積散痛甚加義術嘔加砂仁瀉加羌附人參泄瀉不止臍腹痛者理中丸加肉豆蔻。挾寒腹痛腸鳴小便清白不渴者四君子湯合五苓散加肉豆蔻炒白芍。挾熱腸鳴便澀痛一陣瀉一陣口渴者四君子湯合四苓散加酒炒黃連及木通少許或益元散。挾濕身重腹脹者胃苓湯。嘔吐因敗血乘虛入胃脹滿者六君子湯加澤瀉藜蘆赤芍乾生薑腹脹氣不和者桔梗半夏陳皮等分薑煎服脾脈弦者三白湯加乾薑陳皮黃芩滑石甘草飲食成積痞者內炙散晚晚丸。霍亂吐瀉煩。外感寒熱無時停。補渴肢冷者理中湯加陳皮麥門冬姜煎厥冷者加附子渴者五苓散轉筋者木英二外感寒熱無時停。補

中帶表無過度產後外感離床太早或換衣襲風冷入於下部令人寒熱似瘧頭痛不歇血虛者古芎歸龍湯主之。如體感發熱惡寒及瘧痢者小柴胡湯合四君子湯加黃芪各三分服後不可以傷寒治法曾誤服熱藥過多熱症大見久而便閉者柴胡破瘀湯或四物湯加大黃芒硝暫服即調補之產後傷寒

寒身痛筋掣虛渴煩因產走動氣血升降失常留滯關節筋脈急引或手足拘攣遍身肢節走痛者起二卷身痛筋掣虛渴煩。痛散或餘血不盡流於遍身腰脚關節作痛者五積散去麻黃加人參香附薄荷

桃仁木香等分薑煎服。產後諸風痙攣筋掣無力者血風丸或煎服。煩渴氣虛者生脈散血虛者四物湯加天花粉麥門冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參二錢麥門冬一錢半煎服。自汗

花粉三錢甘草五分糯米薑漿煎服。虛煩者用人參麥門冬小麥棗汗多。大便偏閉。固者古歸芪湯汗

苓各一錢竹茹一彈丸半夏八分甘草五分薑煎服。心虛驚悸者亦宜。汗多。大便偏閉。固者古歸芪湯汗

甚加白朮防風牡蠣麥門冬熟地茯苓甘草或黃芪建中湯自汗兼腫滿者大調經散自汗肢體痠痛者

當歸羊肉湯。發熱盜汗者用猪腰子一枚糯米半合葱白二莖同煮熟取清汁一盞。八人參當歸各一

錢煎服。大便閉者古芎歸湯加防風枳殼甘草開泄者麻子仁丸或蘇麻粥蓋產後去血多則胃弱

胃則多汗多汗則大便閉皆血虛也。胃弱多血暈。小便不通腹脹滿者用鹽填臍中葱白一束切作一

指厚投鹽上以艾炷灸之熱氣入腹即通。煎服。不語敗血濕痰迷。產後敗血停蓄上干于心。氣閉逆舌

六一散加枳榔枳殼木通麻子仁藥于散。煎服。不語敗血濕痰迷。產後敗血停蓄上干于心。氣閉逆舌

產服湯藥過多胃滿使然者熟料五積散六君子湯。痰熱迷心。強不能言語者上珍散四味散。有臨

語者導痰湯或痰氣鬱滯閉目不語者用生白礬末一錢熱水調服。乍見鬼神非邪忤。產後乍見鬼神者

敗血攻心。邪淫於心。胡言亂語非寒風非見熱也。宜小調經散加龍腦少許或妙香散加當歸地黃黃連

○瘀血迷心妄言妄見及心虛謔妄昏暈者八物湯去芍藥加琥珀柏子仁遠志硃砂金銀煎服。其者黑

龍丹。產後血少怔忡睡臥不寧。又有惡露常淋。或因臍損無難。任。產後五淋白茅湯敗血淋瀝不

者十味溫胆湯或益神膏定志丸。又有惡露常淋。或因臍損無難。任。產後五淋白茅湯敗血淋瀝不

困者壯蠟散。有生產時被洗母誤損尿溺以致日夜淋瀝者四君。任是羣風并腫浮。產後中風名曰毒

子湯加黃芪陳皮桃仁用猪尿者青汁煎溫服。血虛者加芎歸。任是羣風并腫浮。產後中風名曰毒

手足痠痛及眩暈強直。心眼倒吐瀉欲死者單煎外散。古荆歸湯血虛勞碌太早風邪乘虛而入者小

續命湯羌活愈風湯如口噤反張涎潮多者更加散或大黑豆半升炒令烟起以酒二碗次之入磁器用

胎殺所在 正月在房床二月在窗戶三月在門堂四月在竈五月在身床六月在床倉七月在確磨八月在厠戶九月在門房十月在床房十一月在爐竈十二月在房床于丑日在中堂寅卯辰酉日在竈巳午日在門未申日在籬下戌亥日在房已上禁忌總要全不修理為高

房中遊神 癸巳甲午已未丙申丁酉日在房內北癸卯日在房內西甲辰乙巳丙午丁未日在房內東六戌六巳日在房中庚子辛丑壬寅日在房內南凡游神所在忌安床換帳致重物於床中必主

墮胎

生子所向方 子午卯酉日宜西南寅申巳亥日西北辰戌丑未日東南難產以蘇葉煎湯洗臍腹陰門

藏胎衣方 宜生氣方上正月子方二月丑方三月寅方四月辰方五月巳方六月午方七月未方八月申方九月酉方十月戌方十一月亥方十二月子方如生氣方有不便依歷日藏於奏書博士月德方上忌月空三殺太歲方上俗多置之河中者非

婦人終

小兒門

白露 秋分 寒露 霜降



觀形

察血氣色 肝青心赤脾黃肺白腎黑凡病面無黃色不治春白秋赤冬黃夏白者逆先分部位左頰青龍屬肝應春青為有餘右頰白虎屬肺應秋白為不足