

月光鱼

别名：新月鱼、阔尾鳉鱼、满月、月鱼
科别：卵胎生鳉科



1. **原产地**：墨西哥、危地马拉
2. **外形特征**：成年雄鱼体长4~5厘米，雌鱼可达5~6厘米。体短小而侧扁，头吻部尖小，尾部宽阔，胸腹部较圆厚。尾鳍外缘浅弧形；背鳍稍偏后与腹鳍、臀鳍对称。此鱼原种的体色为褐色或黑色，体侧有零星的蓝色斑点，因尾柄处有一块新月形黑斑纹而得名。月光鱼是属于杂交变异的品种，能与剑尾鱼杂交，经人工优选培育，至今已在体色和鳍色上产生许多不同的色彩，非常美丽。品种有红月光、蓝月光、黄月光、黑尾月光、金头蓝月光、三色月光等等。红月光全身通红；金头蓝月光通身湛蓝，唯头顶金黄色；黑尾红月光体腹红色而尾鳍黑色；三色月光体表银白色，并缀有红、黄、蓝等色斑。
3. **生活习性**：月鱼对环境和温度的适应能力较强，可以在18~28℃的水域中生存，最适生长温度为22~26℃，珍贵品种适宜水温为25~26℃。喜中性、弱碱性水质，氢离子浓度39.81~100nmol/L，pH值为7~7.4。
4. **饲养特点**：小巧玲珑的它们是极受欢迎的热带小型鱼的饲养品种，性情温驯、爱静，易于饲养，饲养水温以22~28℃最佳，最低水温不能低于16℃，pH值保持在7.4左右。月鱼不挑食，喂以活水蚤最佳，也可投喂一些切碎的菠菜叶或莴苣叶。发现月鱼游动无力迟缓时，可利用换水时加些盐，每10升水中加1~2小匙盐。为保持已稳定的新品种的品质，不宜与剑尾鱼混养，也不宜与原种返交，以免出现不理想的变异或返祖现象。
5. **繁殖特点**：月鱼5~6月龄性腺成熟。雌雄鱼具有同样美丽的体色，不易区分，主要区别在于臀

热带鱼品种 及饲养

鳍，雄鱼的臀鳍演化成输精器；雌鱼腹部膨大，近肛门处出现大黑斑时即为临产征兆。繁殖适宜水温25~26℃，水质为弱碱性的硬水，硬度9°dH左右。在繁殖季节，雄鱼紧随雌鱼，一有机会立即将突起的臀鳍插入雌鱼的生殖孔内，随即射精。雌鱼受精后，腹部逐渐膨大，临产前呈上下游动，并以吻端触及水族箱玻璃，此时将雌雄鱼分开，给雌鱼一个安静的环境，并放入一些水草，供仔鱼藏身。雌鱼一般每隔25~30天产仔一次，每次产仔鱼25~50尾。

蓝三星

别名：蓝星鱼、丝足鲈、三星万隆
科别：攀鲈科



1. **原产地**：泰国、马来西亚、印度尼西亚和我国西双版纳
2. **外形特征**：体长10~15厘米。卵圆形，侧扁，眼较大。背鳍短而高；腹鳍长丝体达尾鳍；臀鳍宽长，鳍基起自胸下至尾鳍基部。尾柄很短，且分叉。遍体蓝灰色，在躯干中部和尾柄处各有1块深蓝色圆斑，与黑眼珠形成等距离的3个斑点。背鳍、臀鳍和尾鳍淡黄色，并有白色珍珠状斑点。
3. **生活习性**：蓝星鱼对水质没有特殊要求，最适水

温 22~26℃，杂食性，鱼虫、丝蚓、孑孓和干饲料等都摄食。性格内向爱静，喜栖息于水草多的静水或缓流水中。

4. **饲养特点：**性温和而易于饲养，可与其它品种鱼混养。
5. **繁殖特点：**蓝星鱼 4~5 月龄性成熟。雄鱼在繁殖期间具婚姻色，体色变成浓艳的湛蓝色，背鳍、臀鳍末梢尖长；雌鱼体色略淡，腹部膨大。繁殖水温 26~28℃，水质中性。在 80 厘米×40 厘米×40 厘米的鱼缸水面漂浮几棵水草，将亲鱼放入，两天后雄鱼就会在水面上吐出一层泡沫筑浮巢，等浮巢达到一定幅度后，雄鱼开始追逐雌鱼，雌鱼游到浮巢下，雄鱼弯体拥抱雌鱼，几次拥抱翻滚后，完成产卵、排精。捞出雌鱼，留下雄鱼守巢护幼。受精卵在浮巢内经 24 小时孵出黑色仔鱼，3~4 天后仔鱼游动觅食。雌鱼每次产卵 500~1000 粒。

玻璃灯

别名：红光灯鱼，玻璃霓虹灯鱼

科别：脂鲤科

1. **原产地：**南美洲亚马逊河流域、圭亚那等地
2. **外形特征：**体长 4~5 厘米。长纺锤形，侧扁。



眼大，眼虹膜红色映蓝色光。背鳍高，三角形，位于背部中央；

臀鳍窄长；尾鳍叉形。体色浅黄铜色，背部较深，腹部浅，渐渐变白，体两侧各有 1 条从眼部延伸到尾柄的鲜红色线。背鳍上有红色花纹，其余各鳍均透明。在光线照射下，整条鱼呈现玻璃似的明亮和闪烁。

3. **生活习性：**玻璃灯鱼要求弱酸性软水，氢离子浓度 316.3~1000nmol/L，pH 值为 6~6.5，水温 22~26℃。喜食鱼虫、水蚯蚓等活饵料。性情温和活泼，喜群居。
4. **饲养特点：**饲养水温 22~26℃，喜清澈的软水。饵料投喂以小型水蚤为主，也可兼喂人工干饲料。箱中宜铺砂植草，并保证良好的光照条件。
5. **繁殖特点：**选择体长 4 厘米以上的作亲鱼。雄鱼

发情时体色较雌鱼艳丽明亮，后半身瘦长；雌鱼体色较淡，腹部膨大。水体可用雨水或蒸馏水，繁殖水温为 26~28℃，水质为微酸性的软水。在产卵箱中放置金丝草，亲鱼配对入箱后，由于雌雄鱼对繁殖环境的变化，不能马上适应，需稍等几个小时。如见雄鱼追逐雌鱼，双双缠绕旋转，说明即将产卵。历经 3~4 小时，完成产卵受精之后捞出亲鱼。受精卵经过 24 小时可孵出仔鱼。

七彩凤凰

别名：荷兰凤凰、凤凰鱼、马鞍翅

科别：慈鲷科

1. **原产地：**委内瑞拉西部、哥伦比亚境内

2. **外形特征**

证：鱼体长卵形，侧扁。体长 5~6 厘米。头吻部较钝圆。背鳍较宽长，尾鳍截形。体色基调浅蓝色，从头顶经眼至鳃盖下有一黑色长斑，体侧有 4~5 条宽窄相同的垂直色带，鳃盖和腹部淡黄色，吻部上方桔红色，下方金黄色，鳃盖上有蓝色花纹，各鳍为桔黄色，并有浅绿色色斑。成鱼色彩丰富，闪烁着金属光泽。是广受喜爱的南美短鲷的代表种，有“短鲷之王”美誉。

3. **生活习性：**喜好中性偏弱酸性水质，最适水温 25~29℃。爱藏身于水底草丛中，性情温和胆小。喜食小型活饵。

4. **饲养特点：**饲养较容易，水族箱中应种植水草，可与其他小型品种鱼混养。水族箱饲养过程中要少换水，让其在清洁的旧水中生活，多喂动物性饵料。

5. **繁殖特点：**亲鱼性成熟年龄为 5~8 个月，未成熟雌雄鱼很难辨别。成熟雄鱼体色艳丽，背鳍第一硬棘较长，个体较雌鱼大；雌鱼腹部膨大，呈玫瑰红色。繁殖水温 26~28℃，水质弱酸性软水。一般在鱼群中通常在一起的一对作亲鱼。在 50 厘米×30 厘米×35 厘米的鱼缸中置放一只较细巧的无底花盆，成熟的双亲会轮流清洗污物，并在花盆内产卵。如果出现相互追逐有一方不愿进入花盆的情况，说明未配对成功。由于亲鱼胆小，产卵环境应保持安静，光线要昏暗。产卵结束后，将雌鱼捞出，留下雄鱼专心护卵、受精卵经 48 小时孵出仔鱼，7 天后仔鱼游动觅食，再将雄鱼捞出。也可取出附卵花盆在孵化缸中进行人工孵化。雌鱼每次产卵 80~200 粒。

