

总编◎曹洪欣 刘保延

中国中医学 术语集成

HONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUJICHENG

中 药 学

①

Z H O N G Y A O X U E

主编◎施 毅



中医古籍出版社

中国中医药学术语集成

中 药 学

(下 册)

主 编	编 委	施 毅			
		(按姓氏笔画排列)			
		马贵宝	王琼芳	邓宏勇	许 吉
		吴桂芳	张 洋	汪文娟	沈 健
		沈星荣	沈毓萍	肖梅华	杨华元
		郑贤国	施 雯	施 毅	顾宏平
		董志颖			

中医古籍出版社

八 画

乳化剂 ru hua ji

【定义】是通过降低油、水之间的界面张力,并在乳滴周围有规律地定向排列成膜,阻止乳滴合并,以配制稳定的乳剂的物质。(中药药剂学)

乳毛紫金牛 ru mao zi jin niu

【拉丁名】*Ardisia Mamillata* Hance(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

乳汁管 ru zhi guan

【英文名】*Laticifer*(药用植物学)

【定义】是一种分泌乳汁的长管状单细胞,具分枝,有贮藏和运输营养物质的机能。(药用植物学)

乳白香青 ru bai xiang qing

【英文名】*Herb of Milkywhite Pearl*everlasting(中药数据库)

【拉丁名】*Anaphalis Lactea* Maxim.(中华本草); *Herba Anaphalidis Lactea*(中药数据库)

【异名】大白茅香(中华本草、常用中草药手册);大茅香艾(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物乳白香青的全草。(中华本草)

乳花 ru hua

【拉丁名】*Stactactite*(中药数据库)

【异名】石花(新修本草)

【定义】为钟乳液滴石上散溅如花者。(中华本草)

乳剂 ru ji

【定义】是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均相分散体系的液体药剂。(中药药剂学)

乳剂型注射剂 ru ji xing zhu she ji

【定义】是供注射用的乳剂。(中药药剂学)

乳剂型软膏 ru ji xing ruan gao

【英文名】*Creams*(中药药剂学)

【异名】乳膏(中药药剂学)

【定义】是指药物、药材细粉、药材提取物与乳剂型基质混合制成的半固体外用剂型。(中药药剂学)

乳茄 ru qie

【拉丁名】*Solanum Mammosum* L.(中华本草)

【定义】为茄科植物。(中华本草)

乳浊液型气雾剂 ru zhuo ye xing qi wu ji

【异名】泡沫型气雾剂(中药药剂学)

【定义】是指药物、抛射剂在乳化剂作用下,经乳化制成的乳浊液型气雾剂。(中药药剂学)

乳浊液型注射剂 ru zhuo ye xing zhu she ji

【定义】是药物制成的供注入体内的乳浊液。(中药药剂学)

乳浊液型液体药剂 ru zhuo ye xing ye ti yao ji

【定义】是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均相分散体系的液体药剂。(中药药剂学)

乳香 ru xiang

【英文名】*Frankincense*, *Olibanum*(中药数据库)

【异名】熏陆香(中药大辞典、别录);马尾香(中药大辞典、海药本草);乳头香(中药大辞典、海药本草);塌香(中药大辞典、梦溪笔谈);西香(中药大辞典、本草衍义);天泽香(中药大辞典、纲目);摩勒香(中药大辞典、纲目);络香(中药大辞典、纲目)

【定义】为橄榄科植物卡氏乳香树的胶树脂。具有调气活血、止痛、追毒的功效。临床用于治疗气血凝滞、心腹疼痛、痈疮肿毒等。(中药大辞典)

乳浆大戟 ru jiang da ji

【拉丁名】*Euphorbia Esula* L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物乳浆大戟。(中华本草)

乳源木莲 ru yuan mu lian

【拉丁名】*Manglitia Yuyuanensis* Law(中华本草)

【异名】狭叶木莲(中华本草、广东植物志)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

乳源木莲果 ru yuan mu lian guo

【拉丁名】*Fructus Manglietiae Yuganensis*(中药数据库)

【异名】木莲果(中华本草)

【定义】为木兰科植物乳源木莲的果实。(中华本草)

乳腺 ru xian

【英文名】*Mammary Cancer*(药用动物学)

【定义】是由汗腺发展而来,分泌乳汁以哺育幼儿,只见于哺乳动物。(药用动物学)

乳腐 ru fu

【拉丁名】*Milk*(中华本草)

【英文名】*Milk Products*(中药数据库)

【异名】乳饼(中华本草、本草蒙筌)

【定义】牛乳等乳类的加工制成品。(中华本草)

京大戟 jing da ji

【拉丁名】*Euphorbia Pekinensis* Rupr.(植)(中华本草)

【异名】邛钜(中华本草、尔雅);红芽大戟(中华本草、小儿药证直决);紫大戟(中华本草、三因方);下马仙(中华本草、纲目);大戟(中华本草、本经)

【定义】为大戟科植物大戟的干燥根。具有泻水逐饮的功效。临床用于治疗水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚等。(中华本草)

京梨猕猴桃 jing li mi hou tao

【拉丁名】*Actinidia Callosa* Lindl. var. *Henryi* Maxim.(中华本草)

【异名】秤花藤(中华本草、云南植物志)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

佩兰 pei lan

【英文名】Fortune Eupatorium Herb; Herb of Fortune Eupatorium (中药数据库)

【拉丁名】Herba Eupatorii (中药数据库); Eupatorium Fortunei Turcz. (中华本草)

【异名】石瓣(中华本草、广东中药); 醒头草(中华本草、得配本草); 香草(中华本草、纲目); 女兰(中华本草、纲目); 省头草(中华本草、唐瑶经验方); 千金草(中华本草、续古今考); 孩儿菊(中华本草、续古今考); 香水兰(中华本草、开宝本草); 燕尾香(中华本草、开宝本草); 兰泽(中华本草、本草拾遗); 蔺(中华本草、诗经); 针尾风(中华本草、广东中药); 大泽兰(中华本草、雷公炮炙论); 都梁香(中华本草、药录); 水香(中华本草、本经); 兰草(中华本草、本经); 兰(中华本草、易·系辞上)

【定义】为菊科植物佩兰的地上部分。(中华本草)

使君子 shi jun zi

【英文名】Fruit of Rangooncreeper (中药数据库); Rangooncreeper Fruit (中药数据库)

【拉丁名】Quisqualis Indica L. (中华本草); Fructus Quisqualis (中药数据库)

【异名】病柑子(中华本草、中药材手册); 冬均子(中华本草、中药材手册); 索子果(中华本草、南宁市药物志); 五棱子(中华本草、药材资料汇编); 史君子(中华本草、药谱); 留求子(中华本草、南方草木状); 君子仁(中华本草)

【定义】为使君子科植物使君子的成熟果实。(中华本草)

使君子叶 shi jun zi ye

【英文名】Leaf of Rangooncreeper (中药数据库)

【拉丁名】Folium Quisqualis (中药数据库)

【异名】水君叶(中华本草、生草药性备要)

【定义】使君子科植物使君子的叶。(中华本草)

使君子科 shi jun zi ke

【拉丁名】Combretaceae (拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】乔木、灌木或稀木质藤本, 有些具刺。(中国植物志)

使君子根 shi jun zi gen

【英文名】Root of Rangooncreeper (中药数据库)

【拉丁名】Radix Quisqualis (中药数据库)

【异名】史君根(中华本草、分类草药性)

【定义】使君子科植物使君子的根。(中华本草)

供试品制备 gong shi pin zhi bei

【定义】是将中药制剂经提取分离后制成较纯净的供试品溶液, 以便进行分析测定的方法。(中药制剂分析)

供热干燥 gong re gan zao

【异名】干燥(中药制药工程原理与设备); 固体干燥(中药制药工程原理与设备)

【定义】凡是利用热源方法除去固体物料中湿分的单元操作。(中药制药工程原理与设备)

侧子 ce zi

【英文名】Branch Monkshood Daughter (中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Carmichaeli Debx. (植)(中药数据库)

【异名】薊子(中华本草、广韵); 薊(中华本草、说文); 即子(中华本草、本经)

【定义】为毛茛科植物乌头子根(附子)之小者, 或生于附子旁的小颗子根。(中华本草)

侧生分生组织 ce sheng fen sheng zu zhi

【英文名】Lateral Meristem (药用植物学)

【定义】是存在于裸子植物与双子叶植物的根和茎内, 包括形成层和木栓形成层, 分布于植物体周围的组织。(药用植物学)

侧耳 ce er

【英文名】All-grass of Oyster Mushroom (中药数据库)

【拉丁名】Pleurotus Ostreatus (Jacq. ex Franch.) Quel. (中药数据库)

【异名】杂蘑(中华本草); 蠔菌(中华本草); 北风菌(中华本草); 柳耳(中华本草); 柳蕈(中华本草)

【定义】为侧耳科植物侧耳的全草。(中华本草)

侧纹岩松鼠 ce wen yan song shu

【英文名】Large Rock Sciurus (中药数据库)

【拉丁名】Sciurotamias Forresti (Thomas) (中华本草)

【异名】弗氏岩松鼠(中华本草、中国药用动物志); 白喉岩松鼠(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为松鼠科动物侧纹岩松鼠的骨。(中华本草)

侧柏 ce bai

【拉丁名】Biota Orientalis (L.) Endl. (中华本草)

【定义】为柏科植物侧柏。(中华本草)

侧柏叶 ce bai ye

【拉丁名】Canumen Platycladi (中药数据库)

【异名】侧柏(中药大辞典、药性论); 柏(中药大辞典、诗经); 扁柏(中药大辞典、滇南本草); 崖柏(中药大辞典); 香柏(中药大辞典); 黄心柏(中药大辞典); 扁松(中药大辞典); 云片柏(中药大辞典); 松蟠(中药大辞典); 片松(中药大辞典); 喜柏(中药大辞典)

【定义】为柏科植物侧柏的嫩枝与叶。具有凉血止血、生发乌发的功效。临床用于治疗吐血、衄血、尿血、血痢等。(中药大辞典)

侧脉 ce mai

【定义】是指主脉的分枝。(药用植物学)

侧根 ce gen

【英文名】Lateral Root (药用植物学)

【定义】是在主根的侧面生长出来的分枝。(药用植物学)

侧根形成 ce gen xing cheng

【定义】是在根的初生生长过程中,不断产生的,起源于中柱鞘。当侧根形成时,中柱鞘相应部位的细胞发生变化,细胞质变浓,液泡变小,重新恢复分裂能力。侧根的木质部和韧皮部与其母根的木质部和韧皮部直接相连,形成一个连续的系统。(药用植物学)

侧膜胎座 ce mo tai zuo

【英文名】Parietal Placenta(药用植物学)

【定义】是由合心皮雌蕊形成,子房1室,胚珠沿相邻二心皮的腹缝线着生。(药用植物学)

兔儿风 tu er feng

【英文名】Herb of Glabrous Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaeae Glabrae(中药数据库)

【异名】石风丹(中华本草);心肺草(中华本草);水上红(中华本草、万县中草药);大血筋草(中华本草、万县中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物光叶兔儿风的全草。(中华本草)

兔儿伞 tu er san

【英文名】Aconiteleaf Syneilesis Herba(中药数据库)

【拉丁名】Herba Syneilesis Aconitifoliae(中药数据库); Syneilesis Aconitifolia Maxim.(中华本草)

【异名】雪里伞(中华本草、江西草药);雨伞草(中华本草、浙江民间常用草药);铁凉伞(中华本草、浙江民间常用草药);破阳伞(中华本草、浙江民间常用草药);伞草(中华本草、陕西中草药);贴骨伞(中华本草、陕西中草药);龙头七(中华本草、陕西草药);兔打伞(中华本草、江西草药);帽头菜(中华本草、常用中草药手册);雨伞菜(中华本草、常用中草药手册);伞把草(中华本草、湖南药物志);南天扇(中华本草、湖南药物志);一把伞(中华本草、贵州民间药物);七里麻(中华本草、南京民间药草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物兔儿伞的根或全草。(中华本草)

兔子毛 tu zi mao

【英文名】Siberia Tansy(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物西伯利亚艾菊的全草。(中药数据库)

兔毛蒿 tu mao hao

【拉丁名】Filifolium Sibiricum(L.) Kitam. [Tanacetum Sibiricum L.](植)(中药数据库)

【异名】荆草(中华本草、全国中草药汇编);惊草(中华本草、全国中草药汇编);疔毒草(中华本草、全国中草药汇编);兔子毛(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为菊科植物线叶菊的全草。(中华本草)

兔仔菜 tu zai cai

【拉丁名】Lactuca Versicolor (Fisch.) Sch. Bip.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

兔头骨 tu tou gu

【英文名】Hare Head-bone; Rabbit Head-bone(中药数据库)

【拉丁名】Cranium Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的头骨。(中华本草)

兔打伞 tu da san

【英文名】Root or All-grass of Japanese Goldenray(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Ligulariae Jaonicae(中药数据库)

【异名】猴巴掌(中华本草、全国中草药汇编);望江南(中华本草、植物名实图考)

【定义】为菊科植物大头橐吾的郭及全草。(中华本草)

兔皮毛 tu pi mao

【英文名】Hare Skin or Fur; Rabbit Skin or Fur(中药数据库)

【拉丁名】Corii seu Pilus Leporis(中药数据库)

【异名】家兔(中华本草);蒙古兔(中华本草)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的皮毛。(中华本草)

兔耳子草 tu er zi cao

【英文名】All-grass of Longleaf Edelweiss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Leontopodii Longifolii(中药数据库)

【定义】为菊科植物长叶火绒草的全草。(中华本草)

兔耳风 tu er feng

【英文名】Herb of Glabrous Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaeae Glabrae(汉拉英中草药名称)

【异名】石风丹(中华本草);心肺草(中华本草);水上红(中华本草、万县中草药);大血筋草(中华本草、万县中草药)

【定义】为菊科植物光叶兔耳风的全草。(中华本草)

兔耳草 tu er cao

【拉丁名】Lagotis Brevituba Maxim.(植)(中华本草)

【异名】洪林(中国藏药)

【定义】为玄参科植物短筒兔耳草(短管兔耳草)及同属多种植物的全草。(中华本草)

兔肉 tu rou

【英文名】Hare as Food; Rabbit as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Leporis(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔、东北兔、高原兔、华南兔、

家兔等的肉。(中华本草)

兔血 tu xue

【英文名】Hare Blood; Rabbit Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的血。(中华本草)

兔尾草 tu wei cao

【拉丁名】Uraria Lagopodioides (L.) Desv. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物兔尾草。(中华本草)

兔形目 tu xing mu

【英文名】Lagomorpha(药用动物学)

【异名】重齿类(药用动物学)

【定义】上颌具有两对前后着生的门齿,后一对很小,隐于前一对门齿的后方。无犬齿。上唇具唇裂。前足五趾,后足四趾。尾短。(药用动物学)

兔肝 tu gan

【英文名】Hare Liver; Rabbit Liver(中药数据库)

【拉丁名】Hepar Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的肝。(中华本草)

兔骨 tu gu

【英文名】Hare Bone; Rabbit Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的骨骼。(中华本草)

兔脑 tu nao

【英文名】Hare Brains; Rabbit Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的脑。(中华本草)

兖州卷柏 yan zhou juan bai

【英文名】Involute Spikemoss Herb; Herb of Involute Spikemoss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Selaginellae Involventis(中药数据库); Selaginella Involvens(Sw.) Spring(中华本草)

【异名】鹿茸草(中华本草);干蕨基(中华本草、贵州中草药名录);红蕨仔草(中华本草、福建药物志);墙柏(中华本草、福建药物志);黄河婆草(中华本草、福建药物志);蜈蚣草(中华本草、常用中草药手册);小柏(中华本草、湖南药物志);孔雀毛(中华本草、江西民间草药);千年柏(中华本草、江西民间草药);金花草(中华本草、江西民间草药);石卷柏(中华本草、陆川本草);扇卷柏(中华本草);飞扬蕨(中华本草);金扁柏(中华本草、福建民间草药);松柏草(中华本草、湖南药物志);细叶金鸡尾(中华本草、湖南药物志);地侧柏(中华本草、湖南药物志);

虎毛草(湖南药物志);山扁柏(中华本草、福建药物志);卷筋草(中华本草);柏叶草(中华本草、湖南药物志);凤凰衣(中华本草);不黄草(中华本草、福建药物志)

【定义】为卷柏科植物兖州卷柏的全草。(中华本草)

其他中药制剂质量分析 qi ta zhong yao zhi ji zhi liang fen xi

【定义】是根据中药制剂的不同剂型(主要指胶囊、胶丸、胶剂、微型胶囊、气雾剂与喷雾剂等),选择合适的分离、净化方法,消除其他成分或杂质的干扰,从而对中药制剂进行科学的分析,以保证其质量。(中药制剂分析)

其他类型成分分析 qi ta lei xing cheng fen fen xi

【定义】是对含有机酸类、环烯醚萜类、香豆素类、单萜及二萜类、多糖成分的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。(中药制剂分析)

其他类药材去毛 qi ta lei yao cai qu mao

【定义】指除根茎类、叶类、果实类药材外,其他的生有绒毛的药材去除其绒毛的方法。(中药炮制学)

具翅香豌豆 ju chi xiang wan dou

【英文名】Komarov Vetchling(中药数据库)

【拉丁名】Lathyrus Komarovii Ohwi(中华本草)

【异名】三脉山黧豆(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药豆科植物的种子。(中华本草)

具缘纹孔 ju yuan wen kong

【英文名】Bordered Pit(药用植物学)

【定义】是纹孔周围的次生壁,向细胞腔内呈架拱状隆起,形成纹孔的缘部,结果呈一拱形,中央有一个小的开口的纹孔。(药用植物学)

具缘纹孔导管 ju yuan wen kong dao guan

【定义】是指导管壁未增厚部分为具缘纹孔的孔纹导管。(药用植物学)

净化方法 jing hua fang fa

【定义】是对提取液作进一步的净化分离,除去对测定有干扰的杂质,而又不损失被测定成分的方法。(中药制剂分析)

净花菰腺忍冬 jing hua gu xian ren dong

【英文名】Hypoglauca Hypoglauca(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Hypoglauca Miq. Subsp. Nudiflora Hsu H. J. Wang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物净花菰腺忍冬的花。(中华本草)

净制 jing zhi

【定义】指在切制、炮炙或调配、制剂前,选取规定的药用部分,除去非药用部位、杂质及霉变品、虫蛀品、

灰屑等,使其达到药用纯度标准的方法。(中药炮制学)

净制与临床疗效 jing zhi yu lin chuang liao xiao

【定义】指通过净制满足临床用药不同要求。(中药炮制学)

净选加工 jing xuan jia gong

【定义】指对中药进行洁净、挑选的加工方法。(中药炮制学)

净麸炒法 jing fu chao fa

【异名】清麸炒法(中药炮制学)

【定义】是将净制或切制后的药物用未制的麦麸熏炒的方法。(中药炮制学)

刮筋板 gua jin ban

【英文名】Seedling of Mapleleaf Excoecaria(中药数据库)

【拉丁名】Plantula Excoecariae Acerifoliae(中药数据库)

【异名】云南土沉香(中华本草、中国树木分类学);刮金槭(中华本草、天宝本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物草沉香의幼嫩全株。(中华本草)

到老嫩 dao lao nen

【拉丁名】Pilea Martinii(Levl.) Hand. Mazz. (植)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物大叶冷水花的全草。(中华本草)

制丸机 zhi wan ji

【定义】是把丸条机挤出的丸条经电加热器加热使其光圆,随后丸条落在输送带上由刀口切刀切成适当长短的丸条段,到达两槽滚筒将丸条切成若干小段,在三个滚筒的作用下,把小段滚成光圆的药丸的设备。(中药制药工程原理与设备)

制大豆黄卷 zhi da dou huang juan

【定义】是经煮法处理后的大豆黄卷。(中药炮制学)

制川乌 zhi chuan wu

【定义】是经煮法处理后的川乌。(中药炮制学)

制天南星 zhi tian nan xing

【定义】是经生姜与白矾复制法处理后的天南星。(中药炮制学)

制片方法 zhi pian fang fa

【定义】是根据中药制剂的不同剂型所采用的不同方法,来进行装片显微观察。(中药制剂分析)

制白附子 zhi bai fu zi

【定义】是经复制法处理后的白附子。(中药炮制学)

制成干燥固体 zhi cheng gan zao gu ti

【定义】是通过将极易水解的药物制成干燥的固体制剂的方法延缓水解,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

制成包合物方法 zhi cheng bao he wu fang fa

【定义】是采用 β -环糊精包合技术防止药物因受环境

中的氧气、湿气、光线的影响而降解,或因挥发性药物挥发而造成损失的方法。(中药药剂学)

制成固体剂型方法 zhi cheng gu ti ji xing fang fa

【定义】是将某些在水溶液中不稳定的药物制成固体制剂,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

制成微囊方法 zhi cheng wei nang fang fa

【定义】是采用微囊化防止药物因受环境中的氧气、湿气、光线的影响而降解,或因挥发性药物挥发而造成损失的方法。(中药药剂学)

制芒硝 zhi mang xiao

【定义】是经降温结晶法处理后的芒硝。(中药炮制学)

制何首乌 zhi he shou wu

【英文名】Processed Tuber Fleeceflower Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygoni Multiflori Preparata(中药数据库)

【定义】本品为何首乌的炮制加工品。(中华本草)

制吴茱萸 zhi wu zhu yu

【定义】是经煮法处理后的吴茱萸。(中药炮制学)

制远志 zhi yuan zhi

【定义】是经煮法处理后的远志。(中药炮制学)

制其形 zhi qi xing

【定义】指改变药物的外观形态和分开药用部位。(中药炮制学)

制其味 zhi qi wei

【定义】指通过炮制,调整中药的五味或矫正劣味。(中药炮制学)

制其性 zhi qi xing

【定义】指通过炮制改变药物的性能。(中药炮制学)

制其质 zhi qi zhi

【定义】指通过炮制,改变药物的性质或质地。(中药炮制学)

制剂 zhi ji

【定义】是根据《中国药典》、《卫生部药品标准》、《制剂规范》等标准规定的处方,将药物加工制成具有一定规格,可直接用于临床的药品。(中药药剂学)

制剂工艺因素 zhi ji gong yi yin su

【定义】是指不同的制剂因制备工艺的不同引起药物稳定性变化。(中药药剂学)

制剂学 zhi ji xue

【定义】是研究制剂的生产工艺和理论的学科。(中药药剂学)

制剂通则检查 zhi ji tong ze jian cha

【定义】是根据剂型的不同,测定不同的检查项目及内容,以评价中药制剂质量的方法。(中药制剂分析)

制备荧光衍生物 zhi bei ying guang yan sheng wu

【定义】是在中药制剂检查中选择合适的试剂,使没有荧光或荧光很弱的物质生成具有特异荧光的衍生物,从而扩大荧光分析范围的方法。(中药制剂分析)

制备稳定衍生物方法 zhi bei wen ding yan sheng wu fang fa

【定义】是通过对中药不稳定的成分进行结构改造,制成稳定的衍生物,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

制松香 zhi song xiang

【定义】是经复制法处理后的松香。(中药炮制学)

制绒 zhi rong

【定义】指某些纤维性药材经捶打、推碾成绒絮状,以缓和药性或便于应用的方法。(中药炮制学)

制草乌 zhi cao wu

【定义】是经煮法处理后的草乌。(中药炮制学)

制药卫生 zhi yao wei sheng

【定义】是为了确保药品质量,在药品生产过程中,根据药物和剂型的种类、卫生标准的具体要求,有针对性地采取的卫生措施与方法。(中药药剂学)

制药工艺 zhi yao gong yi

【英文名】Pharmaceutical Technology(中药制药工程原理与设备)

【定义】用现代化的工艺方法对中药材进行加工处理制造的过程。(中药制药工程原理与设备)

制药工程原理与设备 zhi yao gong cheng yuan li yu she bei

【定义】是运用化学工程学的原理与方法,研究和探讨中药制药过程中的原料、半成品和成品的加工过程和方法的一门学科。(中药制药工程原理与设备)

制硫磺 zhi liu huang

【定义】是经煮法处理后的硫磺。(中药炮制学)

制紫河车 zhi zi he che

【定义】是经花椒与黄酒复制法处理后的紫河车。(中药炮制学)

制酸药 zhi suan yao

【英文名】Antacid Drugs-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指用于中和胃酸的药物。(中医学)

制霜制品 zhi shuang zhi pin

【定义】是经制霜法处理后的药材。(中药炮制学)

制霜法 zhi shuang fa

【定义】是药物经过去油制成松散粉末或析出细小结晶或升华、煎熬成粉渣的方法。(中药炮制学)

制藤黄 zhi teng huang

【定义】是经煮法处理后的藤黄。(中药炮制学)

刷 shua

【定义】是用毛刷或尼龙刷,刷去药物外表面灰尘、泥沙、绒毛或其他附着物的方法。(中药炮制学)

刷把草 shua ba cao

【英文名】Herb of Himalayan Willow Weed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Epilobii Himalayensis(中药数据库)

【异名】五风自动草(中华本草、云南中草药);山柳叶草(中华本草、曲靖专区中草药);怀胎草(中华本草、曲靖专区中草药)

【定义】为柳叶菜科植物滇藏柳叶菜的全草。(中华本草)

刷把草根 shua ba cao gen

【英文名】Epeilbium Roylea-num Hausskn.(中药数据库)

【拉丁名】Epilobium Roylea-num Hausskn.(植)(中药数据库)

【异名】怀胎草根(中华本草、曲靖专区中草药)

【定义】为柳叶菜科植物滇藏柳叶菜的根。(中华本草)

刺人参 ci ren shen

【英文名】Root of Tall Oplopanax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Oplopanacis Elati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物东北刺人参的根。(中华本草)

刺儿松 ci er song

【拉丁名】Picea Wilsonii Mast.(中华本草)

【定义】为云杉属杉科植物。(中华本草)

刺儿菜 ci er cai

【拉丁名】Cirsium Setosum (Willd.) MB(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

刺三甲 ci san jia

【英文名】Root of Trifoliate Acanthopanax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Acanthopanax Trifoliati(中药数据库)

【异名】倒钩刺(中华本草);苦刺(中华本草);白芨花(中华本草);鹅掌笏(中华本草);苦芡(中华本草、岭南采药录);白芨(中华本草、生草药性备要);土三加皮(中华本草、广西药植名录);三甲皮(中华本草、四川中药志);苦刺头(中华本草、贵州民间药物);刺三加(中华本草、贵州民间药物);苦芡(中华本草、岭南采药录);山五甲(中华本草、草木便方);白芨根(中华本草、草木便方);白芨根(中华本草、生草药性备要);五加皮(中华本草、滇南本草);风党芡(中华本草、岭南采药);三加皮(广西药植名录、中华本草、广西药植名录);三花眉(中华本草);红芦刺(中华本草);三股风(中华本草);五虎刺(中华本草);山花莲(中华本草);刺藤乌(中华本草);

白刺藤(中华本草);三叶五加(中华本草);三爪风(中华本草);臭刺(中华本草);三叶刺(中华本草)
【定义】为五加科植物白芡双子叶植物药的根或根皮。(中华本草)

刺子莞 ci zi guan

【英文名】Herb of Red Beakrush(中药数据库)
【拉丁名】Rhynchospora Rubra (Lour.) Makino(中华本草);Herba Rhynchosporae Rubrae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物刺子莞的全草。(中华本草)

刺山茶果 ci shan cha guo

【拉丁名】Maytenus Variabilis (Loes.) C. Y. Cheng(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物刺茶的果实。(中华本草)

刺山茶根皮 ci shan cha gen pi

【拉丁名】Maytenus Variabilis (Loes.) C. Y. Cheng(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物刺茶的根皮。(中华本草)

刺五加 ci wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

刺天茄 ci tian qie

【英文名】Fruit of Khasi Nightshade(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Solani Khasiani(中药数据库)
【异名】苦天茄(中华本草、云南中草药);苦颠茄(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药茄科植物刺茄子的果实。(中华本草)

刺天茄叶 ci tian qie ye

【英文名】Root of Wilson Euonymus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Euonymi Wilsonii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物刺茄子的叶。(中华本草)

刺叶耳蕨 ci ye er jue

【拉丁名】Polystichum Acanthophyllum (Franch.) Christ(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

刺叶苏铁 ci ye su tie

【拉丁名】Cycas Rumphii Miq. (植)(中药数据库)
【定义】为苏铁科植物华南苏铁的根或种子。(中华本草)

刺叶槲木 ci ye song mu

【英文名】Bark of Spinyleaf Aralia(中药数据库)
【拉丁名】Aralia Spinifolia Merr. (中华本草);Cortex Araliae Spinifoliae(中药数据库)
【异名】雷公木(中华本草);鹰不扒(中华本草);鸡云

木(中华本草);鸟不企(中华本草);长刺槲木(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药五加科植物刺叶槲木。(中华本草)

刺本通 ci ben tong

【拉丁名】Erythrina Arborescens Roxb. (中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺本通。(中华本草)

刺瓜 ci gua

【英文名】Herb of Corymbose Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Cynanchum Corymbosum Wight(中华本草);Herba Cynanchi Corymbosi(中药数据库)

【异名】乳汁藤(中华本草、广西药用植物名录);小刺瓜(中华本草、广西药用植物名录);山苦瓜(中华本草、福建药物志);乳蚕(中华本草、全国中草药汇编);野苦瓜(中华本草、全国中草药汇编);土人参(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物刺瓜的全草或果实。(中华本草)

刺龙牙 ci long ya

【拉丁名】Cortex Araliae Elatae(中药数据库)
【异名】虎阳刺(中华本草、常用中草药手册);鹊不踏(中华本草、黑龙江中药);刺老牙(中华本草、黑龙江中药);刺老鸦(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为五加科植物辽东槲木的根皮和树皮。(中华本草)

刺异叶花椒 ci yi ye hua jiao

【拉丁名】Zanthoxylum Dimorphophyllum Hemsl. var. Spinifolium Rehd. et Wils. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

刺竹叶 ci zhu ye

【拉丁名】Bambusa Sinospinosa Mc Clure(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物车筒竹的叶。(中华本草)

刺竹茹 ci zhu ru

【拉丁名】Bambusa Sinospinosa Mc Clure(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物车筒竹的茎秆除去外皮后刮下的中间层。(中华本草)

刺竹笋 ci zhu sun

【英文名】Shoot of Chinese Thorny Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Germinatus Bambusae Sinospinosae(中药数据库)

【异名】笋竹(中华本草、竹谱详录);簕竹(中华本草、笋谱);笋竹笋(中华本草、岭南采药录);簕楠竹(中华本草);水笋竹(中华本草);大笋竹(中华本草);

藤竹(中华本草);车筒竹(中华本草);大竹(中华本草);车角竹(中华本草);筍竹(中华本草、竹谱详录);楠竹(中华本草、竹谱详录);答黎竹(中华本草、竹谱详录)

【定义】为禾本科植物籼竹的苗。(中华本草)

刺老鸦 ci lao ya

【英文名】Root-bark of Japanese Aralia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Araliae Elatae Radicis(中药数据库)

【异名】虎阳刺(中华本草);龙牙櫟木(中华本草);刺龙牙(中华本草);辽东櫟木(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物辽东櫟木的根皮或树皮。(中华本草)

刺芋 ci yu

【拉丁名】Lasia Spinosa (L.) Thwait. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

刺血红 ci xue hong

【英文名】All Grass of Flower Barleria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Barleriae Prioniitis(中药数据库)

【异名】血路草(中华本草、常用中草药手册);七星剑(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为爵床科植物花叶假杜鹃的全草。(中华本草)

刺李 ci li

【英文名】Fruit of Hedge Gooseberry(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Ribis Alpestris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大刺茶藨的果实。(中华本草)

刺沙蓬 ci sha peng

【英文名】Herb of Russianthistle(中药数据库)

【拉丁名】Salsola Ruthenica Iljin(中华本草);Herba Salsolae Ruthenicae(中药数据库)

【异名】风滚草(中华本草、吉林中草药);扎蓬棵(中华本草、中国药用植物图鉴);大翅猪毛菜(中华本草、东北植物药图志);猪毛菜(中华本草、东北植物药图志)

【定义】为藜科植物刺沙蓬的全草。(中华本草)

刺状叶 ci zhuang ye

【英文名】Acicular Leaf(药用植物学)

【定义】是由叶片或托叶变态成坚硬的刺状。依刺的来源及生长的位置不同,可与刺状茎和皮刺相区别。(药用植物学)

刺状茎 ci zhuang jing

【英文名】Shoot Thorn(药用植物学)

【异名】枝刺(药用植物学);棘刺(药用植物学)

【定义】是茎变为刺状,常粗短坚硬不分枝,生于叶腋,可与叶刺相区别的茎。(药用植物学)

刺芫荽 ci yuan sui

【拉丁名】Eryngium Foetidum L. (中华本草)

【异名】臭刺芹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

刺芹 ci qin

【拉丁名】Evyngium Foetidum L. (中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

刺苋 ci xian

【拉丁名】Amaranthus Spinosa L. (中华本草)

【定义】为苋科植物。(中华本草)

刺参 ci shen

【英文名】Largeflower Morina; Root of Largeflower Morina(中药数据库)

【拉丁名】Radix Morinae Bulleyanae(中药数据库)

【定义】为川续断科植物细叶摩苓草的根。(中华本草)

刺参科 ci shen ke

【定义】属棘皮动物门。为成体长圆筒状,长约20厘米,具盾形触手20个,背面有4~6行大小不等的锥形肉刺和疣足体色变化较大,通常呈栗褐色的棘皮动物。

刺松藻 ci song zao

【拉丁名】Codium Fragile (Sur.) Har. (中华本草)

【定义】为藻类植物药松藻科植物。(中华本草)

刺果卫矛 ci guo wei mao

【英文名】Root of Wilson Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Euonymi Wilsonii(中药数据库)

【异名】扣子花(中华本草);岩风(中华本草)

【定义】为卫矛科植物长刺卫矛的根。(中华本草)

刺果甘草 ci guo gan cao

【拉丁名】Glycyrrhizapallidiflora Maxim. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刺果甘草。(中华本草)

刺果苏木 ci guo su mu

【英文名】Leaf of Nickernut Caesalpinia(中药数据库)

【拉丁名】Caesalpinia Crista L. (中华本草);Folium Caesalpiniae Cristae(中药数据库)

【异名】杧果钉(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刺果苏木的叶。(中华本草)

刺果峨参 ci guo e shen

【英文名】Root of Spinefruit Beakchervil(中药数据库); Root of Spinefruit Chervil(中药数据库)

【拉丁名】Anthriscus Nemorosa (M. Bieb.) Spreng-Anthriscus Aemula (Woron.) Schischk. (中华本草); Radix Anthrisci Nemorosae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物刺果峨参的根和叶。(中华本草)

刺玫瑰花 ci mei hua

【英文名】Flower of Dahurian Rosa(中药数据库)

【拉丁名】*Flos Rosae Davuricae*(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物山刺玫的花。(中华本草)

刺玫果 ci mei guo

【英文名】*Dahurian Rose Fruit; Fruit of Dahurian Rose*
(中药数据库)

【拉丁名】*Fructus Rosae Davuricae*(中华本草)

【异名】刺木果(中华本草、中草药学);刺莓果(中华本草、黑龙江中药)

【定义】为蔷薇科植物山刺玫、光叶山刺玫的果实。(中华本草)

刺苞南蛇藤 ci bao nan she teng

【拉丁名】*Celastrus Flagellaris* Rupr. (植)(中药数据库)

【异名】爬山虎(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为卫矛科植物刺南蛇藤的根、茎。(中华本草)

刺苞南蛇藤叶 ci bao nan she teng ye

【拉丁名】*Celastrus Flagellaris* Rupr. (植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物刺南蛇藤的叶。(中华本草)

刺苞南蛇藤果 ci bao nan she teng guo

【拉丁名】*Celastrus Flagellaris* Rupr. (植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物刺南蛇藤的果实。(中华本草)

刺苞斑鸠菊 ci bao ban jiu ju

【拉丁名】*Vernonia Squarrosa* (D. Don) Less. (中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

刺茄 ci qie

【拉丁名】*Solanum Surattense* Burm. f. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

刺茄子 ci qie zi

【拉丁名】*Solanum Khasianum* C. B. Clarke(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

刺茎楸木 ci jing song mu

【拉丁名】*Aralia Echinocaulis* Hand. -Mazz. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

刺郎果 ci lang guo

【拉丁名】*Carissa Spinarum* L. (植)(中华本草)

【异名】三颗针(中华本草、云南药用植物名录);刺檀香(中华本草、云南药用植物名录);锈花针(中华本草、云南药用植物名录);老虎刺(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为夹竹桃科植物假虎刺的根。(中华本草)

刺鱼骨木 ci yu gu mu

【拉丁名】*Canthium Horridum* Bl. (中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

刺齿凤尾蕨 ci chi feng wei jue

【英文名】*All-grass of Disparate Brake*(中华本草)

【拉丁名】*Pteris Dispar* Kze(中华本草); *Herba Pteridis Disparis*(中药数据库)

【异名】半边歧(中华本草);半边双(中华本草)

【定义】为凤尾蕨科植物刺齿凤尾蕨的全草。(中华本草)

刺齿泥花草 ci chi ni hua cao

【拉丁名】*Lindernia Ciliata* (Colsm.) Pennell(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

刺齿贯众 ci chi guan zhong

【拉丁名】*Gyrtomium Caryotideum* (Wall.) Presl(中华本草)

【异名】细齿贯众蕨(中华本草、台湾植物志);尖耳贯众(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为鳞毛蕨科植物尖耳贯众的根茎。(中药数据库)

刺齿假瘤蕨 ci chi jia liu jue

【英文名】*Spiny-tooth Phymatopsis*(中药数据库)

【拉丁名】*Phymatopsis Glaucoptis* (Franch.) Ching(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物刺齿假瘤蕨的根茎。(中华本草)

刺南蛇藤 ci nan she teng

【拉丁名】*Celastrus Flagellaris* Rupr. (中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

刺柄观音座莲 ci bing guan yin zuo lian

【英文名】*Wall Angiopteris*(中药数据库)

【拉丁名】*Angiopteris Muralis* Ching(中华本草)

【异名】刺柄莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为观音座莲科植物刺柄观音座莲的根茎。(中华本草)

刺柄南星 ci bing nan xing

【英文名】*Arisaema*(中药数据库)

【拉丁名】*Arisaema Asperatum* NE. Brown(中华本草)

【异名】三角莲(中华本草);南星(中华本草);山苞谷(中华本草);天南星(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物刺柄南星的块茎。(中华本草)

刺柏 ci bai

【拉丁名】*Juniperustaiwaniana* Hayata(中华本草)

【异名】杉柏(中华本草、浙江天目山药植志);短柏木(中华本草、浙江天目山药植志);刺松(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为柏科植物刺柏。(中华本草)

刺茶 ci cha

【拉丁名】*Maytenus Variabilis* (Loes.) C. Y. Cheng(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

刺茶美登木 ci cha mei deng mu

【拉丁名】*Maytenus Variabilis* (Loes.) C. Y. Cheng f. In-

- ernis C. Y. Cheng et W. L. Sha(植)(中药数据库)
 【异名】皮胡椒(中华本草、广西药用植物名录)
 【定义】为卫矛科植物广西刺茶的叶。(中华本草)
- 刺梨子 ci li zi**
 【英文名】Fruit of Dainty Petal Rose(中药数据库)
 【拉丁名】Fructus Rosae Graciliflorae(中药数据库)
 【异名】野人头(中药数据库)
 【定义】为蔷薇科植物细梗蔷薇的果实。(中药数据库)
- 刺栲 ci kao**
 【拉丁名】Castanopsis Hystrix A. DC.(中华本草)
 【异名】红锥栗(中华本草、云南树木志);红锥(中华本草、中国高等植物图鉴补编)
 【定义】为壳斗科植物。(中华本草)
- 刺桐 ci tong**
 【英文名】Oriental Variegated Coralbean(中药数据库)
 【拉丁名】Erythrina Variegata L. var. Orientalis(L.) Merr.(中华本草)
 【定义】为双子叶植物药豆科植物刺桐。(中华本草)
- 刺桐叶 ci tong ye**
 【英文名】Leaf of Oriental Variegated Coralbean(中药数据库)
 【拉丁名】Folium Erythrinae(中药数据库)
 【定义】为双子叶植物药豆科植物刺桐的叶。(中华本草)
- 刺桐花 ci tong hua**
 【英文名】Flower of Oriental Variegated Coralbean(中药数据库)
 【拉丁名】Flos Erythrinae(中药数据库)
 【异名】鹦哥花(中华本草、天中记)
 【定义】为双子叶植物药豆科植物刺桐的花。(中华本草)
- 刺梨 ci li**
 【英文名】Singli Roxburgh Rose Fruit, Fruit of Single Roxburgh Ros(中药数据库)
 【拉丁名】Rosa Roxburghii Trattl. f. Normalis Rehd. et Wils.(中药大辞典)
 【异名】茨梨(分类草药性、中药大辞典);文先果(四川中药志、中药大辞典);团糖(四川常用中草药、中药大辞典);送春归(宦游笔记、中药大辞典);缣丝花(中药大辞典)
 【定义】为双子叶植物蔷薇科植物刺梨的果实。具有健胃、消食的功效。临床用于治疗食积饱胀、消瘦。(中药大辞典)
- 刺梨叶 ci li ye**
 【英文名】Leaf of Single Roxburgh Rose(中药数据库)
 【拉丁名】Folium Rosae Normalis(中药数据库)
 【异名】茨梨叶(中华本草、贵阳民间药学)

【定义】为蔷薇科植物缣丝花和单瓣缣丝花的叶。(中华本草)

刺梨花 ci li hua

【英文名】Flower of Single Roxburgh Rose(中药数据库)

【拉丁名】Flos Rosae Normalis(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物刺梨的花。(中药数据库)

刺梨根 ci li gen

【英文名】Root of Single Roxburgh Rose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rosae Normalis(中药数据库)

【异名】茨藜根(中华本草、贵阳民间药草);茨藜子根(中华本草、天宝本草)

【定义】为蔷薇科植物缣丝花和单瓣缣丝花的根。(中华本草)

刺海马 ci hai ma

【拉丁名】Hippocampus Histrix Kaup(中华本草)

【定义】为海龙科动物。(中华本草)

刺莓果根 ci mei guo gen

【英文名】Root of Dahurian Rose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rosae Davuricae(中药数据库)

【异名】野玫瑰根(中药数据库、吉林医药资料)

【定义】为蔷薇科植物山刺玫的根。(中药数据库)

刺通草 ci tong cao

【英文名】Pith of Himalayan Trevesia(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Trevesiae Palmatae(中药数据库); Trevesia Palmata(Roxb.) Vis(中华本草)

【异名】挡凹(中华本草);脱萝(中华本草);广叶参树(中华本草、广西药用植物名录);广叶梗(中华本草、中国种子植物科属辞典);税树(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药五加科植物刺通草的全草。(中华本草)

刺梗蔷薇 ci geng wei

【拉丁名】Rosa Setipoda Hemsl. et Wils.(中华本草)

【异名】刺柄蔷薇(中华本草、拉汉种子植物名称);刺毛蔷薇(中华本草、秦岭植物志);黄花蔷薇(中华本草、高原中草药治疗手册)

【定义】为蔷薇科,灌木,高可达3mm。小枝无毛,散生宽扁皮刺。生于海拔1800~2600m的山坡或灌丛中。分布于湖北、四川。(中华本草)

刺盖草 ci gai cao

【英文名】Root of Loping Thistle(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cirsii Belingshanici(中药数据库)

【异名】大牛口(中药数据库);大刺盖(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物罗平薊的根。(中药数据库)

刺菱 ci ling

【英文名】Fruit of Fourcaudated Waterchestnut(中药数

据库)

【拉丁名】Fructus Trapae Qudricaudatae(中药数据库)

【异名】野菱(中药数据库、纲目)

【定义】为菱科植物野菱的果实。(中药数据库)

刺黄芩 ci huang qin

【异名】刺黄连(中华本草、贵州草药);老鼠刺(中华本草、贵州草药);十大功劳(中华本草、贵州草药)

【定义】为小檗科植物大叶刺黄柏的全株。(中华本草)

刺黄连 ci huang lian

【英文名】Root of Soulie Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berberidis Soulieanae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物假豪猪刺的根及茎皮。(中华本草)

刺黄柏 ci huang bai

【英文名】Root of Anhwei Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berberidis Anhweiensis(中药数据库)

【异名】安徽小檗(中华本草);黄柏(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物刺黄柏的根、茎或树皮。(中华本草)

刺黄柏茎叶 ci huang bai jing ye

【英文名】Stem and Leaf of Slender-stalk Mahonia(中药数据库);Slender-stalk Mahonia(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Mahoniae Gracilipedis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物刺黄柏的茎叶。(中华本草)

刺猬 ci wei

【拉丁名】Erinaceus EuropaeusL.(中华本草)

【异名】偷瓜贼(中华本草、食物本草);猬鼠(中华本草、纲目);白刺猬(中华本草、杨氏家藏方);毛刺(中华本草、尔雅);猬(中华本草、尔雅);刺鱼(中华本草);刺球子(中华本草);刺血儿(中华本草);偷瓜獾(中华本草);刺鼠(中华本草、随息居饮食谱)

【定义】刺猬科动物。(中华本草)

刺猬皮 ci wei pi

【拉丁名】Erinaceus Europaeus L.(中药大辞典)

【异名】猬皮(本经、中药大辞典、中华本草);仙人衣(山东中药、中药大辞典、中华本草)

【定义】为刺猬科动物刺猬或短刺猬的皮。具有降气定痛、凉血止血的功效。临床用于治疗反胃吐食、腹痛疝气、肠风痔漏、遗精等。(中药大辞典)

刺萼悬钩子 ci e xuan gou zi

【英文名】Spinycalyx Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubus Alereterius Focke(中华本草)

【异名】黄琐梅(中华本草);小红袍(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物刺萼悬钩子的根。(中华本草)

刺葡萄 ci pu tao

【拉丁名】Vitis Davidii(Roman) Foex(中华本草)

【异名】小葡萄(中华本草、贵州中草药名录);野葡萄(中华本草、秦岭巴山天然植物志);千金藤(中华本草、中药大辞典);山葡萄(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

刺葡萄根 ci pu tao gen

【拉丁名】Vitis Davidii(Roman) Foex(植)(中华本草)

【定义】为葡萄科植物刺葡萄的根。(中华本草)

刺鲀科 ci tun ke

【拉丁名】Diodontidae(药用动物学)

【定义】体宽而短,背部扁平。腹部能鼓气。全身除唇部和尾柄外,被有长刺而得名。上下颌骨齿板成鸟喙状。背鳍不具棘部。为生活在炎热浅海水草和珊瑚礁的鱼类。(药用动物学)

刺黑珠 ci hei zhu

【拉丁名】Berberis Sargentiana Schneid.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

刺楸 ci qiu

【英文名】Septemlobate Kalopanax(中药数据库)

【拉丁名】Kalopanax Septemlobus(Thunb.) Koidz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

刺楸茎 ci qiu jing

【拉丁名】Kalopanax Septemlobus(Thunb.) Koidz.(植)(中华本草)

【定义】为五加科植物刺楸的茎枝。(中华本草)

刺楸树叶 ci qiu shu ye

【英文名】Leaf of Septem Lobate Kalopanax(中药数据库)

【拉丁名】Kalopanax Septemlobus(Thunb.) Koidz.(植)(中华本草)

【定义】为五加科植物刺楸的叶。(中华本草)

刺楸树皮 ci qiu shu pi

【英文名】Bark of Septemlobate Kalopanax(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Kalopanax(中药数据库)

【异名】丁木树(中华本草);棘楸(中华本草);云楸(中华本草);刺桐(中华本草);刺枫树(中华本草);鼓钉刺(中华本草);刺楸(中华本草、救荒本草);刺楸皮(中华本草、陕西中草药);钉皮(中华本草、四川中药志);丁桐皮(中华本草、四川中药志);鸭脚板叶(中华本草);刺椿(中华本草);鹅足板树(中华本草);丁桐树(中华本草);丁皮树(中华本草);上山虎(中华本草);鸟不宿(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物刺楸的树皮。(中华本草)

刺楸树根 ci qiu shu gen

【英文名】Root of Septemlobate Kalopanax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Kalopanax(中药数据库)

【异名】刺五加(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药五加科植物刺楸的根或根皮。(中华本草)

刺榆 ci yu

【英文名】Bark of David Herniptelea(中药数据库)

【拉丁名】Herniptelea Davidii (Hance) Planch. (中华本草); Cortex Hernipteleae Davidii(中药数据库)

【异名】钉枝榆(中华本草、中国树木分类学);梗榆(中华本草、广雅);柘榆(中华本草、广雅);至(中华本草、尔雅);柎(中华本草、诗经);刺榔(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为榆科植物刺榆的根皮、树皮或嫩叶。(中华本草)

刺榆叶 ci yu ye

【英文名】Leaf of David Herniptelea(中药数据库)

【拉丁名】Herniptelea Davidii (Hance) Planch. (植)(中华本草); Cortex Hernipteleae Davidii(植)(中药数据库)

【定义】为榆科植物刺榆的叶。(中华本草)

刺榆皮 ci yu pi

【英文名】Bark of David Herniptelea(中药数据库)

【拉丁名】Herniptelea Davidii (Hance) Planch. (植)(中华本草); Cortex Hernipteleae Davidii(植)(中药数据库)

【定义】为榆科植物刺榆的树皮、根皮。(中华本草)

刺槐 ci huai

【英文名】Black Locust(中药数据库)

【拉丁名】Robinia Pseudoacacia L. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

刺槐花 ci huai hua

【英文名】Flower of Black Locust(中药数据库)

【拉丁名】Flos Robiniae Pseudoacaciae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刺槐的花。(中华本草)

刺蒴麻 ci shuo ma

【拉丁名】Triumfetta Bartramia L. (中华本草)

【定义】为椴树科植物。(中华本草)

刺蒺藜 ci ji li

【英文名】Puncturevine Caltrop Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Tribuli(中药数据库)

【异名】硬蒺藜(中华本草、山东中药);地菱(中华本草、江苏植药志);野菱角(中华本草、江苏植药志);蒺骨子(中华本草、江苏植药志);八角刺(中华本草、青海药材);三角刺(中华本草、中国药植志);旁通(中华本草、本经);蒺藜子(中华本草、本经);蒺藜(中华本草、毛诗传);茨(中华本草、诗经);三角

蒺藜(中华本草、本草求真);旱草(中华本草、本草经解);休羽(中华本草、纲目);杜蒺藜(中华本草、圣惠方);白蒺藜(中华本草、药性论);即藜(中华本草、别录);升推(中华本草、本经);豺羽(中华本草、本经);止行(中华本草、本经);屈人(中华本草、本经);蒺藜膏葵(中华本草、山东中药)

【定义】为蒺藜科植物蒺藜的果实。(中华本草)

刺蓼 ci liao

【拉丁名】Polygonum Senticosum (Meissn.) Franch. et Sav. (中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

刺蜜 ci mi

【英文名】Alhagi-honey(中药数据库)

【拉丁名】Mel Alhagi(中药数据库)

【异名】羊刺蜜(中华本草、北史);阳塔克西克尔(中华本草);骆驼刺糖(中华本草、新疆药材);刺糖(中华本草、新疆药材);给勃罗(中华本草、本草拾遗);草蜜(中华本草、本草拾遗)

【定义】为双子叶植物药豆科植物骆驼刺叶中分泌液凝结而成的糖粒。(中华本草)

刺酸浆 ci suan jiang

【拉丁名】Physlum Heterophyllum (Hemsl.) Mak. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

刺楸 ci chu

【英文名】Spiny Ailanthus(中药数据库)

【拉丁名】Ailanthus Vilmoriniana Dode. (中药数据库)

【定义】为苦木科植物刺楸的树脂。(中药数据库)

刺蕊草 ci rui cao

【拉丁名】Pogostemon Glaber Benth. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

刺额短刺鲀 ci e duan ci tun

【英文名】Chilomycterus(中药数据库)

【拉丁名】Chilomycterus Echinatus (Gronow) (中华本草)

【异名】辣龟(中华本草、中国药用动物志);刺臼(中华本草、中国药用动物志);刺乖(中华本草、中国药用动物志);抱鲀(中华本草、中国药用动物志)

【定义】刺鲀科动物刺额短刺鲀的皮。(中华本草)

刺藜 ci li

【英文名】Herb of Aristate Goosefoot(中华本草)

【拉丁名】Chenopodium Aristatum L. (中华本草); Herba Chenopodii Aristati(中药数据库)

【异名】野鸡冠子草(中华本草、内蒙古中草药);铁扫帚苗(中华本草、河南中草药手册);红小扫帚苗(中华本草、河南中草药手册)

【定义】为藜科植物刺藜的全草。(中华本草)

刺藤草 ci mo ling cao

【英文名】Betonylike Morina(中药数据库)

【拉丁名】Morina Betonicoides Benth.(中华本草)

【异名】刺参(中华本草、西藏常用中草药);降扯(中华本草、高原中草药治疗手册)

【定义】为川续断科植物刺藤草的幼嫩全草。(中华本草)

刺鰕虎鱼 ci xia hu yu

【拉丁名】Acanthogobius Flavimanus(Temminck et Schlegel)(中华本草)

【定义】为鰕虎鱼科动物。(中华本草)

刻叶紫堇 ke ye zi jin

【拉丁名】Corydalis Incisa(Thunb.) Pers.(中华本草)

【异名】裂苞紫堇(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

剂型 ji xing

【英文名】Dosage Forms(中国中医药学主题词表)

【异名】药物剂型(中药药剂学)

【定义】是将原料药加工制成适合于医疗或预防应用的形式,是药物施用于机体前的最后形式。(中药药剂学)

剂量药效关系 ji liang yao xiao guan xi

【定义】是研究中药剂量对中药药效的影响。(中药药理学实验)

单刀根 dan dao gen

【英文名】Root of Redbracted Lysidice(中药数据库)

【拉丁名】Radix Lysidices Rhodostegiae(中药数据库)

【异名】广檀木(中华本草、广西中草药);铁罗伞(中华本草、南宁市药物志);龙眼参(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物仪花的根。(中华本草)

单子叶植物禾本科叶构造 dan zi ye zhi wu he ben ke ye gou zao

【定义】是对单子叶植物禾本科叶的构造的描述。它形态结构较复杂。同样由表皮、叶肉、叶脉3部分组成。(药用植物学)

单子叶植物纲 dan zi ye zhi wu gang

【英文名】Monocotyledonae(药用植物学)

【定义】是须根系,茎维管束成星状排列无形成层,叶具平行脉或弧形脉,花各部基数为3,花粉粒具单个萌发孔,胚具1片子叶。(药用植物学)

单子叶植物茎构造 dan zi ye zhi wu jing gou zao

【定义】是单子叶植物茎构造特征。一般没有形成层和木栓形成层,终身只具初生构造,不能无限增粗。通常不产生周皮。无皮层和髓及髓射线之分等。(药用植物学)

单子叶植物根状茎构造 dan zi ye zhi wu gen zhuang jing gou zao

【定义】是单子叶植物根状茎构造特征。少有周皮,皮层常占较大体积,内皮层大多明显,有些植物在皮层靠近表皮的部位的细胞形成木栓组织或转变为木栓细胞。(药用植物学)

单子房 dan zi fang

【定义】是指只有1室的单雌蕊的子房。(药用植物学)

单子麻黄 dan zi ma huang

【英文名】All-grass of One-seed Ephedra(中药数据库)

【拉丁名】Ephedra Mohnosperma Gmel ex C. A. Meyer.(中药数据库);Herba Ephedrae Monospermae(中药数据库)

【定义】为麻黄科植物单子麻黄的草质茎。(中药数据库)

单包鸢尾 dan bao yuan wei

【英文名】Root of Unibract Iris(中药数据库)

【拉丁名】Iris Anguifuga Y. I. Zhao(中华本草)

【异名】夏无踪(中华本草);蛇不见(中华本草);避蛇参(中华本草)

【定义】为鸢尾科植物单包鸢尾的根状茎。(中华本草)

单叶 dan ye

【英文名】Simple Leaf(药用植物学)

【定义】是1个叶柄上只生1个叶片的形式。(药用植物学)

单叶升麻 dan ye sheng ma

【拉丁名】Beesia calthaefolia(Maxim.) Ulbr.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

单叶双盖蕨 dan ye shuang gai jue

【拉丁名】Diplazium Lanceum(Thunb)(中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物。(中华本草)

单叶地黄连 dan ye di huang lian

【拉丁名】Munronia Unifoliolata Oliv.(中华本草)

【异名】地柑子(中华本草、云南植物志)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

单叶血盆草 dan ye xue pen cao

【英文名】Herb of Unileaf Sage(中药数据库)

【拉丁名】Salviacavaleriei Lev. var. Simplicifolia Stib.(中华本草);Herba Salviae Simplicifolia(中药数据库)

【异名】红青菜(中华本草、贵州草药);血盆草(中华本草、四川中药志);红五匹(中华本草、四川中药志);红肺筋(中华本草、四川中药志);朱砂草(中华本草、贵州民间方药集);反背红(中华本草、贵州民间方药集);破罗子(中华本草、峨嵋药植)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物单叶血盆草的全草。(中华本草)

单叶吴萸 *dan ye wu yu*

【英文名】Fruit of Simple-leaf Evodia(中药数据库)

【拉丁名】*Evodia Simplicifolia* Ridley(中华本草); *Fructus Evodiae Simplicifoliae*(中药数据库)

【异名】烘浪碗(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物单叶吴萸的叶。(中华本草)

单叶佩兰 *dan ye pei lan*

【拉丁名】*Eupatorium Japonicum* Thunb.(中华本草、中华本草)

【定义】为菊科植物单叶佩兰的全草。(中华本草)

单叶细辛 *dan ye xi xin*

【拉丁名】*Asarum Himalaicum* Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

单叶铁线莲 *dan ye tie xian lian*

【拉丁名】*Clematis Henryi* Oliv.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

单叶新月蕨 *dan ye xin yue jue*

【英文名】Simple Pronephrium(中药数据库)

【拉丁名】*Pronephrium Simplex* (Hook) Holtt.-meniscium *Simplex* Hook.(中华本草)

【异名】鹅仔草(中华本草); 草鞋青(中华本草); 新月蕨(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为金星蕨科植物单叶新月蕨的全草。(中华本草)

单头紫菀 *dan tou zi wan*

【英文名】Herb of Turbinate Aster(中药数据库)

【拉丁名】*Herba Asteris Turbinati*(中药数据库)

【异名】一枝香(中华本草); 野白菊(中华本草、浙江民间常用草药); 打风草(中华本草、浙江民间常用草药); 牛舌草(中华本草、浙江民间常用草药); 喉风草(中华本草、浙江民间常用草药); 百条根(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物陀螺紫菀的全草。(中华本草)

单头紫菀根 *dan tou zi wan gen*

【英文名】Root of Turbinate Aster(中药数据库)

【拉丁名】*Radix Asteris Turbinati*(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物陀螺紫菀的根。(中华本草)

单生花 *dan sheng hua*

【定义】是指单生于枝的顶端或叶腋的花。(药用植物学)

单级循环提取 *dan ji xun huan ti qu*

【定义】是提取液由泵进行循环流动与药材接触,使固

液两相边界层表面不断更新,从而加速了提取过程的操作。(中药制药工程原理与设备)

单色蝴蝶草 *dan se hu die cao*

【英文名】Concolorous Torenia(中药数据库)

【拉丁名】*Torenia Concolor* Lindl.(中华本草)

【异名】蓝猪耳(中华本草); 蚌壳草(中华本草); 倒胞草(中华本草); 蝴蝶花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物单色蝴蝶草的全草。(中华本草)

单行 *dan xing*

【定义】是指单味药治病。(中药学)

单体雄蕊 *dan ti xiong rui*

【英文名】Monadelphous Stamen(药用植物学)

【定义】是雄蕊的花丝连合成一束。(药用植物学)

单体蕊黄芪 *dan ti rui huang qi*

【英文名】Root of Membranous Milkvech.(中药数据库)

【拉丁名】*Radix Astragali*(中药数据库); *Asragalus Monadelphus* Brnng.(中华本草)

【异名】龟卡(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物单体蕊黄芪的根。(中华本草)

单层上皮 *dan ceng shang pi*

【英文名】Simple Epithelium(药用动物学)

【定义】是覆盖在机体内外表面的单层排列的上皮组织。(药用动物学)

单层柱状上皮 *dan ceng zhu zhuang shang pi*

【英文名】Simple Columnar Epithelium(药用动物学)

【定义】是细胞为柱状,单层平铺排列的被覆上皮。(药用动物学)

单层膜剂 *dan ceng mo ji*

【定义】是指单层的药物膜制剂。(中药药剂学)

单层鳞状上皮 *dan ceng lin zhuang shang pi*

【英文名】Simple Squamous Epithelium(药用动物学)

【定义】是细胞为扁平形,单层平铺排列的被覆上皮。(药用动物学)

单条草 *dan tiao cao*

【英文名】Herb of White Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】*Herba Lysimachiae Candidae*(中药数据库)

【异名】水硼砂(中华本草、贵州植药调查); 灵疾草(中华本草、陕西植药调查); 宿根菜(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物泽珍珠菜的全草。(中华本草)

单纹孔 *dan wen kong*

【英文名】Simple Pit(药用植物学)

【定义】是指结构简单,次生壁上未加厚的部分,呈圆筒形的纹孔。(药用植物学)

单纹孔导管 dan wen kong dao guan

【定义】是指导管壁未增厚部分为单纹孔的孔纹导管。
(药用植物学)

单花山竹子 dan hua shan zhu zi

【英文名】Bark of Uniflower *Garcinia* (中药数据库)

【拉丁名】Cortex *Garcinia* Oliganthae (中药数据库);
Garcinia Digantha Merr. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物单花山竹子的根叶树内皮。(中华本草)

单花红丝线 dan hua hong si xian

【拉丁名】*Lycianthes Lysimachoides* (Wall.) Bitter (中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

单花金丝桃 dan hua jin si tao

【拉丁名】*Hypericum Monantherum* Hook. f. et Thoms. ex Dyer (植) (中华本草)

【异名】刘寄奴(中华本草);双筋草(中华本草);观音草(中华本草);花生草(中华本草)

【定义】为藤黄科植物长瓣金丝桃的全草。(中华本草)

单花鸢尾 dan hua yuan wei

【英文名】Rhizome of Uniflower *Iris* (中药数据库)

【拉丁名】*Iris Uniflora* Pall. (中华本草)

【定义】为鸢尾科植物单花鸢尾的种子。(中华本草)

单花鸢尾子 dan hua yuan wei zi

【英文名】Rhizome of Uniflower *Iris* (植) (中药数据库)

【拉丁名】*Iris Uniflora* Pall. (植) (中华本草)

【定义】为鸢尾科植物单花鸢尾种子。(中华本草)

单花扁核木 dan hua bian he mu

【拉丁名】*Prinsepia Uniflora* Batal. (植) (中华本草)

【异名】扁核木(中华本草、中国树木分类学);械朴(中华本草、霍州志);榘(中华本草、药性论);蕤(中华本草、吴普本草);稷(中华本草、说文);白稷(中华本草、尔雅);械(中华本草、尔雅);山桃(中华本草);茹茹(中华本草);马茹(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

单花芥 dan hua ji

【英文名】*Pilosecalyx Acaulescent* *Pegaeophyton* (中药数据库)

【拉丁名】*Pegaeophyton Scapiflorum* (Hook. f. Thoms.) Merq et Shaw-Cochlearia *Scapiflorum* Hook. f. et Thoms. (中华本草); *Semen Przewal* (中药数据库)

【异名】苏罗杂布(中国藏药);高山辣根菜(中华本草、青藏高原药用植物图鉴);高山无茎芥(中华本草、甘肃中草药);无茎芥(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物单花芥的根、全

草。(中华本草)

单花鹿茸草 dan hua lu rong cao

【英文名】Oneflower *Monochasma* (中药数据库)

【拉丁名】*Monochasma Monantha* Hemsl. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物单花鹿茸草的全草。(中华本草)

单花翠雀花 dan hua cui que hua

【英文名】All-grass of Oneflower *Larkspur* (中药数据库)

【拉丁名】*Delphinium Candelabrum* Ostenf' var *Monanthum* (Hand. -Mazz) W. T. Wang. (中药数据库); *Herba Delphinii Monanthi* (中药数据库)

【定义】为毛茛科植物单花翠雀花的全草。(中药数据库)

单芽狗脊蕨 dan ya gou ji jue

【拉丁名】*Woodwardia Unigemmata* (Makino) Nakai (中华本草)

【定义】为乌毛蕨科植物。(中华本草)

单身复叶 dan shen fu ye

【英文名】Unifoliate Compound Leaf (药用植物学)

【定义】是叶轴上只具1个叶片,是一种特殊形态的复叶,可能是由三出复叶两侧的小叶退化成翼状形成。其顶生小叶与叶轴连接处,具一明显的关节。(药用植物学)

单味药散剂 dan wei yao san ji

【定义】是由单味药制成的散剂。(中药药剂学)

单性花 dan xing hua

【英文名】Unisexual Flower (药用植物学)

【定义】是在一朵花中仅具雄蕊或雌蕊的花。(药用植物学)

单果 dan guo

【英文名】Simple Fruit (药用植物学)

【定义】是由单心皮或多心皮合生雌蕊所形成的果实,即一朵花只结一个果实。(药用植物学)

单歧聚伞花序 dan qi ju san hua xu

【英文名】*Monochasium* (药用植物学)

【定义】是花序轴顶端生1朵花,先开放,而后在其下方产生侧轴,同样顶端生1朵花,这样连续分枝形成。(药用植物学)

单波长光度法 dan bo chang guang du fa

【异名】单波长光谱法(中药制剂分析)

【定义】是对中药制剂经过适当的提取,净化或采用专属的显色反应等步骤来排除干扰,测定其在规定波长处的吸收度,以测定其中某一类总成分或某个单一组分的方法。(中药制剂分析)

单细胞培养 dan xi bao pei yang

【定义】是在高效高营养培养基中,通过从愈伤组织和悬浮培养物分离单细胞的专门技术实现的单个细