

𠂔

𠂔

𠂔

目

本草綱目草部目錄第十七卷

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

藺茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

葇若

本經

即天仙子

雲實

本經

苴麻

唐本

博落迴附

常山

蜀漆

本經

○杜莖山

藜蘆

本經

○山慈石

參果

木藜蘆

拾遺

附子

本經

下天雄

本經

側子

別錄

漏籃子

綱目

烏頭

本經
烏喙射罔附

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

蒟蒻

開寶
菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經
押不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經

山躑躅
羊不喫草附

芫花

本經

堇花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蘘

本經

石龍芮

本經
胡椒菜

毛茛

拾遺
海薑附

牛扁

本經
蝨建草附

葶麻

圖經

格注草 唐本

海芋 綱目
透山根附 鉤吻 本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經下品

釋名黃良 本經將軍之火參 吳普如黃其色也將軍

之號當取其駿快也 杲曰推陳致新如

集解 別錄曰大黃生河西山谷及隴西二月八月

生黃赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五

月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾宏景曰今

采益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者

猶作紫地錦色味甚苦濇色至濃黑西川陰乾者

勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐蛙堪

久此藥至勁利粗者便不中服 恭曰葉子莖並似

羊蹄但莖高六七尺而胞味酸堪生啖葉粗長而厚根細者亦似病羊蹄大者乃如盃長二尺其性溼潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截著石上煨之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以北者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣藏器曰凡用當分別之若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉洩駿快推陳去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正月內生青葉似薤麻大者如扇根如芋大者如盃長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作紫片如牛舌大形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盃藥市以大者爲枕紫地錦文也今人以莊浪出者

為最莊浪卽古涇原隴西地與別錄相合

正誤

生苗葉累年長一種羊蹄大黃治疥癩甚效初

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟卽黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為土大黃時珍曰蘇說卽老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根脩治

雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者剉片蒸之從巳至未曬乾又洒臘水蒸之從

未至亥如此凡七次曬乾卻洒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃曬乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸煮

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公苦有毒扁鵲苦無毒李當之大寒元素

曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒杲曰大黃苦峻下走用之于下必生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痹或頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也之才曰黃芩爲之

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟

本經

平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結別錄通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿甄權通宣一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘡大明瀉諸實

熱不通除下焦溼熱消宿食瀉心下痞滿元下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡時珍

發明之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚

閉宗爽曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯

用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

本草綱目直音
湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐
衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄
其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用
之無不效惟在量其虛實而已（震亨曰）大黃苦寒
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經
之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故
黃芩救肺黃連救肝既退則陰血復其舊矣寇氏不
之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後
人也（時珍曰）大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不
吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
曰瀉心實瀉四經血中大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉
痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯

脾胃之溼熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所至爲痞滿又云濁氣在上則生臍脹是矣病發於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在血分之野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無己註釋傷寒論亦不知分別此義成無己曰熱淫所勝以苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強頌曰本草稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元帝常有腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

附方

舊十四新

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之大黃二

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一

吐血刺痛黃川大

升熱服取利

兩為散每服一錢以生地黃汁一合水

傷寒痞滿

半盞煎三五沸無時服簡要濟眾方

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為

痞也大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩

以麻沸湯二升漬之須臾絞汁

熱病譫狂

五兩到

分作二次溫服

傷寒論

炒微赤為散用臘雪水五升煎如

膏每服半匙冷水下

聖惠方

傷寒發黃上方同

氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一

腰

腳風氣

令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

升入芒消一兩緩服須臾當利下

傷寒類要

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯經

方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用

大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧

子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一

二十丸○衛生寶鑑用阜筴熨膏和丸名墜痰丸

又名全真丸金宣宗服痰為百病百病痰丸治痰為

之有驗賜名保安丸痰為百病百病惟水瀉胎

前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切曬八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入

砂罐固濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二二十丸小病五六丸緩病七八十

丸急病一百二十丸溫水吞下即臥勿動候藥逐

上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王

隱君歲合四十餘斤愈男女諸病無極丸治婦人

疾數萬也養生主論男女諸病經血不通赤白

帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹

痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其效甚速

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
用童尿一盃食鹽二錢浸一日切曬一分用醋酒
一盃浸一日切曬再以巴豆仁三十五粒同炒豆
黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盃浸一日
切曬一分用當歸四兩入淡醋一盃同浸一日去
歸切曬為末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心溫
酒下取下惡物為驗未下再服此心腹諸疾三物
武當高士孫碧雲方也醫林集要
丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一
兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三丸凡中
客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死
者以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中
鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即
瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也
圖經乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也
本草腹中痞塊煎丸梧子大每服三十丸生薑湯
下吐利為度腹脇積塊風化石灰末半斤瓦器炒
外臺祕要腹脇積塊極熱稍冷人大黃末一兩

炒熟入桂心末半兩略炒下米醋攪成膏攤布貼之。○又方大黃二兩朴消一兩爲末以大蒜同搗膏和貼之。或加阿魏一久患積聚二便不利上搶兩尤妙。丹溪心法。大黃白芍各二兩爲末水丸梧子大每脾癖疳積湯下四十丸。日三以知爲度。千金方。脾癖疳積不拘大人小兒錦紋大黃三兩爲末醋一盞沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日曬夜露三日再研用。船上疏黃一兩形如琥珀者宮粉一兩同研勻十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如服一服不愈半月之小兒後再服若不忌口不如勿服。聖濟總錄。小兒無辜。閃癖癰癥或頭乾黃聾或乍痢乍瘥諸狀多者大黃煎主之。大黃九兩錦紋新實者若微朽卽不中用削去皮搗篩爲散以好米醋三升和置瓦盤中於大鐺內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸。乃貯器中三歲兒一服七丸梧子大日再服以下出青赤膿爲度若不下一服或下少稍稍加大丸若

悶絕 而復蘇 名傷寒 併熱霍 亂大黃 人參各 半兩	榔 取利或 加檳 熱痢裏急 煎服取 利集簡 方忽喘	河間保 命集 劉諸痢初起 錢壯人 各一兩 水煎服	煩蜜湯 服 方簡便相火秘結 二錢有 厥冷者 酒服無 厥冷五 心	白濁淋 入藥攪 勻蒸熟 空心食 之不過 三服愈	空腹分 為二服 如人行 五里再 服廣利 方赤	大黃四 分以童 子小便 五六合 煎取四 合去滓	加黃連 名三黃 丸錢氏 小兒方 骨蒸積熱 黃瘦	麻子大 每服五 丸至十 丸蜜湯 下 母亦禁之一 崔知悌 方小兒諸 熱大黃 煨熟黃 芩各	用之此藥 惟下宿膿 不令兒利 也須禁食 毒物乳	下多又須 減之病重 者七八劑 方盡根大 人亦可
---	--	--	---	---	---	--	---	---	--	--