

太陽傷風方

太陽傷寒方

太陽兩傷方

尚論篇

卷五

尚論後篇卷之三諸方目錄

太陽傷風諸方 計十五方除重

太陽傷寒方 計三十九方除重附

太陽兩傷方 計十方除重

命

尚論張仲景傷寒論太陽本經諸方脉症後四卷之三

西昌喻昌嘉言甫著

尚論諸方大意

仲景一百一十三方。用本草九十一種耳。仲景上溯神農  
本經藥三百六十五種。效法周天三百六十五度之數。應  
三才而合四時。妙義開天也。仲景取述神農本經藥品。總  
九十一種。入傷寒論中。輔相裁成。有合六經之大綱者。有  
合六經之一目者。蓋神農百病兼收。而仲景則由六經以  
例百病。所以於上古本經取裁九十一種。用之不盡。萬世  
而後。星日炳然。聖之又聖者矣。梁陶隱君別錄。篇之爲七。

尚論後篇卷之三諸方目錄

太陽傷風諸方 計十五方除重

太陽傷寒方 計三十九方除重附

太陽兩傷方 計十方除重

論

尚論張仲景傷寒論太陽本經諸方脉症後四卷之三

西昌喻昌嘉言甫著

尚論諸方大意

仲景一百一十三方用本草九十一種耳仲景上溯神農  
本經藥三百六十五種效法周天三百六十五度之數應  
三才而合四時妙義開天也仲景取述神農本經藥品總  
九十一種入傷寒論中輔相裁成有合六經之大綱者有  
合六經之一目者蓋神農百病兼收而仲景則由六經以  
例百病所以於上古本經取裁九十一種用之不盡萬世  
而後星日炳然聖之又聖者矣梁陶隱君別錄篇之爲七

百三十種。追唐本圖經證類。嘉佑政和。旁搜編錄。於是旁  
門捷徑。各自成名者多矣。而仲景宮牆生色。間出英賢數  
十輩。尤爲不孤。識大識小。總計一千七百四十六種。病雖百病  
某無纖漏。天下後世永賴焉。然一千七百四十六種。仲景  
顯現億兆。如同一日。昭式乃至。漸推漸廣。觀察盡矣。  
九十七種。賢哲挺生。莫識厥旨。昌也。晚進無識。手集神農  
本經。竊以傷寒論中藥品爲主。其晉唐以後。諸賢發揮傷  
寒論全方。有得者。亦一一錄出。而昌亦少步。尚論諸方之  
後。總欲門下好學。隨證問藥。一目瞭然。無檢書之苦。難是  
慰耳。

太陽經風傷衛方

辨中風證用桂枝湯解肌大綱總法

桂枝湯方

桂枝

三兩去皮  
味辛熱

芍藥

三兩味苦  
酸微寒

甘草

二兩炙  
味甘平

生薑

三兩切  
味辛溫

大棗

十二枚  
味甘溫

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升

服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身

熱熱微似有汗者益佳不可令如水淋漓病必不除若一服

汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後

服小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周

時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至

二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出黃芩惡寒漸漸惡風翁翁發熱宜桂枝湯仲景原文

風之傷人也頭先受之故令頭痛風在表則表寔故令發熱風爲陽氣亦爲陽氣同類相從則傷衛外之氣衛傷則無以固衛津液故令汗出其惡風者衛氣不能衛也其脉緩者衛氣不能鼓也上件皆太陽症故曰太陽中風桂枝辛甘辛則能解甘則能寔表內經曰辛甘發散爲陽故用之以治風然恐其走泄陰氣故用芍藥之酸以收之佐以生薑甘草大棗此發散而兼和裏之意是方也惟表邪可以用之若陽邪去

表入裏。裏作燥渴。二便秘結。此宜承氣之時也。而誤用之則反矣。昌按承氣之誤。庸者固然。而工者誤在微細。仲景諄切不似此項。逐條本文詳玩始獲。

凡桂枝湯病症者。常自汗出。小便不數。手足溫。和。或手足指梢露之。則微冷。覆之。則溫。渾身熱微煩。而又憎寒。始可行之。若病者無汗。小便不數。手足溫。和。或手足逆身冷。不惡寒。反惡熱。或飲酒後。慎不可行桂枝湯也。脉緊必無汗。有汗不可誤作桂枝症。此脉與證。仲景說得甚明。後人看不透。所以不敢用此方。假令寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則洒淅惡寒也。尺脉弱。名曰陰不足。陽氣下陷。入陰中。則發熱也。

此謂元氣受病而然也。又曰：陽微則惡寒，陰微則發熱。醫既汗之，使陽氣微，又大下之，令陰氣弱。此謂醫所使也。大抵陰不足，陽往從之，故陽內陷而發熱；陽不足，陰往乘之，故陰上入陽中，則惡寒。舉此二端，明白易曉，何憚而不用桂枝湯哉？仲景治表虛，製此湯。桂枝味辛，熱發散，助陽，使體輕。本乎天者，親上，故桂枝爲君；芍藥甘，寒佐之，如陽脉濇，陰脉弦，腹中急痛，乃製小建中湯，以芍藥爲君，桂枝甘草佐之。一則治其表虛，一則治其裏虛，故各有主用也。

以桂枝易肉桂，治傷寒腹痛，神品藥也。如夏中熱，腹疼，少加黃芩，去桂，痛立止。桂於春夏爲禁藥。

按經云桂枝入咽陽盛則斃春夏發者爲禁藥也桂能動血血熱者爲禁藥也木得桂而死肝不足者爲禁藥也

桂枝湯有禁用三法

仲景本文并昌論

中風病主用桂枝湯解肌和營衛七法

本文并昌論

汗後水氣上逆有禁更汗增滿一法

本文并昌論

或同桂枝湯發字之義曰一桂枝耳或云發汗或云當得汗

解或云當發汗更發汗宜桂枝湯者數方是用桂枝發汗也

復云無汗不得用桂枝又曰汗家不得重發汗又曰發汗過

多者都用桂枝甘草湯是開汗也一藥二用如何說得仲景

發汗與本草出汗之義相通爲一答曰本草云桂味辛甘熱

無毒爲百藥之長。通血脈止煩出汗者是調血而汗自出也。  
仲景云藏無他病發熱自汗者此衛氣不和也。又曰自汗者  
爲營氣和營氣和則外不諧以衛氣不與營氣和諧也。營氣  
和則愈。故皆用桂枝湯調和營衛。營衛和則汗自出也。風邪  
由此而解。非桂枝能於腠理發出汗也。以其固閉營血衛氣  
自和邪無容地而出矣。其是則閉汗孔也。昧者不解閉汗之  
意。凡是病者俱用桂枝湯發汗。若與中風自汗者合効如桴  
鼓。因見其取效而病愈。則曰此桂枝發出汗也。遂不問傷寒  
無汗者亦與桂枝湯誤之甚矣。故仲景言無汗不得服桂枝。  
是閉汗孔也。又曰發汗多叉于胃。心心悸欲得按者用桂枝。

甘草湯是亦開汗乳也。又曰：汗家不得重發汗。若桂枝湯發汗，是重發汗也。凡桂枝條下言發字，當認做出字，是汗自然出也。非若麻黃能開腠理而發出汗也。本草出汗二字，上文有通血脈一句，是非三焦衛氣皮毛中藥，是爲營血中藥也。如是則出汗二字，當認作營衛和自然汗出，非桂開腠理而發出汗也。故後人用桂治虛汗，讀者當逆察其意，則可矣。噫！神農作於前，仲景述於後，前聖後聖，其揆一矣。不解肌，或誤汗病，裏用五苓兩解表裏二法。一法水逆用之多，服暖水汗出愈。一法脈浮，小便不利，微熱消渴者用之。

五苓散方

猪苓

十八銖  
去皮

茯苓

十八銖

澤瀉

一兩  
六銖

白朮

十八銖

桂

半兩

右五味爲散。以白飲和服。方寸匕。日三服。服煖水。汗出愈。

一法真武湯

一法桂枝加附子湯

真武湯方

此本少陰經之神方。并加減法。而太陽上篇先錄之。至太陽下篇。尤宜緊要。先同錄此。

茯苓

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩  
切片

白朮二兩

附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

桂枝加附子湯

於桂枝湯內加附子一枚餘依桂枝湯法

不解肌而用燒鍼取汗寒入核起多核止變一法

桂枝加桂湯更加桂

於桂枝湯方內更加桂枝二兩

中風肌未解不可下宜用桂枝湯解外一法

桂枝湯

方見前

不解肌反誤下邪不服者於前下藥內更加桂枝湯一法

卽桂枝大黃湯之互詞。因上衝陽位。故兩解之也。不上衝者。不用此方。

不解肌反誤下。心痞。用溫補藥兩解表裏一法。

桂枝人參湯。卽理中加桂枝而易其名也。

桂枝四兩 去皮

甘草四兩 炙

白朮三兩

人參三兩

乾薑三兩

右五味以水九升。先煮四味取五升。內桂枝更煮三升。去滓溫服一升。日再服。夜一服。

或問大柴胡瀉也。桂枝人參湯補也。何爲皆治下利。心下痞。鞭曰此非裏熱。乃下之早。因作痞。裏虛協熱而利。表又不解。

故與桂枝人參湯和裏解表。若夫傷寒發熱汗出不解。心下痞鞭。嘔吐而不利者。表和而裏病也。以心下痞鞭故爲實。當大柴胡下之。二者心下痞鞭雖同。而虛實之症有別。故用藥有攻補之異。

不解肌反誤下。邪入陽明。用藥太陽兩解一法。

葛根黃連黃芩湯方

葛根半斤

黃連二兩

黃芩三兩

甘草二兩

右四味以水八升。先煮葛根減二升。內諸藥者。取二升去滓。分溫再服。

不解肌反誤下。宜辨陽實陰虛。加減桂枝湯一法。