

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷五

目錄

汗吐下後并誤治諸證

臟結證

結胸痞證

差後復證

陰陽易病

余爲此編

誦陳惠編

潮諺篇

吾世不餘快爾舒爾篇

目錄

卷四 潮州 潮州集 潮州集 潮州集

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷五

張仲景先師原文

會稽虛谷章楠編註

冀子陳祖望

山陰

允占錢昌

校訂

汗吐下後并誤治諸證

本發汗而復下之此爲逆也。若先發汗治不爲逆。本
先下之而反汗之爲逆。若先下之治不爲逆。

凡誤汗誤下，皆由表裏淺深之邪，辨別不真，其有表裏互相交涉者，應汗應下，必有緩急輕重先後之分，誤則爲逆，而必變危重也。如陽明病，裏證已具，若微惡寒者，表邪未罷也，須先解表而後攻裏。又如病發熱頭痛，邪在表也，而脈反沉，是本元虛，先當救裏，用薑附四逆溫臟以達表。又如病人無表裏證者，言無表邪，腑實之證，而發熱七八日，雖脈浮數者，可下之，以其內熱盛而外溢，故脈浮數。

竝無表證故可下也。諸如此類或辨之不明本當發汗解表者表未解而復下之此爲逆也。若先發汗治不爲逆如本當攻下治裏者而反汗之則爲逆也。若先下之治不爲逆又如邪在少陽半表半裏及厥陰陰陽交接之地則汗吐下法皆不宜用。若誤用之其害尤甚也。

傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯。

寒傷營證以麻黃湯發汗解半日許復煩者餘邪未淨而化熱故浮緊之脈變爲浮數而脈浮無裏證必從表解非可因脈數心煩誤用涼藥以遏之也。更者改也以其汗後津液已耗故改用桂枝湯解肌以調營衛如法啜稀粥助津氣則其汗自發而餘邪去矣。

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之。

上條是邪重藥力不到、此條是正虛不勝發散、致衛陽亡而表不固、漏汗不止而惡風、津液外泄、則小便難、以膀胱爲津液之府也、營血傷而經脈失養、故四肢微急、難以屈伸也、主以桂枝湯調營衛、加附子助元陽、使表裏陽氣皆復、其漏汗自止、而津液歸內、則四肢伸、而小便亦利矣、若見漏汗、不用附子而加黃芪、雖能實表止汗、而助中焦之氣、其小便難、由下焦陽虛、不能化氣輸津於膀胱、如

用黃芪助中、則下焦更虛、中焦氣壅、必腹脹而小便更難矣、於此見仲景用法之精當也、

太陽病發汗、汗出不解、其人仍發熱、心下悸、頭眩、身瞤動、振振欲擗地者、真武湯主之。

禁汗條內、有太陽傷寒證具、而云尺脈遲者、不可發汗、以營氣不足、血少故也、然尺屬腎、卽是腎虛、若發其汗、汗出亡陽、邪仍不解而發熱、以元氣不勝發散、遂現心悸、頭眩、身瞤動、振振欲擗地等證、

皆腎中陰陽之氣失守外越而身心莫能主持也
急用真武湯鎮攝北方陰陽之氣藉生薑辛溫達
表庶補正攘邪之功竝建矣

發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝去芍藥生薑新加人
參湯主之

寒傷營者身本疼痛發汗後其身仍痛浮緊之脈
變爲沉遲是津液傷營衛虛也以桂枝湯去芍藥
之斂防有餘邪也去生薑之散恐更耗液也加人

參補氣生津、藉桂枝通營和血、庶可愈也。張路玉
續論、作加芍藥生薑各一兩、如二味竝加、兩補營
衛、於理亦可。若營分寒邪未淨而身痛者、當去芍
藥、則生薑亦當去也。

發汗病不解、反惡寒者、虛故也。芍藥甘草附子湯主
之。

發汗病不解、而反惡寒、是陰陽兩傷、陽虛爲甚、故
用附子助元陽、芍藥滋營陰、陰和陽復、邪亦漸退、

更不可用辛散也

發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒但熱者。實也。當和胃氣。與調胃承氣湯。

此教人與上條對勘以辨虛實也。正虧爲虛。邪盛爲實。未發汗而惡寒者。表邪盛也。發汗後而惡寒者。表陽虛也。如不惡寒但熱者。陽明實證也。然止無形熱邪。並非大實脹痛。故以甘苦鹹寒清熱通降胃氣。胃以通降爲和。故名調胃承氣湯。

太陽病三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。

得病三日。已經發汗不解。反蒸蒸發熱。如蒸籠之熱。從內發者。是邪初入胃腑之證。尚未結實。故與調胃承氣爲宜也。

發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

太陽經脈。絡腎屬膀胱。發汗升散太陽。引動腎臟。

水寒之邪、臍下動悸、勢將上冲、欲作奔豚、蓋水者、火所畏、水寒動於下、心火惕於上、故云臍下悸也。豕爲水畜、水邪突然犯心、如豚之奔也、乘其初動、卽以甘艸大棗崇土制水、桂枝通太陽之經、君莢苓使水氣下泄、其病自退也。

未持脈時、病人叉手自冒心、師因試令欬、而不欬者、此必兩耳無聞也。所以然者、以重發汗、虛故如此。經言奪汗者無血、發汗太過而營血傷、則心怯、故

父手自冒心而耳爲心腎之竅肝腎虛則耳聾皆由重發其汗心腎兩傷之故然少陽經脈循耳邪閉少陽亦耳聾必有少陽病證與此虛實不同也發汗過多其人父手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘艸湯主之。

自冒心者兩手捧護其心也汗爲心液過汗液傷氣亦耗矣故惕然而悸不獨自冒且欲人按之者以桂枝色赤入心配甘艸甘溫以補心脾之陽陽

生則陰長、不用補血藥者、以其味厚質重、則下行、反不能助心氣也。此無耳聾、若有耳聾、多兼肝腎陰傷、又當用味厚之藥矣。是言無少陽證者也。病人脈數、數爲熱。當消穀引食。而反吐者、此以發汗、令陽氣微、膈氣虛、脈乃數也。數爲客熱、不能消穀、以胃中虛冷、故吐也。

脈數爲熱、當消穀引食者、以邪鬱表陽而脈數、其裏本和、故能消穀引食。若邪入裏、其脈沉數、卽不

能食此義當知也。今反吐而不能食者，亦非內邪
扞格，原由發汗太過，陽氣浮散，故脈數。陽既外越，
則內更虛，其浮熱如客之居外，而胃中虛冷，故不
能消穀引食而反吐也。可知發汗必傷心脾之陽，
則胃中虛冷，故上條用桂枝、甘艸湯也。

病人有寒，復發汗，胃中冷，必吐蚘。

病人本來中寒者，復發其汗，陽氣外散，則胃中更
冷，蚘不能安，而必吐蚘。此條又見於厥陰篇。