

蜡梅

Chimonanthus praecox Link

蜡梅又名黄梅，为冬季的名贵花木之一，原产我国中部，栽培历史很久，古时襄阳、荊州栽培很盛，现各处广行栽培。苏浙一带常作庭园景树，华北盆栽甚普遍，华南也有少量栽培。据笔者所知，河南鄧陵栽培历史较久，曾大量栽培销往各地，有“鄧陵蜡梅冠天下”之說。国外除日本栽培较多外，别国很少栽培。蜡梅除作观赏外，其花朵经烘制后为名贵药材。海上一些每年有出口，李时珍謂此花能辟暑生津，采花浸在生油中名为蜡梅油可敷湯火燙伤。

蜡梅为蜡梅科蜡梅属之落叶灌木，在较暖之南方也为半常绿状，枝方圆形棕红色；叶对生椭圆形卵形或卵状披针形，基部阔或楔形，先端渐尖，长约7—15cm，边缘无缺刻，叶质粗糙而无毛。花序由前年生枝条之腋叶发出，因品种不同花期自十一月开始可延至翌年二、三月，花瓣黄色质酷似黄蜡故名，又因开花于农历腊月故又名腊梅。内部花瓣较小并夹一横爪，常紫色条纹。富有芳香，冬日置一盆于室内则清香盈室，故为人们所喜爱。但不能久嗅多闻，据说花内常有小虫聚集，虽能使人头晕。花谢后结荚如垂铃，实为花托之膨大，长约4cm，口部收缩内含瘦果数枚，夏季成熟后光亮而呈栗褐色，大如红豆，内含种子一粒，一般把大之花托称作果，而把花托内所包之瘦果称作种子。

蜡梅品种很多，但其原始野生种同为狗蝇蜡梅。因各地名称不一，现仅以主要几种分述于下：

1. 狗蝇蜡梅，*C. praecox* var. *intermedius* Nak：叶较一般蜡梅狭尖而光滑，枝也不如蜡梅粗壮，花朵瘦小，花瓣长尖如狗牙（故河南鄧陵又名狗牙蜡梅）中心小花瓣紫红色，故又名红心蜡梅（上海）微香。品种最下，但性较蜡梅坚强，易萌蘖，长成丛生状，作蜡梅之砧木。

2. 素心梅：*C. praecox* var. *concolor* Nak

内部之花瓣不染紫色，花被全为淡黄色，香味最浓郁，栽培最普遍，苏浙多栽培为园景。

3. 蟹口蜡梅：C. praecox var. grandiflorus Link
：叶较大，间或长达20cm，花也大，径3—3.5cm，花瓣近圆形，虽盛开仍如半含，故名蟹口，香味盛浓。

4. 虎蹄蜡梅：花内部之小花瓣微染紫色红，开花最迟，农历十月始能开花，故又名十月崖上梅（河南鄢陵）和平黄蜡梅（上海）品种上甚，不易栽培。

此外，上海还有油蜡梅，亦种蜡梅之说。又可分为大花种、小花种，此处不多述。

生态习性

蜡梅性喜阳光，不畏寒冷，能耐干旱。喜肥沃而排水良好的轻壤土，在砂质土及碱土上都生长不良。

花皆生于一年生新枝，迟至叶前开放，老枝不能开花，在背风处开花较好，若在寒风口则花蕾小而且不易开放，正在开时如受寒风也易凋谢，易生萌芽，很耐修剪，寿命可达数十年。且愈老开花越盛。春天发芽较晚，但萌动期很短。夏季花芽形成，秋天落叶较晚。

繁殖育苗

蜡梅的繁殖方法多，但应用较多的还是以其野生、种狗蝇蜡梅为砧木进行嫁接，这样可以保持原有品种的优良品质。而用播种所得的苗木其原有品种的优良特性会退化而成为种，因此只有作为砧木或培育新品种时才採用播种法。

1. 切接：春三、四月间清明节前后，当蜡梅的叶芽萌动到麦粒大小时进行，蜡梅的切接时间较短。约一星期左右，因蜡梅的叶芽从萌动到萌发展叶的过程很快，如不抓紧时机待叶芽萌发太后再嫁接就不易成活了。因此它为大量繁殖苗木带来了一定困

特種

难。但是我国的劳动人民在长期的栽培花木的过程中积累了非常丰富经验来解决这一困难。河南鄆陵的花农应用再发接芽和埋条的方法来人为地延長其嫁接时期获得良好的效果。其方法显：正当嫁接之时因人力不足，不能及时进行，可把作为接穗枝条上的芽抹去，而经过一星期左右，在原来的枝条上又发出了新芽，待其長到小米大小时就可进行嫁接了。这样的做法效果很好，往往比原来的芽嫁接的成活率还高些。原因是原来的芽萌发时，天气还较冷，成活性只受到一定的影响，而第二次发出的芽生长势很均匀，而且天气已较暖和，当然对接后的成活有良好的影响。另人方法显把接穗早些从树上采下来埋藏在地里，由于春天地温较温暖，所以芽的萌动较慢，故也可适当延長其嫁接时间。

老接法从生長强壯混雜优良的树上采取，选用一年生粗壯之枝条，为了使嫁接时接穗的芽都很充实均匀，应在嫁接前一个半月把预备作为接穗的枝条的顶端部份剪去。砧木应用径大1-1.5cm的胸径稍矮砧木，在离地3-5厘米处剪断或锯断，并用利刀削切光滑。接穗長约6-7cm，尚有1-2对芽即可。削接穗切口时不宜太深微露白色木质部即可。砧木的切口也不宜削得太深。对接形成层綫綫后，于外塗以泥漿或接蜡，然后用疏松的碎土把它一起盖住，壅成馒头形。过一月后可扒开松土帮助芽发出，把砧芽摘除，然后还要封些松土，以免嫩芽被风日晒而死。切接法繁殖比较难以成活，在苏沪一带应用尚不多，成活率仅达30-40%，而北京等地的花农应用更少，但是在河南鄆陵，却是主要的繁殖方法，成活率高者能80%以上。

二、靠接：为应用最广的繁殖方法，北京、上海、苏州等地主要都用此法。

靠接的时间不像切接那样要求严格，整年皆可进行，但以春天到四月靠接较好。砧木用径达1cm以上的3-4年生

芽生出或用其后繁殖方法而得的狗蝇蜡梅。事先要把砧木栽在作为接穗回本的蜡梅植株旁、接穗是用1~2年生的枝、能有分枝较好、砧木的接口要尽量低、其切口要比切接时所得直径达6~7cm。作接穗的枝条不离开母树、仅在何砧木的一侧削一砧木等长的切口。然后互相对准形成层、並縛紮牢固。外部塗以粘性泥漿、为防止被雨水冲掉、最好外面再包一层之类的防水材料、在条件许可的情况下用接蜡封固最佳。靠接时砧木接合以上部份要折断或折断、接口以下生出的砧芽应及时摘除、但如要砧木的上部为假主部切削去时也可以适当的留下数砧芽、这样对切口的互相愈合更为有利。约1月后砧芽生、2月后可以与母树切离、此时可以把砧木下部的枝芽全部摘除、如果砧木的顶端也已切离则砧木上部。切离母树后可就地不动、到秋天再移往他处或马上移植别处统一移植也可。在靠接时如接穗的枝条太高、可将砧木栽在花盆内、填土后并对其进行靠接、但应注意盆内常浇水、以免要干。在长江流域秋天也可进行靠接、但需要翌年春天才能与母树切离。靠接的成活率很高达90~100%。

以上两种嫁接方法中、切接较难成活率不很高、但植株生长较为旺盛、三年后即可成株出。而靠接成活率虽高、但其生长势较差、而且砧木靠接得高也影响美观。

3. 播种：狗蝇蜡梅很易结实、但一些优良品种的蜡梅往往结实较少或不结结实。用刺将苗茎作砧木用因此不论何品种都可用来播种、大男繁殖时常用狗蝇蜡梅的籽子。八九月籽子成熟后即可采收、晒干后剥去外壳、干藏至翌年春天、二到三月播种。在长江流域一批、当年秋后十一月播种也可。播种前用水浸之能使其发芽。一般採用条播、条播者行距约20~30cm、株距约6cm、覆土约2~3cm、冬播者可深些並要蓋稻草防寒、每畝播种量约1~30斤、播种地應排水良好、在江苏一批

部作成高床，播种后适当浇水，云南后可浇些稀粪水，当年能高达40~50 Cm，秋后或早春可移植，并把主根适当剪短，株行距60~x 60 Cm。播种后3—4年后即可用来做砧木。种子如果是隔年的（即采后第三年）则很少发芽。

4.分株：狗蝇蜡梅（或蜡梅的实生苗）的根茎部很容易产生蘖枝，而成丛生状，因此为分株繁殖创造了有利条件。在落叶后至春天芽萌动前都可进行分株，但最好还是在春天结合蜡梅的嫁接进行。如刀在萌芽变大了才移，否则会影响成活。其方法为在一丛狗蝇蜡梅的周围把土挖开，利刀劈开或割下一部分来，以带2—3枝一株为好，而带2—3枝较粗壮的则原地不动，然后封上土作为剪口切根之用。也可以把一丛狗蝇蜡梅全部挖出抖掉根土后进行分切、分栽，株行距约为60x 60 Cm。

在进行分株时不免要断下一些世根很久或不世根的老茎，可把它们收集起来，在茎下部蘸一下泥浆后栽在地里，这样也能生根发芽，但上述枝条必须是从根茎部断下的，并且有踵才能成活，否则不能成活。

另外，狗蝇蜡梅的一些老根、春天把它栽在土内，也可抽出新枝条来而成为新植株。

栽培管理

在我国华中、华南、华东都以露地栽培为主而在华北则作为名贵的盆栽，在北京有最好的小气候情况下也可以露地栽培。

一、露地栽培

腊梅性喜光耐寒，忌积水耐干旱，以排水良好、半瘠的酸性黄土为最宜。所以栽培时就要注意这些特性特点。但在露地栽培中，它还是要求比较粗放的栽培。

腊梅虽喜光，但也耐耐阴。对肥料没有特别要求，一般较好的土壤情况下，每年冬季或早春或结合移植施一次基肥即可。施肥可用条状或环状施肥法，在距干约3厘米处，挖约15厘米的浅沟，埋上1—2种腐熟的肥料，大槩。最好的方法是每次仅在相对的二面施肥，次年再在相对的另一面施，这样可防止因施肥时搅伤根而对植株产生不良影响。除此也可以和一般花木一样，在其他季节加施追肥。每次施肥后应浇一次水最好，日常浇水要看土地干湿情况而定。

露地栽培地区可以安全越冬但在华中北部（河南）因冬季寒风会影响开花期和开花多少，为使开花好可适当注意防风。北京地区一般在霜降时把土球取出假植在纸温室中或土窑中，“花窑”可挖深1.5—2米，上盖桑秸、干草和约30厘米的土，大小随需要而定，但不可过大（以宽约1.5—2米的长方形为宜），每个窑都凿有活动的小气孔，当天气暖时可在中午打开通气，除此也可以就地挖窑防寒。可在距根处挖土窑，高度等于植株高或较高，上面搭木架铺桑秸或草，并盖较厚的土，为了要保险在靠近风道的一面可用纸包腊梅主干，以防止干表皮冻裂。当天暖后打开窑时应随天气变化而先加强通气，而后逐步移至保护地栽培。打开窑后即可进行疏植、随时掘取植株另行栽植。

植株的移植起苗一定要带土团、土团大小随植株大小而定（一般20厘米直径已可）起出后若长距离运输，应包草保护土团，若土团破碎，可使其根蘸泥浆外面撒土再包。定植步骤同一般，即挖坑、上粪、栽植、浇水、封土。

二、盆栽：

为了冬季室内观赏，在花前移入盆中，冬季仅着情浇些清水即可，当花后则又移到露地，这样能使植株充分发育生长良好，并且减少了长期盆栽的处埋麻烦。

在华北地区常是作为名贵花木而盆栽。这时盆土要求是粪2分土3分相混。盆的大小依植株而定。每年清明当苗从保养地移出时即可上盆。上盆时盆内可施2两蹄片，上盆后要浇足水一次。

由于盆栽缩小了营养来源，同时每一个盆内栽植条件也容易发生变动，所以盆栽对肥、水、土的要求就较严格。

因上盆时植株刚由保养地移出，同时当时天气还较冷，所以前半個月应按植株高矮，排列放在向阳背风之处。随着天气变暖，生长越加强，这时的肥水供给也应相应增加。春季每天下午3~4点浇水一次。以后逐渐每隔4~5天浇“蹄片水”一次。伏天时，植物需水量大，并且此时华北常是热、干、热风，而这时正是花芽形成期，所以应更及时供应肥水。每天可在上午10点和下午3~4点时各浇一次透水（伏天时不上粪干，是因为这时正是发生新根，大粪会烧坏根，故改用蹄片水）。以上所述这些仅是大概规律，而具体每天浇多少还要看实际条件而定，如阴天浇水减少，晴天、刮风要增多，下雨时应把盆放倒以利排水，总之应“新湿新干”保持半墒。若水过大过小，则叶会萎白干边，花芽分化不良。三伏

后当叶子微下垂时、表示花芽已经形成、随着天气渐凉、浇水也减少、立秋时可上粪干一次、立促使将来开花好。

霜降时移入室内、免受霜害、否则受害会使花蕾脱落。当刚入室内时叶还未全落、需要浇水、叶落后进入冬季、应整盆土较干一些、过几天(7—8天)看情况浇些清水即可(花前、花期掌握水要适当、过大会使花蕾掉落、过小开花不香)冬季不应浇肥水、因植物不需要、同时粪水也有碍室内卫生。

盆栽者随着植株长大、每隔二年要换大号盆一次、在换盆栽植时、可有意识地去掉厚土团上部 $\frac{1}{3}$ 、使部分根外露、也是相对提高了栽植、促使下部生根、逐年作的结果可使老根外露、形成“悬根露爪”枝神态奇古。

蹄片水配法最、50斗蹄片、加50斗水、7—8天后与茅茅清水相混稀释、即可使用。

也可用肥水(腐熟粪稀1:水9)代替。