

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷九

彙方目錄

各篇證治有同用一万者方列於
主治篇檢方者須先查目錄也

太陽篇方

桂枝湯

麻黃湯

調胃承氣湯

列陽明篇

大青龍湯

真武湯

列少陰篇

小青龍湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二越婢一湯

桂枝二麻黃一湯

四逆湯

列少陰篇

甘草干薑湯

芍藥甘草湯

小建中湯

炙甘草湯

五苓散

文蛤散

柴胡桂枝湯

小柴胡湯

列少陽篇

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

陽明篇方

麻黃湯

列太陽篇

桂枝湯

列太陽篇

梔子豉湯

列汗吐下後篇

白虎加人參湯

猪苓湯

小柴胡湯

列少陽篇

四逆湯

列少陰篇

吳茱萸湯

列厥陰篇

五苓散

列太陽篇

白虎湯

黃連湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

麻仁丸

抵當湯

列太陽篇

蜜煎導法

土瓜根猪膽汁導法

少陽篇方

小柴胡湯

小建中湯

列太
陽篇

柴胡加龍骨牡蠣湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

合病并病篇方

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根加半夏湯

麻黃湯

列太
陽篇

大承氣湯

列陽
明篇

太陰篇方

四逆湯

列少陰篇

桂枝湯

列太陽篇

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

少陰篇方

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

附子湯

四逆湯

白通湯

白通加膽汁湯

通脈四逆湯

真武湯

通脈四逆加膽汁湯
四逆加入參湯

吳茱萸湯
列厥陰篇
四逆散

半夏散及湯
苦酒湯

桃花湯
大承氣湯
列陽明篇

抵當湯
列太陽篇

厥陰篇方

茯苓甘艸湯
列汗吐下後篇
當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

小柴胡湯

列少陽篇

白頭翁湯

小承氣湯

列陽明篇

梔子豉湯

列汗吐下後篇

烏梅丸

干薑連芩人參湯

麻黃升麻湯

汗吐下後誤治諸證篇方

桂枝湯

列太陽篇

桂枝加附子湯

真武湯

列少陰篇

芍藥甘草附子湯

桂枝去芍藥生薑新加人參湯

一方加芍藥生薑證治條下已申明

調胃承氣湯

列陽明篇

茯苓桂枝甘艸大棗湯

桂枝甘艸湯

禹餘糧丸

論中缺

柴胡桂枝湯

列太陽篇

麻黃杏仁甘艸石膏湯

五苓散

列太陽篇

茯苓甘艸湯

厚樸生薑甘艸半夏人參湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚樸杏仁湯

葛根黃芩黃連湯

四逆湯

列少陰篇

小柴胡湯

列少陽篇

大承氣湯

列陽明篇

梔子豉湯

梔子甘艸豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚樸湯

梔子干薑湯

茯苓桂枝白朮甘艸湯

柴胡桂枝干薑湯

茯苓四逆湯

干薑附子湯

桂枝去桂加苓朮湯

白虎加人參湯

列陽明篇

小承氣湯

列陽明篇

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

結胸痞證篇方

大陷胸湯 有二方

大柴胡湯 列少陽篇

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘艸瀉心湯

生薑瀉心湯

十棗湯

旋覆代赭石湯

理中丸及湯

赤石脂禹餘糧湯

五苓散

列太
陽篇

桂枝人參湯

差後復陰陽易病方

枳實梔子豉湯

小柴胡湯

列少
陽篇

牡蠣澤瀉散

理中丸

列結胸
痞證篇

竹葉石膏湯

燒裨散

竹葉青

樂善堂

林明一

書中

財寶耐于短

小英

美對真劍

正谷

詩人

歐中

武

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷九

張仲景先師原文

會稽虛谷章楠編註

冀子陳祖望

山陰

校訂

太陽篇方

桂枝湯

桂枝

三兩

芍藥

三兩

甘艸

二兩

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

右五味，㕮咀，以水七升，微火煮，取三升，去滓，適寒溫，服一升，服已，須臾，啜稀熱粥一升餘，以助藥力。溫覆令一時許，遍身漰漰微似有汗者佳，不可令大汗如水淋漓，病必不除。若一服汗出病差，停後服，不必盡劑。若不汗，更服，依前法。又不汗，小促役其間，半日許，令三服盡。若病重者，一日一夜服，周時觀之。服一劑盡，病證猶在者，更作服。若汗不出

者乃服二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

余按論中每言當發其汗宜桂枝湯則是無汗者
可使其發汗也又曰發熱汗出者此爲營弱衛強
故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯則是有汗者又
可使其收汗也又曰桂枝本爲解肌若脈浮緊發
熱汗不出者不可與勿令誤也則是無汗者不但
不能使其發汗且恐誤用爲害也何其一方之功

用而各相悖有如是耶。歷來解者雖明其所當然。總未表出其所以然。爲因義理精微有難言喻者也。學者不知其所以然。則當用而不敢用。不當用而誤用。或見有誤用之害者。於是置之而不用。遂將至妙至神之法。永遠埋沒。可不惜哉。余始畧言其所以然。以質夫君子。不知有當於理否。經曰。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。則是一