


病
理
撮
要

光緒十八年新鐫

病理撮要

羊城博濟醫局藏板

甲



乙

丙



丁

戊



己

甲圖

正面各圖解說此乃溺內墜質等等之
a字處血輪常見之形 b字處血輪變樣 c字處
喇叭輪 d字處肺質之現於痰者 e字處膿輪

各樣溺酸之形

乙圖

a字處輕淡溺酸鹽 b字處鎳溺酸鹽之規 c字

處鎳溺酸鹽之規

平常諸式之輕淡鎂燐養鹽

丁圖

a字處銻惡西鹽而 b字處西國玩椎式之銻惡

西晶 c字處噁吐沃

己圖

a字處膚脫模 b字處油脫模 c字處砂粒脫模

d字處大小蠟脫模

由肉砂取出之珠形

第二圖

脈管舊發炎變脂之形 新長之質乃見於內衣深層

且緣此而致之內脹團亦見於此圖之沈色處乃新質

之已變軟而如瓢者於圖之下處見有數條中衣最裏

之線比原來加大廿五倍

第三圖

腎間管炎勢新而時早之形 是圖繪出珠之攪入間


管質內於是患深進之級間管質便與山壤變而有

之砂粒脂膏等碎屑混和及當患最深時近邊皮之管


便見有許多筋質處於其間且管亦大消竅矣



第一圖



第二圖



第三圖

第四圖

氣管癒毒炎之形 是圖繪出一截小氣管而證乃患氣管炎兼有顯癰終成小粒嘍吡咖者於氣管衣深層之質便見有多珠攪入此等之珠強半大於平常之好炎攪入較少之珠圖之上處乃見附連之氣窩衣爲炎延及卍字處乃氣管之穴內藏少許之涕比原來加大二百倍收小一半


第五圖

新嘍吡咖證之形 此乃由肺取出之一堅實灰嘍吡咖此嘍吡咖乃見處於氣窩間而氣窩之形殊無弊患 比原來大三十三倍

第 四 圖



第 五 圖



第六圖

新嘑吡咖證之形 此乃由肺取出之一黃嘑吡咖
於此團近外皮之處便見氣窩內積藏之質當中處
乃壞變也 比原來大三十三倍

第七圖

新嘑吡咖證之形 乃由肺取出之一黃嘑吡咖最
外處一小片 $\cup$ 字處_{最外}乃見氣窩有膚珠充實 $\cap$ 字
處_{最內}氣窩之衣與其所載之膚珠俱呈壞變之形 $\subset$
字處_當壞變已深無絲毫質存氣窩之衣爲小珠之
質所變厚有一處可見一小團如是之小珠質焉


第八圖

胰膜一小粒嘑吡咖之形 兩 $\cup$ 字處爲微絲血管

第七圖



第八圖



第九圖

變膏肝經之形

繪出珠之攪入間隔小葉之帶內

△字處肝葉中脈管兩∩字處肝迴管或曰葉中迴管兩P字處四合血管兩G字處膽管 比原來大

三百倍

第十圖

膚壞變如脂之形

a字處乃珠內含小點之脂b

字處乃砂粒輪有一其顚尙可見C字處爲解體輪

第十一圖

脈管內衣連網珠壞變如脂之形

比原來大三百

倍

第十二圖

脂油入肌之形

a字處爲消廢之肌線b字處爲

間隙之脂油珠

比原來大三百倍


第九圖




第十圖



第十一圖



第二十圖



第三圖

脂油入肝之形

此圖略爲刻畫而非天真繪出脂油之積於小

葉外帶V字處爲肝迴管兩P字處爲肝葉中之四合血管

第四圖

脆骨或名曰韌其變鈷之形 繪出間珠質之變爲


鈷 比原來大三百倍

第五圖

色質入珠各級之形 α b c 三字處之珠乃由一

黑癰取出者 α 字處乃血管之已着色膚同由該癰取者繪明珠內之質已爲色所染惟其顆與圍未變 e 字處乃一毬自由之色珠


圖三十第



圖四十第



圖五十第



第十六圖 採煤者之肺形 於此可見氣窩衣及間葉質內俱

有炭碎

第十七圖 筋質癰之形 比原來大二百倍

第十八圖 涕癰之形 比原來大三百倍

第十九圖 舊肺癆證肺內所長之似核質形 比原來大二百倍


第二十圖 吸核毒癰之形 此乃由肺峽所長者割出一薄片

第二十一圖 吸核毒癰之形 此亦同是二十圖之一片惟將珠


剔去大半以顯其結網此結網比平常者格外較現

比原來大二百倍


圖六十第



圖七十第




圖八十第



第十九圖



第二十圖



圖一十二第



第廿二圖
第廿三圖

圓珠肉癰之形 比原來大二百倍
腦連網圓珠肉癰之形 此乃由長於小腦者割
出之一薄片也 比原來大二百倍 此種癰之

第廿四圖

珠極其小而圓 函於一幼緻間珠質所成之結網
內而由顱腦筋鞘發起
乳之核癰形 繪出其小囊之鋪排如一毯葡萄
及囊之有膚珠觀裏 比原來大三百倍

第廿五圖

長足之呀吵質形 繪出珠之結聚於一筋質經
緯而無間珠之質於b字處便見此筋質經緯所

第廿六圖

成之空間地無珠在內者
乳硬癰之形 此乃癰最外處之一薄片顯出毯
毯之小而不好不壞珠較外處又見有膚之原質

第廿七圖

長於經緯之窩內焉 比原來大三百倍
乳硬癰之形 乃較近中處之一薄片表露其疤
質蓋癰之時日久處乃是質所成也


第廿八圖

硬癰之形 表露起初變成疤質同時顯出此種
呀吵其經緯與珠如何因連

圖 四 十 二 第



圖二十二第



圖三十二第



圖 七 十 二 第




圖 五 十 二 第




圖 八 十 二 第



圖 六 十 二 第

