

全国中草药新医疗法展览会  
技术资料选编

(肿 瘤)

江苏省镇江市革命委员会生产指挥组科技组翻印

一九七一年十月

## 毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。  
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

## 前 言

在无产阶级文化大革命伟大胜利的推动下，在党的“九大”精神鼓舞下，我国医药卫生战线形势一派大好。广大医药卫生人员高举毛泽东思想伟大红旗，狠批叛徒、内奸、工贼刘少奇的反革命修正主义卫生路线，坚决落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示，涌现出许多认真学习毛泽东思想的先进集体和先进事迹，各项工作取得了很大的成绩。

毛泽东思想的光辉照亮了我国医疗卫生事业发展的道路。当前，我国广大城乡，以除害灭病为中心的爱国卫生运动，波澜壮阔，滚滚向前；深受贫下中农欢迎的合作医疗制度不断巩固和发展；数以百万计的“赤脚医生”队伍在毛泽东思想哺育下茁壮成长。遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的伟大教导，在各级革委会的领导下，在解放军的带动下，广泛开展了用中草药、新医疗法防治常见病、多发病的群众运动。在群众运动中，广大医药卫生人员运用毛主席的哲学思想指导医疗实践，发掘、继承祖国医学遗产，走中西医结合的道路，创造了世界医学史上旷古未有的奇迹。这是无产阶级文化大革命的丰硕成果，是毛泽东思想的伟大胜利！

在这一伟大胜利的凯歌声中，“全国中草药新医疗法展览会”于一九七〇年十二月在北京举行。

为了满足广大群众的需要，我们将全国各地报送展览会的有关技术资料选编成册（按内容分成若干分册，在展览期

間陸續发行，最后汇成总集），以便于广大工农兵群众、“赤脚医生”和革命医务人员交流经验，进一步在三大革命运动中总结提高，为創造中国的新医学、新葯学而奋斗！

由于我们认真学习毛澤东思想不够，选編工作中定有不少錯誤和缺点，希望同志們批評指正。

全国中草药新医疗法展览会

一九七〇年十二月

## 编辑说明

一、本《选編》广泛地选載了全国送展材料中的技术資料。为了便于交流，我们注明了材料来源（有的省、市沒有报具体单位，只能注以省、市名）。

二、为了便于推广，防止同名異物、同物異名而用錯药，我们根据送展标本进行了植物鉴定，并在相应的材料末尾注以学名（未送标本者，暫缺，一般常用中药不加注）。

三、东北三省所报材料中的中草药剂量用的是十两制，我们是照原样收載的，請使用时注意。

# 目 录

|                  |        |
|------------------|--------|
| 一、中草药治疗肿瘤        | ( 1 )  |
| (一) 良性肿瘤         | ( 1 )  |
| (二) 恶性肿瘤         | ( 3 )  |
| 1. 多种恶性肿瘤        | ( 3 )  |
| 2. 脑瘤            | ( 11 ) |
| 3. 鼻咽癌、上颌窦癌      | ( 13 ) |
| 4. 肺癌            | ( 16 ) |
| 5. 食管癌           | ( 18 ) |
| 6. 胃癌            | ( 23 ) |
| 7. 肝癌            | ( 24 ) |
| 8. 胰腺癌           | ( 29 ) |
| 9. 皮肤癌           | ( 30 ) |
| 10. 乳腺癌          | ( 33 ) |
| 11. 宫颈癌          | ( 34 ) |
| 12. 绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎 | ( 39 ) |
| 13. 骨肉瘤          | ( 42 ) |
| 14. 白血病          | ( 42 ) |
| 二、新医疗法治疗肿瘤       | ( 47 ) |
| 1. 新针疗法          | ( 47 ) |
| 2. 割治疗法          | ( 47 ) |
| 3. 卤硷疗法          | ( 51 ) |
| 4. 免疫疗法          | ( 51 ) |
| 三、抗癌新药           | ( 54 ) |

## 一、中草药治疗肿瘤

### (一) 良性肿瘤

**主治：**血管瘤、脂肪瘤。

**方药：**鲜山茨菇块根，磨溶于三花酒中。

**用法：**外涂，每天三至四次。

**病例：**周××，7岁。1966年5月发现右侧颈部有一小指头大肿块，经广州中山医学院确诊为右颈部血管瘤。同年9月用上方外敷七天，半月后肿物消失。

**材料来源：**广西钟山县抗大中学。

**注：**山茨菇为防己科植物青牛胆（箭叶金果榄）*Tinospora sagittata* Gagnep.

**主治：**甲状腺腺瘤。

**方药：**痈子草适量。

**制法：**捣烂，加隔夜粥适量混合。

**用法：**敷患处，每晚敷一次。

**病例：**刘××，女，成年。1969年3月发现颈部有一肿物如鸡蛋大，逐渐增大至衣领不能扣，××医院诊断为甲状腺腺瘤，按上方外敷七次，肿块缩小，半个月后痊愈，迄未复发。

**材料来源：**广西梧州专区藤县壤南公社。

**注：**痈子草为报春花科植物 *Lysimachia* sp.

**主治：**乳房纤维瘤、多发性神经纤维瘤。

**方药：**半枝莲、六耳棱、野菊花各一两。

**用法：**水煎服。

**病例：**(1)×××，女，40岁。1969年发现两侧乳房有拇指大至核桃大肿块数个。经广西医学院病理切片诊断为“乳房纤维瘤”。服上方三剂后疼痛减轻，肿块缩小。继续服上方加蓝花柴胡、细金不换各五钱，共服20余剂，肿块消失。

(2)×××，女，19岁。患病已十余年，经广西医学院病理科诊断为“多发性神经纤维瘤”，1970年初服上方五剂后疼痛减轻，继服上方加归尾四钱，象皮（先下）、山甲各三钱，蜈蚣两条，全蝎二钱，共服30余剂，肿块明显缩小，疼痛消失。

**材料来源：**广西南宁反修医院。

**注：**六耳棱为菊科植物六棱菊 *Laggera alata* Sch.-B  
1P.

**主治：**子宫肌瘤。

**方药：**桂枝、桃仁、赤芍、海藻、牡蛎、鳖甲各四两，茯苓、丹皮、归尾各六两，红花二两五钱，乳香、没药、三棱、莪术各二两。

**用法：**共研细末，蜜丸三钱重，每次服一至二丸，每日服二至三次。

**病例：**金××，女，42岁。于1962年1月起阴道出血淋漓不止，小腹坠痛。1964年5月经××医院诊断为子宫肌瘤，子宫大如二个月妊娠。服上药，每次一丸，日服三次，持续服药一年，月经正常，肌瘤消失。

**材料来源：**甘肃省中医院。

## (二) 恶性肿瘤

### 1. 多种恶性肿瘤

**主治：**胃癌、食管癌、肝癌、直肠癌等。

**方药：**(1)并头草、半边莲、黄毛耳草、苡仁各一两，天胡荽二两，白玉簪花根五分。

(2)白花蛇舌草、茅根各二两半，苡仁一两，红糖三两。

(3)白花蛇舌草二两半，苡仁一两，黄独(黄药子)三钱，乌梅二钱，龙葵一两，乌药一钱，田三七粉五分。

**用法：**水煎服。

**病例：**1. 吴××，男，42岁。诊断为胃窦部癌入院，于1969年11月12日行剖腹探查，因广泛转移未能切除癌肿，经用环磷酰胺两个疗程，服方(2)和方(3)，五个月后再次剖腹探查，发现癌肿局限。术后继续服药巩固疗效，体重增加13斤。

2. 黄××，女，49岁。1968年2月行乳癌根除术。1970年2月，感到右季肋胀痛，超声波见肝区出现束状波，同位素扫描提示肝左叶转移性肝癌。经用上方治疗两个多月，配合化学疗法，肝脏缩小，肝痛消失，超声波及同位素扫描均无异常，体重由110斤增至116斤，患者出院重返工作岗位。

**材料来源：**江西省南昌市第二医院。

**注：**(1)并头草为唇形科植物狭叶韩信草 *Scutellaria rivularis* Wall.

(2)半边莲为桔梗科植物 *Lobelia radicans* Thunb.

(3)黄毛耳草为茜草科植物 *Oldenlandia chrysotricha* (Palibin) Chun

(4)天胡荽 为伞形科植物 *Hydrocotyle sithorpioides* Lam.

(5)白玉簪花为百合科植物 *Hosta plantaginea* Aschers.

(6)白花蛇舌草为茜草科植物二叶葎 *Oldenlandia diffusa* (Willd.) Roxb.

(7)黄独为薯蓣科植物 *Dioscorea bulbifera* L.

(8)龙葵为茄科植物 *Solanum nigrum* L.

**主治：**恶性肿瘤及急性淋巴细胞性白血病。

**方药：**喜树硷。

**用法：**喜树硷注射液每天以 10~20 毫克 注射，10~14 天为一疗程，以后每三天注射一次作维持量，本药对血象影响较小，一般在用到140~160毫克时可能出现白细胞下降，但下降速度较慢。

**疗效：**治疗恶性肿瘤及急性白血病患者共 20 例，其中 1 例肝癌，2 例胃癌及 2 例急性淋巴细胞性白血病患者，获得显著的疗效。

**病例：**(1)苏××，女，48岁。晚期胃癌，入院时检查：腹部肿块 14.5×6 厘米，稍能活动，质硬，表面结节状。X 光片胃大、小弯部均见明显充盈缺损，肿块与四周紧密粘连。病人一天只吃二两，恶液质，卧床不起。用喜树硷治疗，每天静注一次，每次 10 毫克。总量达230毫克。腹部肿块基本消失，X光片示：整个胃腔已清晰显示，无大块充盈缺损，胃窦部已显影，但较僵硬。一天饭量一斤二两，能随意活动。

(2)李××,男,8岁。患急性淋巴细胞性白血病。入院检查:颈部及二侧腹股沟浅淋巴结似绿豆大小,肝脾肿大,均在肋下2厘米,中等硬,少量皮下出血点。血象:红细胞320万,血色素54%,白细胞2900,中性28%,淋巴71%,异形细胞3~5%,血小板98000。骨髓象:原始细胞4.5%,诊断为急性淋巴细胞性白血病。以喜树硷5毫克静脉注射,每天一次,合用强的松治疗。疗程结束时,肝脾缩小,淋巴结不能触及。血象:红细胞334万,血色素81%,白细胞7000,中性57%,淋巴42%,血小板10万。骨髓象:缓解。

材料来源:上海市长宁区中心医院,上海市第十制药厂,上海市南昌药厂,中国科学院药物研究所。

注:喜树为珙桐科植物 *Camptotheca acuminata* Decne.

主治:多种癌瘤。

方药及制法:取卤水1000毫升、乌梅27个,放于砂锅或搪瓷缸内,煮沸后细火持续20分钟左右,放置24小时滤过备用。

用法:成人每天六次,每次3毫升。饭前、饭后各服一次(开始每次2毫升逐渐加至3毫升。初服可有轻度腹泻或癌瘤局部疼痛加剧的现象,无须处理可自愈。不能耐受者可减少次数或剂量)。对体表癌如阴茎癌、宫颈癌等可同时用做擦剂。

疗效:观察52例,除6例淋巴肉瘤无效和1例治疗中断外,其他45例均有效。一般服药一个月后症状减轻,2~4个月症状明显消减,癌瘤缩小。较大癌瘤术前服药可为手术创造条件,如瘤体缩小、减少出血、改善症状等。

**病例：**刘××，男，37岁。两年来尿痛，排尿困难，继之龟头肿胀坚硬，失去知觉。检查：包茎，龟头肿大约5×4×4厘米，切除包皮见肿物呈菜花样，恶臭，癌组织浸润到冠状沟，尿道口消失在菜花样癌组织中。取活检病理诊断为鳞癌。内服乌梅卤水每次2.5毫升，日六次；局部洗涤每日一次，每次半小时，共治三个月。肿瘤与正常阴茎部分逐渐分离，界线分明。在局麻下切除肿瘤部分，次日出血不止，用乌梅卤水压敷而止血，切口愈合，恢复健康，并已参加劳动。

**材料来源：**中国人民解放军291医院、内蒙古包头市肿瘤防治研究所。

**注：**(1)乌梅卤水已制成丸剂、针剂、软膏等各种剂型。  
(2)服药期间禁吃红糖、白酒、酸、辣等刺激性食物。

**主治：**食管癌及其他多种肿瘤。

**方药：**火硝、明矾、水银各一两，炼制即得。

**用法：**每7~10天服药一次，每次0.4~1克。于清晨空腹用少量开水送下。服后大多数患者有吐泻反应，轻者当天可恢复，重者2~5天即可恢复，一般不需任何处理，严重者可对症治疗。部分患者服药后可有头晕、耳鸣、上腹不适、口腔炎等反应，偶有过敏性皮疹。

**材料来源：**天津市王串场中医院。

**主治：**直肠癌、鼻咽癌、溶骨肉瘤、胃癌。

**方药及制法：**抗癌丸(内服)：丹、琥珀、山慈菇、白及、山药各十两，田七二十两，牛黄六两，黄连、黄芩、黄柏各五两，陈皮、贝母、郁金各二两，桑椹、甘草、银花、黄

芪、蕲蛇各三两，犀角三钱。

注：丹方：明矾、牙硝、水银各二两，煨皂矾一两，朱砂五钱。将上药共研细末，以不见水银为度，盛入生铁锅内用大磁碗覆盖，碗上加压，碗周围以石膏粉密封，然后按一般炼丹法，先交火后武火，火力均匀，进行锻炼三小时，离火待冷，揭开碗盖，碗面上附着的粉末即丹，以红而亮者为上。取下丹粉为赋形剂，做成片剂，每片含丹一厘，凉干收贮备用。

散血膏（外用）：南星、防风、白芷、柴胡、土鳖虫、自然铜、全皮各三钱，升麻二钱，猴骨、龙骨、桂皮各六钱，细辛、荆芥、当归、甘草各二钱半，丹皮七钱，续断三钱半，风藤四钱，黄芪一两三钱，附子、遍地红、过山龙各五钱，红丹十六两，香油三十二两。

先取麻油置火上煎熬，加硬药煎枯，再加丹成粘稠状，离火待温度下降后，涂于牛皮布上即得。

用法：每次服一丸，每日二至三次，饭后服。一个月为一疗程，4~6个月为治疗期。每疗程结束可停药一周。服药后偶有口腔炎等症，可减少用量，或暂停数日。

禁忌：少吃葱、蒜、浓茶，禁食鸡、鲤鱼、牛肉、母猪肉。

病例：（1）朱××，女，34岁。大便困难，细如牙膏状，1963年9月入院，体重65市斤，直肠镜检和肛诊检查发现离肛门6厘米处有白色高低不平的新生物突出肠腔内，呈环状狭窄，仅见0.4厘米的腔隙，接触出血，活检证实为“直肠恶性肿瘤”，服上述抗癌丸两个多月，癌块溃烂，大便渐好，出院后继续治疗达两年，迄今七年，完全恢复健康。

（2）刘××，男，47岁。1958年4月开始觉左下肢痠痛

日益加剧，大腿上端肿大如儿头，坚硬，压痛，皮肤变黑发亮，浅静脉怒张，运动受限，经X光检查发现“左股骨上三分之一有明显骨质破坏，为溶骨状改变，合并有骨折，远端向上移位”，诊断：左股骨上端溶骨性骨肉瘤。住院后服抗癌丸，并外贴散血膏，治疗四个多月基本治愈，回家继续用药，1970年复诊。患者一日步行八十余里，挑重一百多斤，无不快感，除患肢较短外，一般情况良好。X光片显示骨质密度增加，骨轮廓更为清晰。

材料来源：江西井冈山专区人民医院。

**主治：**多种恶性肿瘤和白血病。

**方药及用法：**抗毒合剂：金牛根、丁葵草、蛇泡筋、铁包金、韩信草、寮刁竹、枝花头各一两，白茅花五钱。

**敌癌片：**枝花头、金牛根、穿心莲、大叶蛇总管、蛇舌草各二斤，急性子、水蛭各半斤，寮刁竹、韩信草各一斤，蟾蜍260只，壁虎260条，蜈蚣260条，共为细末，和猪胆汁、马蹄粉(荸荠粉)为细丸。每天服三次，每次三钱。

**外用消癌散：**细叶七星剑、芙蓉叶各二斤，金牛根三斤，土半夏、穿心莲、生半夏、生南星、韩信草、生梔子、生川乌、生草乌、一枝箭各一斤。共研细末，适量蜜调外敷患区或水煎作溃疡面清洗、阴道冲洗等。

**·抗癌毒注射液：**入地金牛根、穿心莲、枝花头各等量，将其制成灭菌注射液。

**蟾蜍注射液：**以活蟾蜍刮取耳后腺体分泌物，按生物硷提制灭菌注射液，供肌肉注射用。

**作用：**“抗毒合剂”、“敌癌片”有解毒散结止痛作用。“消癌散”外敷患区，有散结止痛，促进局部病灶消减

作用。“抗癌毒注射液”止痛消炎作用较明显。“蟾蜍注射液”有一定止痛解毒作用。

**疗效：**无选择地在门诊治疗鼻咽癌、肝癌、直肠癌、舌癌、骨肉瘤、食道癌、胃癌、甲状腺癌、乳腺癌、白血病等各种不同病期的患者200例。其中显效47例，占23.5%；稳定88例，占44%；无效12例，占6%；不明38例，占19%；死亡15例，占7.5%。

**病例：**庞××，男，53岁。1969年诊断为肝癌，经用中草药、抗毒合剂治疗，一个月后症状消失，体重增加，体力恢复，1970年4月广州华南肿瘤医院诊断为肝癌治愈。

**材料来源：**广东佛山中医院。

**注：**(1)金牛根(入地金牛)为芸香科植物两面针 *Zanthoxylum nitidum* (Lam.) DC.

(2)丁葵草为豆科植物 *Zornia diphylla* (L.) Pers.

(3)蛇泡簕为蔷薇科植物茅莓 *Rubus parvifolius* L.

(4)铁包金为鼠李科植物细纹勾儿茶 *Berchemia lineata* (L.) DC.

(5)韩信草为唇形科植物 *Scutellaria indica* L.

(6)寮刁竹为萝藦科植物徐长卿 *Pycnostelma paniculatum* (Bunge) Schum.

(7)大叶蛇总管为蓼科植物虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.

(8)蛇舌草(白花蛇舌草)为茜草科植物二叶葎 *Oldenlandia diffusa* (Willd.) Roxb.

(9)穿心莲为爵床科植物 *Andrographis paniculata* Nees

(10)土半夏为天南星科植物犁头尖 *Typhonium divar-*

icatum (L.)Decne.

(11)芙蓉为锦葵科植物木芙蓉Hibiscus mutabilis L.

(12)一枝箭为菊科植物一枝黄花 Solidago virgo-au  
rea L.

**主治：**食管癌和其他癌瘤。

**方药：**铁甲军六两，百草霜、三棱、文术、灵仙各四两，杏仁、炒木鳖子仁各五两，生硃砂、乌梅肉、内金、硼砂、轻粉、木通、滑石、川军、枳实、桃仁、铅粉、芡米各三两，巴豆仁、黑豆、绿豆、乳香、急性子、儿茶、乌贼骨、斑蝥、沉香曲、元胡各二两，雄黄、木香、朱砂、浮石、血竭、川朴、指甲、白芥子、九香虫各一两，蟾酥三钱。

**制法：**共研细末，制成蜜丸，每丸重三钱。

**用法：**每次服一丸。

**材料来源：**天津市第二防治院东兴市场防治所。

**主治：**宫颈、阴道、肛管、直肠等癌。

**方药：**儿茶一钱八分，乳香、没药各一钱五分，冰片二钱五分，蛇床子七分，轻粉一钱，蟾酥二分，硼砂、三仙丹、雄黄各二钱，血竭一钱五分，白矾九两。

**制法：**将上药各为细末，先将白矾用开水溶化，最后加蛇床子、蟾酥、血竭制成一分钱币大小的药片。

**用法：**外用。每次一片放癌组织处，隔2~3天换一次。

**材料来源：**四川省灌县半农半医毛泽东思想学习班。

**主治：**食管癌、胃癌、直肠癌、宫颈癌、鼻咽癌。

**方药：**莢莢。

**用法：**取菝葜的块状根茎洗净切片，晾干，将干品一斤至一斤半浸入六至七斤水中一小时，连同浸液文火煎三小时，去渣，加肥肉一至二两，再煎一小时，得浓煎液二小碗（约500毫升），于一天内多次饮服。

**病例：**陈××，男，59岁。进行性吞咽困难，仅能吃流质或半流质。胸背疼痛已一个月，经X光检查，诊断贲门癌。1969年5月入院，同年7月开始用上药治疗，服药一周后，吞咽较为顺利，胸部疼痛减轻。治疗二月，可食干饭及馒头。迄今一年，X光复查病变稳定，病人精神良好，已参加轻微劳动。

**材料来源：**福建省福州市第一医院。

**注：**菝葜为百合科植物Smilax faurei Levl.

## 2. 脑 瘤

**主治：**脑瘤及各种肿瘤。

**方药及制法：**(1)安庆消瘤散：老生姜、雄黄各等分。取老生姜除掉叉枝，挖一洞，掏空，姜的四周留约半厘米厚，然后装进雄黄粉末，再用挖出的生姜末把洞口封紧，放在陈瓦上，用炭火慢慢焙干，约七、八小时，焙到金黄色，脆而不焦，一捏就碎时，即可研粉，通过80目筛子，将筛下之粉，装进密闭瓶内备用。

(2)安庆膏药：芝麻油十二斤六两，铅粉五斤半。

先将麻油放进铁锅里用武火加温至起泡，不停搅动，扇风降温，至满锅全是黄泡时，即取下稍放片刻，再置火上加温，约300℃，在冷水中使麻油能滴水成珠时，取下稍冷片刻，再放火上，将铅粉均匀缓缓倒下，以木棍不停搅动，直到满锅都是深金黄色大泡时，即取下继续搅动数分钟，取冷