

濟陰綱目

上海錦章書局
出版

濟陰綱目卷之十三

關中 武之望叔卿父輯著 白嶽 趙文煒子烜氏訂正

西陵 汪 淇憺濟子菱釋 天都 查 望子周父恭閱

○產後下

○虛煩

凡產後血虛氣無所附則逆而為大火上逆而乘血迫之則心煩矣重便濁陰也其味苦鹹寒其性就下降火清熱故宜服之所謂濁陰出下一也

薛氏曰四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤効論見發熱條陳氏曰尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

金黃散 治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索 蒲黃各半 桂心二錢 右為細末烏梅煎湯調下二錢

荷葉散 療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉一兩七錢半 延胡索二兩 地黃汁二合 右用水二升煮二味取六合下延胡索分三服空心服忌肉食一日

川芎散 療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛

川芎 生乾地黃 白芍 枳殼各等分 右為末酒調方寸匕日二服

集驗方 產後血氣煩悶 生地黃汁 清酒各二升 右二味相和煎一沸分為兩服

經効方 治產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿

當歸 川芎 桂心 吳茱萸 陳皮 生薑各一兩 白芍二兩 右咬咀以水三升煮取一升去滓空心服

沒藥 治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥 蠻薑 延胡索 當歸 乾漆炒 桂心 牛膝 杜皮 乾薑各等分 右為細末醋煮麴糊丸如桐子

此方清新簡切 以上四方看一方有一方妙用細玩之真如不道上行令人便知去病宜溫所謂寒者熱之留者行之也 以煩二字似不宜用氣藥到惡血不快便是瘀血衝心而如此溫行破血藥

大煎麴湯下十丸至十五丸 產後下 虛煩

必不可少也又為

論其煩而不用藥

連續數方各呈如

如化工天巧有難

此數方又有淡莊

桂之致

藕汁竹瀝煎俱治

唇清火則同而破

陳白梅消黃生炎

人皆能之而羊血

用誠有奪天之功

方有集方者均獲

無遜矣

此方以四物去川

芎藭其散氣也用

助其止汗也但與

藥等分亦須斟酌

以梗米竹瀝之治

心煩短氣之良法

血熱加生地尤佳

肉桂所當去也

此方以多補心參

門竹葉除煩甘草

東益氣安其一伊

治血氣煩悶雜方 生藕汁飲二升効竹瀝亦得

一方陳白梅搗碎煎湯飲○一方用蒲黃隔紙炒每服一錢東流水煎湯下○用失笑散亦佳

一方瘰癧後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕用羊血一盞頓服若不定更服立効

以上治餘血奔心之劑

人參湯歸湯 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內渴以致心煩短氣自汗頭痛

人參 當歸 熟地黃 門冬 肉桂 白芍 藥 右用水二鍾 粳米一合竹葉十片煎至一鍾食

遠服○血熱甚者加生地黃二錢

竹葉湯 治產後短氣欲絕心口煩悶

竹葉 麥門冬 小麥 甘草 生薑 右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去渣納餘

藥煮取三升去渣溫服○虛悸加人參二兩○少氣力加糯米五合

甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹 人參 麥門冬 茯苓 甘草 黃芩 右咬咀以水六升煮取二升去渣分三服日

三

雞白湯 治產後胸中煩熱逆氣

雞白 半夏 人參 甘草 括蕁根 麥門冬 熱甚加知母石膏 右咬咀以水一斗三升煮取四

升去滓分五服日三夜二

芍藥梔鼓湯 治產後虛煩不得眠

芍藥 梔子 香豉 右用水二鍾半先煮前三味得二鍾內香豉煮取一鍾半去滓分二服溫服

白芍 當歸 梔子 香豉 右用水二鍾半先煮前三味得二鍾內香豉煮取一鍾半去滓分二服溫服

此雖雲岐法不若

仲景酸漿湯穩當

○以上治血氣虛煩之劑

仲景二物黃芩湯 婦人在草褥自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

原方出自仲景雖白

半夏所以治逆氣括

蕁根參門所以治煩

熱人參甘草補虛和

毋石膏之加非熱其
不用蓋為血虛所忌

仲景治陽虛虛煩不
眠有枝子散湯而進

以白芍當歸者乃皆
以虛傷寒法以治產

後也久當謂傷寒方
可通於雜症有是哉

要在風字上者以頭
痛不痛為法

此大苦寒之劑劑與
後非宜意者其病成

煩數要以但煩二字
上休貼

中虛症不可用石膏
煩數症不可用桂枝

而此方以甘半七
配藥六分又以參

而為九仍以一九飲
下可想見其立方之

之不用藥之難審虛實
之不易也仍飲者尤

慮夫虛虛之禍耳用
是方者亦當深察

若謂去血過多而用
宜便以治虛大是也

而以四物治虛則川
芎之能平散乎

以胃氣虛而渴用白
宜矣而以血虛用

白亦難信也必血
虛之氣弱者乃可

按用藥半也此方
分兩有法讀者不可

輕故過

真人以天地之心為

心故其方亦以雲行

雨施之道為藥此方

以治渴補虛之藥方

分為君而又以參

黃芩一苦參二乾地黃四 右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

竹皮大丸 治婦人產後中虛煩亂嘔逆安中益氣 生竹茹 石膏各二桂枝 白薇各一甘草泔 右五味為

末棗肉和丸如彈子大以飲服一丸日三夜二服 有熱倍白薇 煩喘加栝實一分

○以上治中風煩熱之劑

經驗方 治產後煩躁此重可去怯之義 禹餘糧一枚狀如酸餡者入地理一半四面鑿藥用炭一秤發頂火一

斤燬去火三分耗二為度用濕土卷一宿方取出打去外面一層只用裏內細研水淘澄五七度將紙襯乾再

研數千遍用甘草湯調二錢七日一服立効

○發渴

熊氏曰產後心煩發渴宜清心導子飲

薛氏曰前證若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸耆湯若血虛

發熱用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散

一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩

躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

李氏曰產後煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參

二錢麥門冬一錢半熟地黃七分天花粉三錢甘草五分糯米蘆棗煎服

千金竹葉湯 療產後虛渴少氣力

竹葉三人參 茯苓 甘草各一小麥五麥門冬兩半夏 生薑各三 大棗十五 右咬咀以水九升先煮竹

葉小麥蘆棗取七升去滓入餘藥再煎取二升每服五合日三夜一

竹葉歸耆湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉一錢黃耆錢人參 白朮 當歸錢各等麥門冬七錢甘草錢五

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味 右剉水煎服

治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黃酒洗一人參 麥門冬去心各 括蔓根四錢 甘草錢五 右咬咀每一服加糯米一撮生薑三片棗二枚

水煎服

七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致

人參 白朮炒白茯苓 甘草炙 霍香 木香 乾薑各一錢 右剉一服水煎服

清心蓮子飲 治產後心驚發渴

麥門冬去心 黃芩 地骨皮 車前子 甘草錢各一 人參 黃耆炙 白茯苓 石蓮肉各七錢 一方加遠志

石菖蒲錢各一 右另用麥門冬二十粒水二錢煎一盞水中沉冷空心溫服 發熱加柴胡薄荷

產寶方 療產後大渴不止

蘆根切 麥門冬生四兩 瓜蔓根 人參 茯苓 甘草各三錢 大棗二十枚 右以水九升煮取三升分三服頓服

四劑即瘥

括蔓根湯 療產後血渴

括蔓根 麥門冬各三錢 生乾地黃 甘草各二錢 土瓜根五兩 大棗二十枚 右咬咀以水八升煮取二升半

分三服

黃芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬各等 右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服無時

當歸補血湯 治產後血脫煩躁引飲晝夜不寐脉洪大而虛重按全無者

當歸二錢 黃耆二錢 右剉作一服水煎服

一方療血渴及產後渴 用蓮子心取為細末末飲調下二錢效

一方 治產後出血太多虛煩發渴 用真正蒲黃末二錢白湯調下如渴燥甚并花水下

一方 治產後中風煩渴 用紅花子五合微炒研碎以水煎濃徐啖之

桃花散 治產後不煩而渴 新石灰五錢 黃丹五錢 右為細末渴時用井水調下一錢

血生渴之病十之
一分為使位此何為
也蓋以茯苓能降天
之陽氣平其能發地
之陰氣半夏能發地
而於生故佐薑棗生
津相成神乃自生此
大意也真素有一
體同仁之說豈不知
乎夏茯苓而反用之
與後之學者效之去
之各存手其入焉
少用地黃多用人參
便是妙法 糯米養
陰自治中氣虛弱
以致津液短少者宜
之益為已矣不能致
津於脾也 尚末香
合香皆理脾氣而木
香與合香不宜於產
後煩重理
方名清心理宜保肺
以生水通亦以瀉火
也故諸藥性能知其
理以達志存焉可以治
煩恐有未當處
大渴妙藥亦有補土
生金之理
血渴者血虛而渴也
故加生地此二方不
惟產後宜服與清渴
証亦相宜
原東垣治脫血方也
非有見者不能
移之以治產後煩渴
一山一草一蟲一水

○自汗

大全云產後虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗因之遇風則變成痙攣不成痙亦虛之短氣身軀柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰按前証屬血氣俱虛用十全大補湯如不應用參附耑附等湯若汗多亡陽發痙尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱熏蒸而出竊謂前證當以部位分之額左屬肝額右屬脾頭屬腎額屬心治者審之

一產婦略聞音響其汗如雨而昏潰諸藥到口即嘔余以為脾氣虛敗用參附末為細丸時含三五粒隨液嚥下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲余謂血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃藥炒黑倍加人參五味子二劑而愈

大全云凡產後忽冒汗出不識人治用鷄子及竹茹法見前血暈

薛氏曰前說屬大虛宜固元氣為主其汗不止必變柔痙東垣先生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞤蓋因血暴

亡而大上熾但補其血則神自安若常時血下當補而升舉其氣陽得血而神安則自明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活血湯

黃耆湯 治產後虛不止

黃耆二白朮 防風 熟地黃 牡蠣粉 白茯苓 麥門冬 甘草 右切作三服加大棗一枚水煎

服

麻黃根散 治產後虛汗不止

當歸 黃耆 炒麻黃根 牡蠣粉 人參 甘草 右剉每服四錢水煎服

止汗散 治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

其志丹出於鉛內全真水且以鎮壓浮火故能止渴而石反最為燥烈之物何以用之而況以產後手曰不煩一錢須當審其故也夫汗者陽之氣陰氣不復則陽無所歸以入於陰故虛陽上浮於外而為汗耳若常為汗多或虛而失音因之遇風變痙之理又不成痙而短氣柴瘦者此變熱也省之有之亡陽發痙用十全大補參附耑附之類必得其所以用而母泛泛執以為是也而額汗當分部位以近於透臨症尤宜詳悉蓋腎液入心為汗於理須究其始也妙任為尤少其繼也宜大劑湯煎服前論汗出因風變痙之說為優不然即謂之脫陽矣此大補法所當施也黃芪得防風其功愈大為易於固表也而黃芪二錢防風五分大約足矣牡蠣腎家藥也以液入心為汗故止汗又宜曰腎其可意解矣麻黃氣輕而體陽約也用其根用中

陽加於陰謂之汗陰
 於陽之止而反治
 之則汗自出矣立方
 大意如此所謂此者
 正治也如此方以妙
 血爲王而引經之妙
 在指腎發熱未發陰
 蔥白發熱何爲用之
 然汗不以爲下不以
 用而又熟之於未入
 思馬敗敗汗出如雨者
 此無上救急神方乃
 回陽返本之雄師四
 敗敗汗出如雨者
 宜之
 二方一用參一用芪
 一用棗氣補者當
 白不同用藥者當
 此際審其內外有無

牡蠣粉成
小麥麴炒合黃色研成粉各等分
右和勻煮生猪肉汁調下二錢無時

既知內熱生風只宜
求燥不亦治風所
求燥不亦治風所
和散或桃仁承氣湯
便妙三和散有大黃
此敗血之劑其不用
大黃者以肝虛大也
以此肝熱到涼藥所
致而以陰成格陽
也而搏指之肝用強
著蓋木必其肝堅強
搏手而無陽以和之
也甚有用附子者不
可不知
石山先生長厚名子
而不老於醫者也其
必不誣然初學不知
寔難下手而况素厚
不受補之乎須要
胆大心小乃能濟事
不然斯妄為也
快甚快甚
古人於血証中每每
用乾薑而令人辛用
乾薑則熱而令人辛
也若謂入神則宜乾
薑入肝則宜生薑以
其有字有走有從之
不同也今用炮薑煩
炮得十分極黑為妙
要談
此以湯手散合四君
加黃芪而不用芍藥
地黃者以新產之從
宜用血脈氣之法
不宜散散以代生血
也此方於氣血俱虛

大半病人自以素不宜麥黃不宜再服過一日復大熱如火復與前劑潛加參耆炮薑連進二三服熱退身涼而愈
丹溪曰產後發熱用參耆黃芪陳皮當歸川芎炙甘草補虛輕則加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾薑或云大熱
而用乾薑何也曰此熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳蓋乾薑能入肺分利肺氣又能入肝分引眾藥生血然不
可獨用必與補陰血藥同用此造化自然之妙非天下之至神其孰能與於此耶

王節齋云凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾薑之苦溫從治
收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過食飲食傷滯而發熱誤作血虛則不効矣但遇產後發熱者須審問
食何飲食有無傷積若有胸膈飽悶噯氣惡泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法
丹溪方 治產後發熱

當歸 川芎 黃耆 人參 白朮 白茯苓 甘草 右剉水煎服○熱甚加乾薑

加味四物湯 治產後陰虛血弱發熱

當歸 川芎 白芍 熟地黃 白茯苓 右水煎服 熱甚加炒乾薑 虛煩加茯苓連志

抽薪散 治產後血虛發熱

當歸 熟地黃 乾薑 炒黑 右剉一劑水煎服

人參散 治產後諸虛不足發熱盜汗○方見前自汗

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱令人心煩短氣自汗頭痛 方見前虛煩

加味逍遙散 治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸 白芍 乾薑 熟地黃 川芎 黃耆 柴胡 人參 麥門冬 右剉散

分作二服用水一鍾煎七分空心服

犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角 麥門冬 白朮 右剉散 枳殼 地骨皮 生地黃 當歸 人參 茯苓 黃耆 黃芩 甘草
右吹咀每服四錢入生薑二片浮麥七十粒同水煎

三合散 一治產後日久虛勞發熱即四物四君子

當歸 川芎 白芍 熟地黃 白朮 白茯苓 黃耆各錢 人參 柴胡各錢 黃芩 半夏 甘草各五

右作一服加生薑三片紅棗一枚水煎食前服

○往來寒熱

郭指中曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不利敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減陳無擇評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散宜止入脾肺二臟耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

薛氏曰產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之証經云陰虛則發熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用發表降大若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒須用補中益氣湯尺部脉弱名陰氣不足陽氣下陷於陰則發熱用六味地黃丸大抵陰不足陽往從之則陽內陷而發熱陽不足陰往從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中熱氣湯若飢熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱用當歸補血湯若認為實則誤矣

一產婦惡寒發熱用十全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢體倦怠用補中益氣而安又飲食後惡寒發熱抽搐咬難候其脉視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土飲食停滯而作用六君加木香一劑而安

一產婦惡露發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以為風寒用小柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛乏不信仍服一劑汗出不止語語不絕煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補湯二劑益甚脉洪大重按如無仍以前湯加附子四劑稍緩數劑而安

以氣虛者皆實之不虛飲食者用者也
妙法則不惟從陽引陰亦可從陰引陽也
微乎微乎
此又前方之變而不
用苦甘又是一氣當
在肝腎上求之
此方用參歸為氣參
之佐以地黃地黃
肉桂白芍以地黃
葉煎服如血熱甚者
加生地
此與原方迥散不
同又與立齋所用加
味道遠散亦不同此
則以山藥胡湯合四
物生脾散去半夏五
味而加烏梅為根者
也若原方之用清荷
角引而此用葛根又
各有方處于常去苦
用葛根以治骨蒸亦
當古而法今耳
清心涼血益氣寬胸
開胃健脾莫外此方
生薑於汗浮參止汗
而用之者內以養
心外以和表也
平正之劑可法
何為敗血入肺則熱
入脾則寒也蓋以肺
主氣氣不和而熱脾
統血血不和而寒手
抑脾降肺陽而自為
寒熱也然總以逆為
為主而溫涼之法有
不同焉
開陰開陽之說難

理解以成此開陰則
寒閉陽則熱而有解
休會作之時則似
矣若瘀血有形之
物則則難矣而安有
解會之所也愚謂血
閉於經而榮衛行
之不通則寒閉於陰
經而榮衛行不通則
熱故必其於通而寒
熱散而行於於內
也五積散行於於外
也又意為外經或為
寒客則肺為之病肺
病則飢寒而榮衛
不通即熱而肺或為
冷物所傷則脾病脾
病而榮衛不通則為
寒故所用之方一主
寒一主熱也亦或內
外皆寒則寒熱並作
而良藥又均不可廢
也相淺之言伏惟裁
之誤矣指曰虎湯而
言口以欲按脈手護
中虛也以犯怒抽搐
而青肝木也六君補
中木香調肝以治肝
木侮土是矣然亦肝
不榮者是以疎肝
為急所謂標而本之
亦有之焉
余謂當補然亦認症
的確故可用說不的
即取乃事矣慎之
此正治法
此法宜知
冷物是根根諸症
皆從瘀血變性
強緊為寒
當症法尤宜如是察

吳菱山治一婦人產後去血過多食後着惱頭疼身痛寒熱如瘧左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食飲痰火也
二者因虛而得宜養正祛邪遂以茯苓補心湯去地黃加羌活青皮蔥薑三服汗出身涼其患漸差然後以八物湯
調理半月後全愈一婦產後惡露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘧即以生料五積散五帖惡露自下而寒熱除
又一婦產後惡露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脈緊而弦以蔥白散二帖安

一少婦初產四日冷物傷脾胃但覺身分不快嘔逆飲食少心腹滿悶時或腹脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚
語畫則抽搐顛類風狀變異多端諸醫稟測或作虛風或云血凝實熱用甘溫而行血以寒涼退實熱如此半月不
効汪至見醫滿座亦踞縮診其脈弦而緊遂令按之小腹急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露已下未必還有餘
血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客於經絡所以變生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水其患方
愈遂合前藥服之五日後行惡水斗許臭不可近惡人覺倦病勢漸減然後以人參養榮湯數十帖月餘如初

柴胡四物湯 治產後往來寒熱及日久虛勞微有寒熱脈沉而數
當歸 川芎 白芍 熟地黃各一錢 柴胡錢半 人參 黃芩 半夏 甘草錢三 右剉每服一兩水煎服

增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱如瘧飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草錢三 半夏炒 陳皮 川芎 白芍炒 芍藥 右咬咀每服八錢加生薑五片棗二枚水煎服

增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異
當歸 芍藥 川芎 人參 乾薑略一 甘草兩半 右咬咀每服四錢加生薑三片水煎服○釋曰此方治

陰陽不和乍寒乍熱之寒熱不治惡露未盡血滯胞絡小腹急痛之寒熱宜詳之
更生散 治產後去血過多或不止或眩暈眼暗口噤發熱增寒

人參 當歸 熟地黃酒汁炒 川芎 荊芥穗酒油炒 乾薑炒黑各三錢 右剉水煎空心服○如血大下不止

加龍骨赤石脂各大煨等分每二錢同煎藥調服外以五倍子末津調納臍中即止
大調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血不平之

機在琥珀豈大豆有
是以之神也
小柴胡合四物一
名二合
人湯其寒底甘半各
用三錢為重在補氣
也而甘草半何為
其倍之似可損益也
原方有姜棗亦不可
少
此亦小柴胡法而去
黃芩如陳皮者所以
益胃除腹也如芍藥
川芎者所以和血也
本草以當歸治血
寒熱不已則產後寒
熱正宜加之何為不
用宜思之
按往來寒熱者寒往
來寒熱往來寒也寒
熱往來寒熱有時
也寒下熱者有時
寒時手熱也發熱增
寒者身發熱而又惡
寒也治各有法不能
備錄
此方前三味各一兩
何其多後三味各三
錢何其少非有大智
意大力量大見解者
不能處此方治此病
名之曰更生能不於
危急時用乎
下三味入血海急加
非血大小不止者不
用
此方重在惡露水盡
而後神之用此以和
陰陽之謂此方如
神者功在琥珀大豆
湯飲間也

大豆一兩半 伏神一兩 真琥珀錢 右為細末每服二錢濃煎烏豆柴蘇湯下

黃龍湯 治產後傷風熱入胞室寒熱如瘧及病後勞復餘熱不解

柴胡四錢 黃芩人參 甘草各一錢 右作一服水煎服

小柴胡加生地黃湯 治產後往來寒熱而脈弦者少陽也

柴胡二錢 黃芩五錢 人參二錢 半夏半兩 生地黃兩 梔子枳殼 大棗三枚 右剉加薑棗水煎服

加減烏金散 治產後寒熱似瘧此治錯

厚朴 柴胡 黃芩 麻黃 羌活 草果 半夏各二錢 當歸 川芎 白芍 熟地 陳皮 茯苓 桔梗

各一錢 桂枝 蒼朮 白芷 枳殼錢 甘草錢 右剉為散分作兩服每服用水一鍾生薑三片葱三莖煎

至一鍾不拘時服○有痰多半夏桔梗茯苓○有頭痛多川芎白芷羌活○有瀉去枳殼甘草不用○有餘血塊在腹作

草果桂枝○有痰多半夏桔梗茯苓○有頭痛多川芎白芷羌活○有瀉去枳殼甘草不用○有餘血塊在腹作

潮熱疼加三棱蒼朮多用玄胡索八角茴香 通身痛加羌活獨活○寒熱往來加黃芩柴胡

產寶方 療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時乾嘔困乏悶絕

人參 獨活 白鮮皮 葛根 防風 青竹茹 遠志各一兩 茯神兩 白薇兩 玄參兩 竹瀝升 右取銀一

勛水一斗五升煮取七升而諸藥重煮取三升分溫三服忌魚酒濕麵等

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯脇心煩悶

知母兩 芍藥 黃芩各一兩 桂心 甘草各一兩 右咬咀用水五升煮取二升半分三服○一方不用桂心用生

地黃

○瘧疾

晏氏曰產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子

補遺云產後瘧疾熱多寒少者清脾飲寒多熱少者養胃湯久而不已者七寶飲裁之

此方重在解二字
解以柴胡為君蓋風
邪入於中則發熱
氣陷入於陰而寒熱
如瘧者以柴胡為君
也故亦以柴胡為君
胡熱陷也故亦用柴

此方以治少陽等症
似參然以柴胡而加
生地山枝者傷寒家
以柴胡為陽也故以
柴胡為君
此方治表裏風寒食
積氣血虛故無不該
括故曰治諸難雜
之利益此方也與五
相散和為倍仲若借
此以治三陰瘧之有
錯雜之邪者必至
新誤云醫者意也請
嘗試之
如或法切中不可不
法

此方雖出產實然開
其症與其藥皆治產
後外邪非虛傳入之
感症也如惡寒壯熱
一症三五度發壯熱
者即熱入血室類也
故用防獨葛根以散
之口瘡乾嘔者熱傳
胸中也故用玄參二
行以清之白鮮皮苦
寒治產後百病自散
白銀人參遠志茯神
為邪散熱清故用之
以治因之也
按自黃龍湯以下皆
集外感治法至於錯

薛氏曰產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱熱傷脾或暑邪所伏審保飲食用六君加桔梗蒼朮
藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯飲食停後用補中益氣湯氣血虛弱
用十全大補湯加炮薑虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子大凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱
胃虛則惡寒陰天下流則寒熱交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百證當補其病
自退若誤用清脾截瘧之類多致不起

一產婦患瘧發熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食噤酸暖氣此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神龜山
查四劑而不作酸乃去神龜山查又數劑而飲食進其大便不通至三十五日計進飲食七十餘碗腹始悶今用猪
膽汁導而通之其真且不甚燥
一產婦患瘧久不愈百病蜂起其脈或洪大或微細或弦緊或沉伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脉證稍得
又用參耒煎膏佐以歸脾湯百餘劑而瘧
一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服百餘劑而等愈
法此非藥之功乃病久自愈耳丹

草果飲子 治產後瘧疾寒熱相半者或多熱者
半夏泡 赤茯苓 甘草 草果炮去川芎 陳皮 白芷 青皮 良薑 紫蘇 錢半 乾葛 右
咬咀每服三錢加生薑三片棗一枚水煎當發日侵早連服二服無有不安者
生熟飲子 治產後瘧疾多寒者
肉豆蔻 草果仁 厚朴生用 半夏 陳皮 甘草 大棗 生薑 右八味剉碎和勻一半用生
一半用濕紙裏煨令香熟去紙與生者和勻每服五錢水煎食前一服食後一服
清脾飲 治產後瘧疾多寒少者
人參養胃湯 治產後瘧疾多熱少者
七寶飲 治產後瘧疾久而不已者以此裁之

○方俱見胎前產後

○蓐勞

雖之邪時氣之症亡不備載而次第有節人但知產後集熱以補氣血為主者其不誤盡世人之手

大全云產後蓐勞者此由生後日淺血氣虛弱飲食未平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏於氣血則不能溫於肌膚使人虛之勞倦乍卧乍起顏色憔悴食飲不消風冷邪氣兩感於肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受於風邪流注臟腑須臾頻發時有益汗寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重着床此則蓐勞之候也

又曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞思慮致令虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痞逆腹中絞刺名曰蓐勞

此數方俱屬溫補大與時宜可補前方之未備而暑症所伏之方不詳為以治暑方用清涼也蓋薛翁喜溫補而產後尤忌寒涼血虛又忌白虎故不言耳臨症又宜分別

薛氏曰按前證當扶養正氣為主用六君子湯加當歸若理肺氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補益氣加蔓荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味凡加五味子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍加白朮若因脾虛血燥皮膚癢痒因加味逍遙散大抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致諸經疲憊而作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所倚賴其病自愈矣仍參虛損發熱方論諸治

汪氏治一婦產未滿月因怒氣血流水三日方止隨又勞苦四肢無力睡而汗出日晡潮熱口乾五心如炙諸醫皆用柴苓薄荷之類其熱愈熾診其脉弦大無力此蓐勞也以四物湯二兩人參胡黃連秦艽青蒿各半錢數服熱退身涼後以黃連八珍凡一料而安

白茯苓散 治產後蓐勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

白茯苓 兩 當歸 川芎 熟地黃 白芍 炒 黃耆 人參 桂心 各半 右先以水三盞入猪腰一雙薑三

片棗三枚煎至二盞去麤入前藥半兩煎一盞服

黃耆建中湯 治產諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃耆 炒 肉桂 各一兩 白芍 炒 甘草 炒 右剉每服五錢用薑棗水煎服日二三次虛甚加附子

所請脾寒作瘧

當歸建中湯 治產後勞傷虛羸不足腹中疼痛呼吸少氣小腹拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至月滿一日三服令人身壯強健

當歸 兩 白芍 兩 桂心 兩 黃耆 兩 右剉每服四錢加薑棗水煎入飴糖一塊再煎稍熱服○如崩中衄血加

阿膠地黃 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

加味佛手散 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸 川芎 黃耆 柴胡 前胡 右咬咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一

枚生薑一片煎服 如有痰不用烏梅

柴胡四物湯 治產後日久虛勞而脉浮入者 方見前往來寒熱

三合散 治產後日久虛勞鐵汁服藥俱無効者 方見前發熱

雲岐熟地黃散 治產後尊勞皆由體虛氣力未壯勞復所起四肢煩痛時發寒熱不思飲食

熟地黃 人參 白芍 白茯苓 白朮 續斷 黃耆 當歸 川芎 五味子 桂心 右咬咀

每服四錢生薑三片棗一枚水煎服○大全方有麥門冬七錢半○一方無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏各

七錢半

黃耆凡 治產後尊勞寒熱進退頭目眩痛骨節痠疼氣力羸乏

黃耆 驚甲 當歸 川芎 白芍 桂心 續斷 牛膝 蓯蓉 栝子仁 沉香 枳殼 五味

子 熟地黃 右為細末煉蜜凡如桐子大每服四五十九丸食後粥飯下

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃名曰葶藶

猪石子 膜去脂 香豉 粳米 當歸 白芍 右咬咀分兩劑每劑用米三合煮取一

小碗去滓分三服○濟方無白芍有人參○許仁則方無香豉有生薑二兩桂心一兩葱白一兩
人參驚甲散 治尊勞皆由在產內未滿百日體中虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成葶藶乍
起乍卧飲食不消時有咳嗽頭中昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在牀服此大効

此方小柴胡湯者是也

其理之真也

兩虎故主於十全大補丸法如續斷治諸

不足婦人內漏五更

生津飲神如參門更

妙所去三所加三又

三合也

按此不離四物黃芪

續斷桂心五味而驚

甲除骨節之勞或柏

子潤心中之津液有

膝冷足膝之苦況有

通天你地瘧疾為司

積穀方塊以補氣血

後諸方或溫或清或飲

或散或破血或行氣

各隨兼症而佐使之

妙諸用者不必膠柱

而調瑟石子即諸腎

用以佐諸湯者得本

黃耆 驚甲各一牛膝七錢人參 白茯苓 當歸 白芍 桑寄生 麥門冬各 熟地黃 桃仁 桂心

甘草各半 續斷二錢 右為細末每服先以豬腎一對去筋膜以水兩大盞生薑半兩棗三枚煎至一盞去

豬腎薑棗然後用藥末二錢葱白三寸烏梅一箇荊芥五穗煎至七分去滓空心晚食前溫服神効

胡氏牡丹散 治產後虛羸發熱自汗欲變等症或血氣所搏經候不調或寒熱羸瘦

當歸 白芍 人參 五加皮 地骨皮各半 牡丹皮 錢桂心 沒藥各二 右為細末每服二錢水酒各半

蓋如不飲酒只用水一盞開元錢一枚煎油鹽之同煎七分去滓通口服煎不得攪喫不得吹

黃耆煮散 治產後羸勞肌膚黃瘦面無顏色或憎寒壯熱四肢痠疼心煩頭痛

龍甲醋 黃耆一牛膝七錢 當歸 白芍 熟地黃 人參 白茯苓 麥門冬各 桑寄生 桂心 甘草

下藥五錢更煎至四分去滓空心晚食前溫服二萍並煎

豬腰子粥 治產後尊勞發熱○猪腰子一箇去白膜切作柳葉片用鹽酒拌先用糯米一合入葱椒煮粥鹽醋調

和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作禽狀空心服之

○虛羸 產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產

者毋論日期必須調養平復方可涉事否則氣血復傷虛羸之證作矣

薛氏曰前證產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣

湯若嘔氣覺有藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸證自愈矣

大全云冷勞者產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷客之冷搏於血氣血氣不能溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸損不

平復若久不平復風冷入於子臟則胞臟冷使人無子

薛氏曰前證若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒用十全大補湯胃氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱用六君子湯命

門大衰用八味湯肝脾血虛用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯

齊 會 岡 卷十三 虛羸

符要知有痰則兼敗
痰有風則兼治風寒
則寒寒熱則兼熱無
定一也
此不藥之藥所謂殺
肉果菜食養盡之也

若為氣血虛則為本
氣虛而寒即無風冷
答之而亦寒也治者
須知不足有餘
初感為寒久則為熱
若果肥冷即本氣虛
者即血虛

此方以中氣元氣為
主而無血藥者必脾
胃虛而本元不足也
其血藥只用川芎又
於補氣中以行肝血
抑血脫益氣補脾生
血之良方也

黃者易於生者即補
血湯以黃者為君之
義所謂氣能生血血
不能生氣而黃藥有
殺伐之性無生長之
能故去之
加減法妙

多用酒炒助生氣也
乃丹澤法
陰虛者陽虛發熱者
陰虛此八物之用也
肉桂能通榮衛而和
陰陽消諸候之命主
使通兩家之好也
本草云人參黃芪與
羊肉同功又謂羊肉
補形益有形之物者
血而外益氣羊內
補形似有懸殊焉可
同治然有形生於無
形故由形不足者溫

補虛湯 治產後一切雜病只大補氣血為主

人參 白朮 路各 黃耆 川芎 陳皮 路各 甘草 淡三 右劉加生薑三片水煎服○熱輕加茯苓熱甚加

炒黑乾姜三分

黃耆四物湯 新產不可用芍藥以其酸寒能伐生發之氣只以黃耆易芍藥為補虛之要藥

黃耆 當歸 川芎 熟地黃 路各等 右劉每服四錢水煎服○氣虛加參朮茯苓甘草○發熱加乾薑 自

汗多者少用川芎勿用茯苓倍加蜜汁黃耆 口渴加五味子麥門冬○腹痛者非白芍不可雖新產亦用但以

酒炒不効

十全大補湯 治產後血氣未復形體虛弱發熱惡寒不能飲食

人參 白朮 茯苓 黃耆 當歸 川芎 白芍 炒 熟地黃 路各 肉桂 甘草 路各五 右劉加生薑五片

兼三枚水煎服

當歸羊肉湯 治產後雖無疾但覺虛弱兼心腹痛即宜服之

肥羊內 去一兩 當歸 五兩 黃耆 四兩 生薑 六兩 右先以水一斗煮羊肉取汁八升後下三味煮取二升五合分為四服

黃汁二合

釋曰所加五法分兩多寬皆有意義右川芎之治惡露下多陰中升陽也有氣之加細辛辛以散肝也餘可類推

黃鵠雞湯 治產後虛羸腹痛 小黃鵠雞一隻去翅足頭

當歸 白朮 熟地黃 桂心 黃耆 炒各 兩 右先以水七鍾煮雞至三鍾每用汁一鍾藥四錢煎日三服

產寶方 治產後虛羸不生飢肉

黃芩 當歸 白芍 人參 路各 三 桂心 甘草 炒 川芎 生薑 路各 四 大棗 十二 右九味用水七升煮三升

一方 治產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不止