

本草綱目果部目錄第二十九卷

李時珍曰木實曰果草實曰蓏熟則可食乾則可脯
豐儉可以濟時疾苦可以備藥輔助粒食以養民生
故素問云五果爲助五果者以五味五色應五臟李
杏桃栗棗是矣古書欲知五穀之收否但看五果之
盛衰李主小豆杏主大麥桃主稻棗主禾禮記內則列果品凌枳
榛瓜之類周官職方氏辨五地之物山林宜阜物荳芡梅李
之川澤宜膏物之屬丘陵宜核物之屬甸師掌野果
蓏場人樹果蓏珍異之物以時藏之觀此則果蓏之

土產常異性味良毒豈可縱嗜欲而不知物理乎於
是集草木之實號爲果蓏者爲果部凡一百二十七

種分爲六類曰五果曰山曰夷曰味曰蓏曰水

舊本果部

三品共五十三種今移一種入菜部四種入草部自
木部移入併附三十一種草部移入四種菜部移入

一種外類
移入四種

神農本草經十一種

梁陶弘景註

名醫別錄十七種

同上

唐本草十一種

唐蘇恭

本草拾遺二十種

唐陳陳藏器

海藥本草一種

唐李珣

食性本草一種

唐良

食療本草一種

唐孟詭

開寶本草十九種

宋馬志

嘉祐本草二種

宋掌禹錫

圖經本草五種

宋蘇頌

日華本草二種

宋人大明

食物本草一種

明汪穎

日用本草一種

元吳瑞

本草會編一種

明汪機

本草綱目三十三種

明李時珍

附註

魏吳普本草

李當之本草

宋雷斅炮炙論

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

孫思邈千金

唐蕭炳四聲

楊損之刪繁

蜀韓保昇重註

宋寇宗奭衍義

唐慎微證類

金張元素珍珠囊

元李杲法象

王好古湯液

朱震亨補遺

明甯原食鑑

周憲王救荒

陳嘉謨蒙筌

果之一 五果類一十一種

李別錄

徐李附

杏別錄

巴旦杏綱目

梅本經

櫟梅

綱目

桃本經

栗別錄

天師栗綱目

棗

本經

仲思棗

開寶

苦棗

食性

右附方舊一百一十三新一百零八

本草綱目果部第二十九卷

果之一 五果類 一十一種

李

別錄
下品

釋名 嘉慶子

時珍曰按羅願爾雅翼云李乃木之多子者故字從木子竊謂木之多子

者多矣何獨李稱木子耶按素問言李味酸屬肝東方之果也則李於五果屬木故得專稱爾今人

呼乾李爲嘉慶子按韋述兩京記云東都嘉慶坊有美李人稱爲嘉慶子久之稱謂既熟不復知其

所自矣梵書名

李曰居陵迦

集解

弘景曰李類甚多京口有麥李麥秀時熟小而肥甜核不入藥姑熟有南居李解核如杏

子形者入藥爲佳志曰李有綠李黃李紫李牛李水李並甘美堪食核不中用有野李味苦核仁入

藥頌

曰李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也
一名趙李座音碰乃接慮李也一名麥李細熟有

溝道

與麥同熟駿乃赤李也陶氏所謂南居李今不復識

醫家用者亦少時珍曰李綠葉白花樹能耐久其

高丈

許一種御李子大如櫻桃紅黃色先諸李熟

醫家

用者亦少時珍曰李綠葉白花樹能耐久其

種近百

其子大者如杯如卵小者如彈如櫻其味

脂青皮紫灰之殊其形有牛心馬肝柰李杏李水

李

離核合核無核匾縫之異其產有武陵房陵諸

李早則麥李御李四月熟遲則晚李冬李十月

李

一月熟又有季春李冬花春實也按王禎農書云

北方一

種御黃李形大而肉厚核小甘香而美江

南建寧

一種均亭李紫而肥大味甘如蜜有擘李

熟則自裂

有餚李肥黏如餚皆李之嘉美者也今人用鹽曝糖藏蜜煎爲果惟曝乾白李有益其法

夏李色黃時摘之以鹽挾去汁合鹽

曬萎去核復曬乾薦酒作飴皆佳

實氣味苦酸微溫無毒

(時珍曰)李味甘酸其苦澁者不可食不沉水者有毒

不可食大明曰多食令人

臚脹發虛熱(說曰臨水

食之令發瘧瘧不可合雀肉食合蜜食損五臟(宗

奭曰不可合漿水食發霍亂

氣血然服此人忌之

主治曝食去痼熱調中

錄別去骨節閒勞熱(孟

說)肝病宜食之(思邈)

核仁氣味苦平無毒

主治僵仆踴折瘀血骨痛(別

令人好顏色

(吳普)治女人少腹腫滿利小腸下水氣

除浮腫

(甄權)治面黑子

(蘇頌)

附方

(舊一新)

女人面黑

(用李核仁去皮細研以雞子和如稀餳塗之至旦以漿

水洗去後塗胡粉不過五六日

效忌見風(崔元亮海上方)

蠍蟲螯痛(苦李仁嚼塗之)

良
今錄驗
古

根白皮脩治

時珍曰李根皮取東行者刮去皺皮炙黃入藥用別錄不言用何等李根

亦不言其味但藥性論云入藥用苦李根皮味鹹而張仲景治奔豚氣奔豚湯中用甘李根白皮則

甘苦二種皆可用與

氣味大寒無毒

大明日涼無毒主治消渴止心煩逆奔豚

氣

別錄治瘡

吳普煎水含漱治齒痛

引景煎汁飲主赤白

痢

大明炙黃煎湯日再飲之治女人卒赤白下有驗

孟詭治小兒暴熱解丹毒

時珍苦李根皮味鹹治腳下

氣主熱毒煩躁煮汁服止消渴

權甄

附方

新

小兒丹毒

從兩股走及陰頭用李根燒爲末以田中流水和塗之

千金

咽喉卒塞

無藥處以阜角末吹鼻取嚏仍以李樹近根皮磨水塗喉外良驗

菽園雜記

花氣味苦香無毒

主治令人面澤去粉滓時

附方

新

一面黑粉滓

用李花梨花櫻桃花白葵花白蓮花紅蓮花旋復花秦椒各六

兩桃花木瓜花丁香沉香青木香鍾乳粉各三兩

珍珠玉屑各二兩蜀葵花一兩大豆末七合爲細

末瓶收每日盥礪用洗手面

百日光潔如玉也

普濟方

葉氣味甘酸平無毒

主治小兒肚熱痞疾驚癇煎

湯浴之良

大明

附方

新

一惡刺瘡痛

李葉棗葉搗汁點之效

千金

樹膠氣味苦寒無毒主治目翳定痛消腫

時珍

附錄徐李

別錄有名未用曰生太山之陰樹如李而小其實青色無核熟則采食之輕身益氣延年時珍曰此卽無核李也唐崔奉國家有之乃異種也謬言龍耳血墮地所生

杏

別錄下品

釋名甜梅

時珍曰杏生晉川山谷五月采之頽曰今處云從口及從可者並非也江南錄云楊

行密改杏
名甜梅

集解

別錄曰杏生晉川山谷五月采之頽曰今處處有之有數種黃而圓者名金杏相傳種出

自濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏言漢武帝上苑之種也今近汴洛皆種之熟最早其扁而青

黃者名木杏味酢不及之山杏不堪入藥杏仁今以從東來人家種者爲勝宗奭曰金杏深赭色核

大而扁乃接成者其味最勝又有白杏熟時色青
白或微黃味甘淡而不酢生杏可曬脯作乾果食
之山杏輩只可取仁用耳時珍曰諸杏葉皆圓而
有尖二月開紅花亦有千葉者不結實甘而有沙
杏者爲沙杏黃而帶酢者爲梅杏青而帶黃者爲柰
杏其金杏大如梨黃如橘西京雜記載蓬萊杏花
五色蓋異種也按王禎農書云北方肉杏甚佳赤
大而扁謂之金剛拳凡杏熟時榨濃汁塗盤中曬
乾以手摩刮收之可和水調

麩食亦五果爲助之義也

實氣味酸熱有小毒生食多傷筋骨

別錄頌曰杏之類梅者味

酢類桃者味甘宗奭曰凡杏性皆熱小兒多食致
瘡癰膈熱扁鵲曰多食動宿疾令人目盲鬚眉落
源曰多食生瘻熱昏精神產婦尤忌

主治曝脯食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之

邈思

核仁脩治

別錄曰五月采之宏景曰凡用杏仁以湯浸去皮尖炒黃或用麪麸炒過數日

凡用以湯浸去皮尖每斤入白火石一斤烏豆三合以東流水同煮從巳至午取出曬乾用時珍曰治風寒肺病藥中亦有連皮尖用者取其發散也

氣味甘苦溫冷利有小毒兩仁者殺人可以毒狗

震亨曰杏仁性熱因寒者可用思邈曰杏仁作湯如白沫不解者食之令氣壅身熱湯經宿者動冷氣時珍曰凡杏桃諸花皆五出若六出必雙仁爲其反常故有毒也○徐之才曰得火良惡黃芩黃芪葛根畏襄草主治欬逆上氣雷鳴喉痹下氣產乳金瘡

寒心奔豚

本經

驚癲心下煩熱風氣往來時行頭痛

陳皮佐之好古曰張仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上喘逆並用杏仁者爲其利氣瀉肺解肌也時珍曰杏仁能散能降故解肌散風降氣潤燥消積治傷損藥中用之治瘡殺蟲用其毒也按醫餘云凡索麪豆粉近杏仁則爛頃一兵官食粉成積醫師以積氣丸杏仁相半研爲丸熟水下數服愈又野人閑話云翰林學士辛士遜在青城山道院中夢皇姑謂曰可服杏仁令汝聰明老而健壯心中力不倦求其方則用杏仁一味每鹽漱畢以七枚納口中良久脫去皮細嚼和津液頓嚥日日食之一年必換血令人輕健此申天師方也又楊士瀛直指方云凡人以水浸杏仁五枚五更端坐逐粒細嚼至盡和津吞下久則能潤五臟去塵滓驅風明目治肝腎風虛瞳人帶青眼翳風癢之病珍按杏仁性熱降氣亦非久服之藥此特其咀嚼吞納津液以消積穢則可耳古有服杏丹法云是左慈誕之方唐慎微收入本草云久服壽至千萬其說妄可鄙今刪其紕謬之辭存之于下使讀者毋信

其誕

附方

舊新

三十五杏金丹

左慈秘訣云亦名草金丹
方出渾皇子服之長年不

死夏姬服之壽年七百乃仙去也世人不信皆由
不肯精心脩治故也其法須人罕到處寅月鑊斷
杏樹地下通陽氣二月除樹下草三月離樹五步
作畦壘以通水亢旱則引泉灌漑有霜雪則燒火步
樹下以救花苞至五月杏熟自落收仁六斗以湯
浸去皮及雙仁者用南流水三石和研取汁兩石
八斗去滓以新鐵釜用酥三斤以糠火及炭然釜
少少磨酥至盡乃內汁入釜釜上安盆盆上鑽孔
用弦懸車轄至釜底以紙塞孔勿令泄氣初着糠
火一日三動車轄以容其汁五日有露液生十日
白霜起又二日白霜盡卽金花出丹乃成也開盆
炙乾以翎掃下棗肉和丸梧子大每服三丸空心
煖酒下至七日宿疾皆除瘡盲攀跛癰瘍瘻瘍
腫萬病皆愈久服通靈不死云云衍文不錄○頌

曰古方用杏仁脩治如法自朝蒸至午便以慢火
微炒至七日乃收之每旦空腹噉之久久不止駐
顏延年云是夏姬之法然杏仁能使人血溢少誤
必出血不已或至委頓故近人少有服者或云服
至二三年往往或瀉或

臍中出物皆不可治也

杏酥法

頌曰去風虛除百病搗爛杏仁一石以好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗

五升攬勻封於新甕中勿洩氣三十日看酒上酥
出卽掠取納瓷器中貯之取其酒滓團如梨大置
空屋中作格安之候成飴脯狀旦服一枚以前酒
下○藏器曰杏酪服之潤五臟去痰嗽生熟喫俱
可若半生半

熟服之殺人

又法

宗奭曰治肺燥喘熱大腸秘潤五臟用杏仁

薑四兩甘草一莖銀石器中慢火熬成稀膏

入酥二兩同收每夜沸湯點服一匙

衍義

萬病丸

治男婦五勞七傷一切諸疾杏仁一斗二升童子小便煮七次以蜜四兩拌勻再以

童便五升於碗內重蒸取出日曬夜露數日任意嚼食卽愈

補肺丸

治咳嗽用杏仁二大升山中者不用去雙仁者以童子小便二斗浸之春夏七日秋

冬二七日連皮尖於砂盆中研瀝取汁煮令魚眼

沸候軟如麵糊卽成以粗布攤曝之可丸卽丸服

之食前後總須服三五十丸茶酒

任下忌白水粥

劉禹錫傳信方

嗽嗽寒熱

旦夕加重少喜多嗔面色不潤忽進忽退積漸少食脈弦緊者杏仁半兩去皮

尖童子小便浸七日漉出溫水淘洗砂盆內研如

泥以小便三升煎如膏每服一錢熟水下婦人室

女服之尤妙

久患肺氣

喘急至嗽甚者不過二劑永瘥杏仁去皮尖二兩童劑

千金方

子小便浸一日一換夏月三四換滿半月取出焙

乾研細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞子大水一

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com