

傷寒雜病論會通

傷寒雜病論會通卷十六

漢長沙太守南陽張機仲景述

長安黃維翰竹齋學

辨婦人各病脈證并治

師曰婦人得平脈陰脈小弱其人嘔不能食無寒熱此為

妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者

卻一月加吐下者則絕之妊音壬

魏念庭曰婦人男子同其藏府而氣血分主不同故婦

人三病六病不一列於凡胎孕生言之故悉男子所無者

也六病以另立婦人病為一卷而首言妊婦人子經所應

陽物也故三靜專而動直男子精氣應手陰靜翕而動則
人二十九日經血不至靜翕也每月一至動則
能受矣男子溼然無欲則精氣不知在何所以衣靜專

也。總動情盛則精氣不積。自何而來。此動在也。易所云。由天地
 也。李理臣曰。此節病證。即妊者。血不足也。九寸為陽脈。主
 氣。尺為陰脈。主血。陰脈小。即經身有弱。者。血不足也。九寸
 者。初胎病也。即內經方有受胎。而無胎。此陽脈小。弱。者。
 三四月。經血久蓄。陰尺脈始數。是內經所謂。手少陰脈。小者。
 妊子。今妊婦。謂三月。往身有惡阻。而不能食。是已。無邪氣。
 無邪氣也。夫。胎。無故。而往。身有惡阻。而不能食。是已。無邪氣。
 可施治。惟宜桂枝湯。和調陰陽。而已。徐氏云。桂枝湯。外
 證。得之。為解肌。和榮衛。內證。得之。為化氣。云。陰陽。湯。外
 十日。當有。此證。者。謂。妊。兩。月。正。當。惡。阻。之。時。設。不。知
 而。妄。治。則。看。氣。反。增。正。氣。反。損。而。嘔。瀉。者。加。矣。吐。前。愈
 禁。絕。其。醫。藥。也。晏。全。善。云。嘗。治。婦。人。嘔。瀉。者。加。矣。吐。前。愈
 治。愈。吐。因。思。仲。景。絕。之。旨。以。炒。糯米。湯。代。茶。正。愈
 餘。漸。安。

桂枝湯方見太陽病上

婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍

桂枝茯苓丸方

桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁 芍藥 各等

右五味末之，煉蜜為丸，如兔屎大，每日食前服一九，不

知，可漸加至三丸。

趙以德曰：桂枝、桃仁、牡丹皮、芍藥能去惡血，茯苓亦利腰

臍間血，即是破血。程雲來曰：牡丹、桃仁以攻癥，枝、

有和衛之芍藥以和榮，茯苓以和中，五物相需為治，姓疑

婦人良方，專治婦人小產下血至多，胎上墮，腹心中

其人多增寒，手足冷，汗自出，胎尚未損，服之可安，已死服之

藥傷動胎，氣死，下血不止，胎尚未損，服之可安，已死服之

可下。此方的係異人傳授，至妙。○準繩云：此即仲景桂

枝茯苓丸，又治胎衣不下，瘀血土衝危險等證。

本方陰水煎服。湯候產母腹痛腰痛，見胞漿下方服，即

婦人懷孕六七月，脈弦發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒，少腹如

扇所以然者子藏開故也當以附子湯溫之。
扇音

徐忠可曰懷胎至六月七月此胃與肺養胎之時也。張故弦脈使人胃脹六月七月胃肺養胎而氣為寒所滯

惡寒有屬表者此連腹痛則知寒傷內矣。且腹如扇陣作冷若或扇之也此狀其惡寒之特異者且獨在少

腹蓋因子藏受寒不能入腎溫故少腹獨甚。宜以附子湯溫開者不斂也。附子能入腎溫故少腹獨甚。宜以附子湯溫

其藏程雲來曰胎脹腹痛亦合人發熱惡寒少腹如扇陰寒勝也。妊娠陰陽調和則胎氣安。今陽虛陰盛不能

約束胞胎故子藏為之開也。附子湯用以溫經。

附子湯方 見少陰病

師曰婦人有漏下者有半產後續下血都不絕者假令妊

娠腹中痛者此為胞阻膠艾湯主之。

徐忠可曰此段槩言婦人下血宜以膠艾湯溫補其血而妊娠亦其一。但致者有不同無滯漏下者此平日血

虛而加客邪。半產後。血如前。之血不絕。此因失血。而血虛。而正
 氣難復。若因胎阻。下血。前之血不絕。此因失血。而血虛。而正
 痛則也。故因胎阻。下血。前之血不絕。此因失血。而血虛。而正
 痼害也。故因胎阻。下血。前之血不絕。此因失血。而血虛。而正
 養陰補血。莫出其右。善行能導。血歸而為痰。濁。何膠使
 去風溼。濁。艾性溫。而善行。能導。血歸。而為痰。濁。何膠使
 四物不偏。於陰。三味。之。力。地。而。運。用。之。巧。實。在。膠。艾。使
 程雲來曰。姓。娠。經。來。之。血。惡。阻。是。阻。胃。中。之。水。
 曰。胞。阻。是。阻。胞。中。之。血。惡。阻。是。阻。胃。中。之。水。

膠艾湯方

地黄兩六 芍藥兩二 阿膠兩二 艾葉兩三 當歸兩三 芍藥兩四 甘草兩二

右七味以水五升清酒三升煮六味取三升去滓內膠

烱消溫服一升日三服

程雲來曰膠艾主乎安胎四物主乎養血和以甘草行
 以酒勢血能循經養胎則無漏下之患趙氏以此為德曰調經
 止崩安胎養血效理無出此方陳修園曰此為總方者
 出其方治也然此方為經水不調胎產前後之總方者

右六味杵為散。取方寸匕。温酒和。日三服。

陳靈石曰。懷妊腹痛。多屬血虛。而血生於中。氣過。溼亦不生。也。土過燥。不生物。故以歸芎芍藥。滋之。土過溼。亦不生。

其痛。故以苓朮澤瀉。滲之。燥溼得宜。則中氣治。而血自生。三服。則藥力相續。而腹痛自止也。

和劑局方。當歸芍藥散。治妊。娠中絞痛。心下急滿。及

產後。血暈。內虛。氣乏。崩中。久痢。常服。通暢。血脈。不生。瘡。

妊娠嘔吐不止。乾薑人參半夏丸主之。

趙德曰。此即後世所謂惡阻病也。先因脾胃虛弱。津液留滯。畜為痰飲。至妊二月之後。胎化。成胎。濁氣上衝。

中焦不勝。其逆。痰飲。遠湧。嘔吐。而已。中寒。乃起。故用乾

薑。止寒。人參。補虛。半夏。生薑。治痰。飲散逆也。魏念庭曰。

而妊。嘔吐。且不止者。下胃。必逆。而上。衝亦能動。痰。飲。而凝滯。

吐。方。緩。以。乾。薑。溫。益。脾。胃。半。夏。開。降。逆。氣。人。參。補。中。益。氣。為。丸。緩。以。收。補。益。之。功。用。治。虛。寒。妊。娠。氣。至。善。補。之。滋。也。

乾薑人參半夏丸方

乾薑兩 人參兩 半夏兩

右三味末之。以生薑汁糊為丸。如梧子大。每服飲下五

丸。日三服。

程雲來曰。寒在胃脘。則令嘔吐不止。故用乾薑散寒。半夏生薑止嘔。人參和胃。陳修園曰。半夏得人參。不惟不礙胎。且能固胎。黃坤載曰。此方以生薑汁煉蜜為丸。治反胃嘔吐甚。則加茯苓更效。

妊娠小便難。飲食如故。當歸貝母苦參丸主之。

趙以德曰。小便難者。膀胱熱。氣結成燥。病在下焦。不在中焦。所以飲食如故。用當歸和血潤燥。本草貝母。治熱之。仲景曰。燥由熱。熱由氣。不化也。貝母非治熱。則腎水之。母以水之。燥由熱。熱由氣。不化也。貝母非治熱。則腎熱散。非淡滲。利水也。結通。則水行。苦參長於治熱。利竅。逐水。佐貝母。入行勝。然以原熱結也。

當歸貝母苦參丸方

當歸兩 貝母兩 苦參兩

右三味末之煉蜜為丸如小豆大飲服三九日三服

驗方新編孕婦小便不通此胎壓尿管不得小便心煩不卧名曰轉胞方即本方

妊娠有水氣小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

沈明宗曰此胎壓衛氣不利致水頭眩則全在溼曰妊病便不利與上條同而身重惡寒頭眩則全在溼曰妊病

氣既行熱液者膏壤殊矣葵子茯苓散滑竅行水水

清道不頭眩矣經曰有者求之無者求之盛虛之變不

可無釋曰凡婦人宿有風寒冷溼妊娠喜脚腫俗為鰓脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

葵子茯苓散方

葵子一斤茯苓兩三

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈

程雲來曰葵子之滑可以利竅茯苓之淡用以滲泄二

物為利水之輕劑

字全翼方治妊脈得熱病五六日小便不利熱入五藏

方即本方二味各一兩

免生他病

徐忠可曰宜常服者雖無病亦宜服之也蓋生物者土

也而土之所以常服者雖無病亦宜服之也蓋生物者土

而歸養血芍藥斂陰胎之法唯以涼血利氣為主黃芩

能清肺而利氣胎之源能胎之難則皆由熱鬱而不燥

臨產不難產後亦免生他病也燥熱之患故曰常服則

當歸散方

當歸斤黃芩斤芍藥斤芎藭斤白朮斤

婦人

右五味，并為散。酒服方寸匕，日再服。

有熱胎動不安，素曾半產者，皆宜服之。以清其源而無

妊娠身有寒溼，或腹痛，或心煩心痛，不能飲食，其胎躍躍動者，宜養之。白朮散主之。

尤在溼曰：妊傷胎，有因溼熱者，亦有因溼寒者。隨人藏氣之淫，陰陽而各異也。當歸散正治溼熱之劑，白朮散也。仲景並列於此，其所以記示後人者，深矣。程雲來曰：疾飲在心膈，故令人煩吐痛，不能食飲。白朮主安胎，為君。芍藥主養胎，為臣。蜀椒主溫胎，為佐。牡蠣主固胎，為使。按瘦而多火者，宜用當歸散；肥而有寒者，宜用白朮散。不可混施也。

白朮散方

白朮

芍藥

蜀椒

汗去目

牡蠣

各等分

石四味杆為散酒服一錢匕日三服夜一服

魏念庭曰白朮散為妊娠胃氣虛寒水溼痰飲逆於上

而陰寒疑滯血氣阻閉於下通治之方也

和劑局方白朮散調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風

冷胎羸不長或失於將理動傷胎氣多致墮胎孕常

服壯氣益血保護胎藏即本方三固方同方後云亦治

室文帶下諸疾

婦人懷身七月腹滿不得小便從腰以下如有水狀此大

陰當養不養心氣實也宜瀉勞宮關元小便利則愈

尤在淫也所以腹滿不得小便從腰以下重也如有水氣而實

者水也所以然者心氣實則肺氣化而胎失其養則

胎中不可治其阻而水乃不行矣腹滿者難身重職是故

也使小便微利則心氣降而胎自矣元氣行是故

如所養水氣不通勞宮穴在手心

七

產婦難液病有三病也。三病者，尤在溼曰痙，筋病也；鬱冒，神病也；大便後，所有之病。陳修園曰：此為產後提出三病，以為綱。非謂產後止此三病也。

然者，血虛而厥，厥則必冒。冒家欲解，必大汗出，以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復。大便堅，嘔不能食者，小柴胡湯主之。

尤在溼曰鬱冒，雖有客邪，但其本則為裏虛，故其脈下微弱也。嘔不能食，大便反堅，但頭汗出，津氣上行，而五臟下微。建之象，所以然者，亡陰血虛，孤陽上厥，而津氣從之也。厥者，必冒，冒家欲解，必大汗出，者，陰陽乍離，故厥而冒也。及陰陽復通，汗乃大出，而解也。產婦新虛，不宜多汗，而此反喜汗出者，血去陰虛，陽受邪氣，而新虛盛，汗出則邪去。去之者，以邪氣不可不散，而正虛不可不顧，惟此小柴胡

湯主之。婦人

難解之散邪而和利陰陽耳。徐忠可曰：此為鬱冒與大便
 燥也。故以柴胡參甘芩辛薑棗和之。非實邪，乃胃有虛熱
 也。脈短問曰：婦人病經水不通而發其汗，則鬱冒不知人。
 何也？師曰：經水不調，故為裏虛而發其汗，為表虛。此為人
 醫表裏俱虛，故合鬱冒也。如死，人身不動，推目閉口緊，但
 上而不冒，移時方寤。此由已汗過多，血氣併於血，陰陽獨
 通，故移時方寤。名曰鬱冒，亦名血厥。婦人多有之。
 全遺輯義：產後血暈，有兩端。其一去血過多而暈者，屬
 脫其證，眼閉口開，手撒手冷，六脈微細，或浮是也。下血
 極少而暈者，屬血逆，其證胸腹脹痛，氣粗而手握拳，牙
 關緊閉是也。二者證治霄壤，服藥一差，生死立判。宜審
 辨焉。而本條所論小柴胡湯，是專治婦人草蓐傷風，嘔
 而不能食者。若以為產後鬱冒之方，則誤人殆多矣。

小柴胡湯方見太陽病中

病解能食七八日更發熱者此為胃實大承氣湯主之